

BR
2
17E

d





RBR

17^g

d

L

~~28~~.a.

OK

75

a.

HIST
NATU
DES C
TOME

HISTOIRE
NATURELLE
DES CÉTACÉES.


PAR M. LACÉPÈDE.
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE
DE LA CIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE
DE LA CIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE

HISTOIRE
NATURELLE
DES CÉTACÉES.

TOME SECOND.

A PARIS.

À LA LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE
DE M. JACQUES LAFITE, RUE DU FOYER DE LOUIS, N. 15.
ET CHEZ M. DIDOT, RUE DE MONTMARTRE, N. 112.
M. DCCCX.



HISTOIRE
NATURELLE
DES CÉTACÉS.
TOME SECOND.



HIS
NATU
DES C

A ANNE-CAR

PAR M.

GRAND-CHANC

DE LA LI

SÉNAT

MEMBRE DE L

ET DE PLUSIEURS

DE FRANCE TT

TOMT

A

A LA LIBR
DE P. DIDOT L'AINÉ
ET FIRMIN DIDOT,

M

HISTOIRE
NATURELLE
DES CÉTACÉES,

DÉDIÉE

A ANNE-CAROLINE LACÉPÈDE.

PAR M. LACÉPÈDE,

GRAND-CHANCELIER ET GRAND-AIGLE

DE LA LÉGION D'HONNEUR,

SÉNATEUR DE PARIS,

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE,

ET DE PLUSIEURS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES

DE FRANCE ET DES PAYS ÉTRANGERS.

TOME SECOND

A PARIS,

A LA LIBRAIRIE STÉRÉOTYPE

DE P. DIDOT L'AINÉ, RUE DU PONT DE LODI, N° 6,

ET FIRMIN DIDOT, RUE DE THIONVILLE, N° 116.

M. DCCC IX.



HISTOIRE

NATURELLE

DES CÉTACÉS

DÉFINITION

A ANNÉE CAROLINE LAMBERT

PAR M. J. A. CHERVILLE

GRAND-MAÎTRE DE LA LÉON D'ORANGE

DE LA LÉON D'ORANGE

SÉNATEUR DE LA LÉON D'ORANGE

MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRANCE

ET DE PLUSIEURS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES

DE FRANCE ET DES PAYS ÉTRANGERS

TOME SECOND




A PARIS

A LA LIBRAIRIE MATHÉMATIQUE


DE P. DIDOT L'AINÉ, RUE DU HAVRE, N° 101

ET FERMER DIDOT, RUE DE THOUREL, N° 101

M DCCC LX







1. Partie de la tête et défenses d'un NARWAL Microcephale. 2. Machoire supérieure et autres parties de la tête d'un CACHALOT Svineval. 3. PHYSALE Cyindrique.

HIS NATU DES C

LES N

LE NARW

QUEL intérêt
mage du narwal

¹ Voyez la table
cement de cette Hi

² Narwalu, vulgaire
narhoal, lighoal,
hoal, naa-hoal, e
kernektok, tugali

Cetacées. II.

HISTOIRE NATURELLE DES CÉTACÉES.

LES NARWALS¹.

LE NARWAL VULGAIRE².

QUEL intérêt ne doit pas inspirer l'image du narwal ? elle exerce le jugement,

¹ Voyez la table méthodique placée au commencement de cette Histoire.

² *Narwalus vulgaris* ; *narhwal* ; licorne de mer ; *narhoal* , *lighoal* , en norvège ; *narhoal* , *narhoal* , *naa-hoal* , en Islande ; *taupar* , *killelluak* , *kernektok* , *tugalik* , en Groenland ; *monodon*

élève la pensée, et satisfait le génie, par les formes colossales qu'elle montre, la puissance qu'elle annonce, les phénomènes qu'elle indique ou rappelle; elle excite la curiosité, elle fait naître une sorte d'inquiétude, elle touche le cœur, en entraînant l'attention vers les contrées lointaines, vers les montagnes de glaces flottantes, vers les tempêtes épouvantables qui soumettent d'infortunés navigateurs à tous les maux de l'absence, à toutes les horreurs des frimas, à tous les dangers de la mer en courroux; elle agit

monoceros, Linné, édition de Gmelin; *monodon*, Artedi, gen. 78, spec. 108; *id.* Faun. Suecic. 48; *id.* Mus. Ad. Fr. 1, p. 52; *id.* Muller, Zoolog. Dan. Prodr. p. 6, n. 44; *narhwal*, oder *einhorn*, Anders. Island. p. 225; *id.* Cranz, Groenland. p. 146; *einhorn*, Mart. Spitzb. p. 94; *eenhiorning*, Eggede, Groenl. p. 56; *monodon narhwal*, Bonaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *id.* édition de Bloch, publiée par R. R. Castel; Oth. Fabric. Faun. Groenland. 29; *unicornu marinum*, Mus. Wormi. p. 282-283; Raj. Pisc. p. 11; *licorne de mer*, Valmont-Bomare, Dictionnaire d'histoire naturelle; *narhwal*, *id.* *ibid.*; Klein, Miss. pisc. 2, p. 18, tab. 2, fig. c.

enfin sur l'imagina-
et l'étonne, en ré-
attachées à cet être
leux que les ancien-
ou plutôt en retraç-
et réel, ce premier
dominateur redou-
rivages et des forêts
torride, cet élépha-
sa forme, ses dimen-
ses armes, sa force
instinct.

Le narwal est,
l'éléphant de la mer,
maux que nous con-
ont reçu ces dents
si pointues, si pro-
l'attaque. Tous d-
masse, un grand
vigoureux, une p-
résultats de leur co-
différens : l'un, tr-
n'use de ses armes
ne repousse que ce-
ne perce que ceux q-
que ceux qui lui ré-

enfin sur l'imagination, lui plaît, l'anime et l'étonne, en réveillant toutes les idées attachées à cet être fantastique et merveilleux que les anciens ont nommé *licorne*, ou plutôt en retraçant cet être admirable et réel, ce premier des quadrupèdes, ce dominateur redoutable et paisible des rivages et des forêts humides de la zone torride, cet éléphant si remarquable par sa forme, ses dimensions, ses organes, ses armes, sa force, son industrie et son instinct.

Le narwal est, à beaucoup d'égards, l'éléphant de la mer. Parmi tous les animaux que nous connoissons, eux seuls ont reçu ces dents si longues, si dures, si pointues, si propres à la défense et à l'attaque. Tous deux ont une grande masse, un grand volume, des muscles vigoureux, une peau épaisse. Mais les résultats de leur conformation sont bien différens : l'un, très-doux par caractère, n'use de ses armes que pour se défendre, ne repousse que ceux qui le provoquent, ne perce que ceux qui l'attaquent, n'écrase que ceux qui lui résistent, ne poursuit et

4 HISTOIRE NATURELLE

n'immole que ceux qui l'irritent; l'autre, impatient, pour ainsi dire, de toute supériorité, se précipite sur tout ce qui lui fait ombrage, se jette en furieux contre l'obstacle le plus insensible, affronte la puissance, brave le danger, recherche le carnage, attaque sans provocation, combat sans rivalité, et tue sans besoin.

Et ce qui est très-remarquable, c'est que l'éléphant vit au milieu d'une atmosphère perpétuellement embrasée par les rayons ardents du soleil des tropiques, et que le narwal habite au milieu des glaces de l'Océan polaire, dans cet empire éternel du froid, que la moitié de l'année voit envahi par les ténèbres.

Mais l'éléphant ne peut se nourrir que de végétaux; le narwal a besoin d'une proie; et dès-lors tout est expliqué.

On n'a compté jusqu'à présent qu'une ou deux espèces de ces narwals munis de défenses comparables à celles de l'éléphant; mais nous croyons devoir en distinguer trois. Deux sur-tout sont séparées l'une de l'autre par de grandes diversités dans les formes, dans les dimensions,

DES N
dans les habitudes
cessivement les
espèces, dont les
présentés dans not
cétacées. Occupon
wal auquel se ra
nombre d'observa
auquel nous pour
particulier de *mac*
gner la grandeur
des rapports les plu
mation avec celle
ment de la baleine
nous préférons d
spécifique de *vulg*

De la mâchoire
wal sort une dent
conique dans sa fo
minée en pointe :
la mâchoire, a é
long-temps, dans
rieux, sous le nom
de licorne. On la re
de l'arme placée
cet animal fabul
* *Macrocephale sig*

dans les habitudes. Nous exposerons successivement les caractères de ces trois espèces, dont les traits distinctifs sont présentés dans notre tableau général des cétacées. Occupons-nous d'abord du narwal auquel se rapporte le plus grand nombre d'observations déjà publiées, auquel nous pourrions donner le nom particulier de *macrocéphale* *, pour désigner la grandeur relative de sa tête, l'un des rapports les plus frappans de sa conformation avec celle des baleines, et notamment de la baleine franche, mais auquel nous préférons de conserver l'épithète spécifique de *vulgaire*.

De la mâchoire supérieure de ce narwal sort une dent très-longue, étroite, conique dans sa forme générale, et terminée en pointe : cette dent, séparée de la mâchoire, a été conservée pendant long-temps, dans les collections des curieux, sous le nom de *corne* ou de *défense de licorne*. On la regardoit comme le reste de l'arme placée au milieu du front de cet animal fabuleux, symbole d'une

* *Macrocéphale* signifie grande tête.

6 HISTOIRE NATURELLE

puissance irrésistible, auquel on a voulu que le cheval et le cerf ressemblassent beaucoup, dont les anciens ne se sont pas contentés de nous transmettre la chimérique histoire, dont on retrouve l'image sur plusieurs des monumens qu'ils nous ont laissés, et dont la figure, adoptée par la chevalerie du moyen âge, a décoré si souvent les trophées des fêtes militaires, rappelle encore de hauts faits d'armes à ceux qui visitent de vieux donjons gothiques, et orne les écussons conservés dans une partie de l'Europe.

Il n'est donc pas surprenant qu'à une époque déjà un peu reculée, elle ait été vendue très-cher.

Cette dent est cannelée en spirale. On ne sait pas encore si la courbe produite par cette cannelure va, dans tous les individus, de gauche à droite, ou de droite à gauche; mais on sait que les pas de vis formés par cette spirale sont très-nombreux, et que le plus souvent on en compte plus de seize.

La nature de cette dent se rapproche beaucoup de celle de l'ivoire. Cette défense

D E S N

est creuse à la base
l'éléphant; elle est
Ses fibres plus déli-
arcs croisés, comme
mais elles sont plus
plus ténues, elles ont
proportion de leur
les unes sur les autres
nité plus grande;
une cohérence plus
la défense est plus
sante, moins altérée
perdre, en jaunissant
leur blanche qui

Si nous considérons
dent, relativement
de l'animal, nous
est quelquefois le
Il ne faut donc pas
trouvé des défenses
trois mètres, et même
et deux tiers.

* Suivant Wormius,
qu'un évêque d'Islande
longueur de la dent est
totale de ce cétacée,

est creuse à la base comme celles de l'éléphant; elle est cependant plus dure. Ses fibres plus déliées ne forment pas des arcs croisés, comme les fibres de l'ivoire; mais elles sont plus étroitement liées; plus ténues, elles ont plus de surface, à proportion de leur masse; elles exercent les unes sur les autres une force d'affinité plus grande; elles sont réunies par une cohérence plus difficile à vaincre: la défense est plus compacte, plus pesante, moins altérable, moins sujette à perdre, en jaunissant, l'éclat et la couleur blanche qui lui sont propres.

Si nous considérons la longueur de cette dent, relativement à la longueur totale de l'animal, nous trouverons qu'elle en est quelquefois le quart ou à peu près*. Il ne faut donc pas être étonné qu'on ait trouvé des défenses de narwal de plus de trois mètres, et même de quatre mètres et deux tiers.

* Suivant Wormius, et d'après les renseignemens qu'un évêque d'Islande lui avoit fait parvenir, la longueur de la dent du narwal est à la longueur totale de ce cétacée, comme 7 est à 30.

Lorsqu'on rencontre un narwal avec une seule dent, on ne voit pas cette défense placée au milieu du front, ainsi qu'on le pensoit encore du temps d'Albert * ; mais elle est située au côté droit ou au côté gauche de la mâchoire supérieure. Plusieurs naturalistes célèbres ont écrit qu'on la trouvoit beaucoup plus souvent à gauche qu'à droite. Elle perce la lèvre supérieure, qui entoure entièrement sa base et forme ordinairement autour de cette arme une sorte de bourrelet en anneau, assez large et un peu convexe. Le diamètre de la défense est le plus souvent, à cette même base, d'un trentième de la longueur de cette dent ; et la profondeur de l'alvéole qui la reçoit et la maintient, peut égaler le septième de cette même longueur.

Mais cette dent placée sur le côté gauche ou sur le côté droit, est-elle l'unique défense du narwal ? ce cétacée est-il un véritable *unicorne* ou *licorne de mer* ?

On ne peut plus conserver cette opinion. Toutes les analogies devoient faire croire

* *Albertus*, XXIV, pag. 244 a.

que la dent du narwal sur la ligne du milieu s'insérant dans un tibia, n'est pas unique, la conformation naturelle, mais les faits connus ne laissent aucun doute à ce sujet.

Lorsqu'on a pris une seule défense, on a vu qu'elle étoit placée du côté opposé à l'alvéole recouverte par la lèvre supérieure, qui renfermoit le rudiment de la défense arrêtée dans l'os. Des capitaines de baleine ont attesté à Anderson qu'ils avoient vu deux individus de l'espèce du narwal, du côté droit de la mâchoire supérieure, une seconde défense, quoique pointue ; et pour n'en pas faire mention, on a écrit sans nécessité que le narwal n'a qu'un seul fait. Petersen, commandant le *Lion d'or*, apporta à la fin du siècle les os de la tête d'un narwal, dans lesquels deux défenses

que la dent du narwal n'étant pas placée sur la ligne du milieu de la tête, mais s'insérant dans un des côtés de cette partie, n'est pas unique par une suite de la conformation naturelle de l'animal; mais les faits connus ne laissent aucun doute à ce sujet.

Lorsqu'on a pris un narwal avec une seule défense, on a trouvé fréquemment, du côté opposé à celui de la dent, un alvéole recouvert par la peau, mais qui renfermoit le rudiment d'une seconde défense arrêtée dans son développement. Des capitaines de bâtimens pêcheurs ont attesté à Anderson que plusieurs individus de l'espèce que nous décrivons, ont, du côté droit de la mâchoire supérieure, une seconde dent semblable à la première, quoique plus courte et moins pointue; et pour ne pas allonger cet article sans nécessité, et ne citer maintenant qu'un seul fait, le capitaine Dirck-Petersen, commandant le vaisseau *le Lion d'or*, apporta à Hambourg, en 1689, les os de la tête d'un narwal femelle, dans lesquels deux défenses étoient insérées.

DIRK NATURELLE
rencontre un narwal
at, on ne voit pas ces
mieux du front, ainsi
du temps d'Ande
au côté droit
de la mâchoire supé
naturalistes célèbres ont
voit le beaucoup plus so
à droite. Elle perce la
qui entoure entière
et finalement avec
une sorte de bourrel
sur large et un peu cour
de la défense est le plus
e même base, d'un trentie
eur de cette dent; et la
l'alvéole qui la reçoit
peut égaler le septième
langueur.
dent placée sur le côté
côté droit, est-elle l'un
narwal? ce cetace est
corne ou licorne se met
plus conserver cette op
alogies devoient faire
XLIV, pag. 244 a.

La figure gravée de cette tête a été publiée dans plusieurs ouvrages, et récemment dans la partie de l'*Encyclopédie méthodique* que nous devons au professeur Bonnaterre. Ces deux dents n'étoient éloignées l'une de l'autre, à leur sortie du crâne, que de six centimètres; mais leurs directions s'écartoient de manière qu'il y avoit cinquante centimètres de distance entre leurs extrémités : celle de gauche avoit près de deux mètres et demi de long, et celle de droite étoit moins longue de treize centimètres et demi.

D'après ces faits, et indépendamment d'autres raisons, on n'a pas besoin de réfuter les idées des premiers pêcheurs, qui ont cru que la femelle du narwal étoit privée de défenses, comme la biche est privée de cornes, et qui, par je ne sais quelle suite de conséquences, ont pensé que le cétacée nommé *marsouin* étoit la femelle du narwal vulgaire.

Anderson assure, d'après un témoin oculaire, pêcheur expérimenté et observateur instruit, qu'on avoit pris un narwal femelle dans le ventre de laquelle on

avoit trouvé un foetus. On ne sait donc aucun commencement de défenses; mais il ne faut pas en conclure qu'il ne doit croire, avec Linné et d'autres habiles naturalistes, que les narwals ont deux défenses à leur première jeunesse.

Notre illustre confrère, le docteur Linné, dans la société des sciences de Stockholm, a eu occasion de voir un narwal dont la défense gauche étoit tombée, et dont la défense droite étoit encore dans son alvéole *.

Si les cétacées de l'Arctique, que nous décrivons, n'ont qu'une seule défense, ils sont devenus adultes sans avoir eu des chocs violens ou d'autres causes qui leur aient fait tomber la défense, comme les cétacées du Sud, qui cassent les blocs de glace, et dont ils se trouvent engagés. La défense est encore trop

* *Abbildungen naturg. de, von J. Fr. A. n. 44.*

avoit trouvé un fœtus qui ne présentait aucun commencement de dent. Nous ignorons à quel âge paroissent les défenses ; mais il nous semble que l'on doit croire , avec le professeur Gmelin et d'autres habiles naturalistes , que les narvals ont deux dents pendant leur première jeunesse.

Notre illustre confrère Blumenbach , de la société des sciences de Gottingue , etc. a eu occasion de voir un jeune narwal dont la défense gauche excédoit déjà la lèvre d'un tiers de mètre ou environ , et dont la défense droite étoit encore cachée dans son alvéole *.

Si les cétacées de l'espèce que nous décrivons , n'ont qu'une défense lorsqu'ils sont devenus adultes , c'est parce que des chocs violens ou d'autres causes accidentelles , comme les efforts qu'ils font pour casser les blocs de glace dans lesquels ils se trouvent engagés , ont brisé une défense encore trop fragile , comprimé ,

* *Abbildungen naturhistorischer gegenstände, von J. Fr. Blumenbach ; Gottingen , n. 44.*

déformé, désorganisé l'alvéole au point d'y tarir les sources de la production de la dent. Souvent alors la matière osseuse, qui n'éprouve plus d'obstacle, ou qui a été déviée, obstrue cet alvéole; et la lèvre supérieure s'étendant sur une ouverture dont rien ne la repousse, la voile et la dérobe tout-à-fait à la vue.

Nous avons une preuve de ces faits dans un phénomène analogue, présenté par un individu de l'espèce de l'éléphant, dont les défenses ont tant de rapports avec celles du narwal. On peut voir dans la riche collection d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle, le squelette d'un éléphant mâle, mort il y a deux ans dans ce Muséum. Que l'on examine cette belle préparation, que nous devons, ainsi que tant d'autres, aux soins de mon savant collègue le citoyen Cuvier. On ne verra de défense que du côté gauche de la mâchoire supérieure, et l'alvéole de la défense droite est oblitérée. Cependant non seulement tout le monde sait que les éléphants ont deux défenses, mais encore l'individu mort

dans la ménagerie de deux lorsqu'on l'a fait de Loo en Hollande Paris. C'est pendant s'efforçant de sortir d'une caisse de bois dans fait entrer pour le tra sa défense droite. Il quatorze ans, et il n'a depuis cet accident.

Quoi qu'il en soit, la défense très-dure, très-mètres de longueur! doit-elle pas faire, en mouvement par

Ce cétacée nage avec grande vitesse, qu'elle échappe à toute poursuite, quoiqu'il est si rare de voir de cette espèce, qu'elle est nombreuse. Cette rareté n'a pas été toujours connue. Albert, et d'autres auteurs ou plus anciens, ont fait une mention expresse attribuoit au narval.

dans la ménagerie du Muséum en avoit deux lorsqu'on l'a fait partir du château de Loo en Hollande , pour l'amener à Paris. C'est pendant son voyage, et en s'efforçant de sortir d'une grande et forte caisse de bois dans laquelle on l'avoit fait entrer pour le transporter, qu'il cassa sa défense droite. Il avoit alors près de quatorze ans , et il n'a vécu que cinq ans depuis cet accident.

Quoi qu'il en soit , quelle arme qu'une défense très-dure , très-pointue , et de cinq mètres de longueur ! quelles blessures ne doit-elle pas faire , lorsqu'elle est mise en mouvement par un narwal irrité !

Ce cétacée nage en effet avec une si grande vitesse , que le plus souvent il échappe à toute poursuite ; et voilà pourquoi il est si rare de prendre un individu de cette espèce , quoiqu'elle soit assez nombreuse. Cette rapidité extraordinaire n'a pas été toujours reconnue , puisque Albert , et d'autres auteurs de son temps ou plus anciens , ont au contraire fait une mention expresse de la lenteur qu'on attribuoit au narwal. On la retrouve

néanmoins non seulement dans la fuite de ce cétacée, mais encore dans ses mouvemens particuliers et dans ses diverses évolutions; et quoique ses nageoires pectorales soient courtes et étroites, il s'en sert avec tant d'agilité, qu'il se tourne et retourne avec une célérité surprenante. Il n'est qu'un petit nombre de circonstances où les narwals n'usent pas de cette faculté remarquable. On ne les voit ordinairement s'avancer avec un peu de lenteur, que lorsqu'ils forment une grande troupe; dans presque tous les autres momens, leur vélocité est d'autant plus effrayante, qu'elle anime une grande masse. Ils ont depuis quatorze jusqu'à vingt mètres de longueur, et une épaisseur de plus de quatre mètres dans l'endroit le plus gros de leur corps: aussi a-t-on écrit * depuis long-temps qu'ils pouvoient se précipiter, par exemple,

* *Auctor de natura rerum, apud Vincentium. XVII, cap. 120.*

Albertus, XXIV, p. 244 a.

Voyez l'ouvrage du savant Schneider qui a pour titre, *Petri Artedi Synonymia, etc.* Lipsiæ, 1783.

contre une chaloupe
la faire voler en é
des navires avec le
ou les couler à fond
longues dents enfo
la carène d'un vai
du choc, qui les
plus ou moins p
mêmes armes ont
profondément pla
baleines franches.
pensions, avec que
les narwals aient
turelle contre ces
écrit qu'ils étoient
de ces cétacées, co
diateurs; qu'ils la
dité, lorsque la m
ces baleines leur p
cher sans danger.
causes peuvent al
sagère et une fure
espèce d'obstacles
irrésistible et cont
gereux, dans un ét
fort sans doute qu

contre une chaloupe, l'écarter, la briser, la faire voler en éclats, percer le bord des navires avec leur défense, les détruire ou les couler à fond. On a trouvé de leurs longues dents enfoncées très-avant dans la carène d'un vaisseau par la violence du choc, qui les avoit ensuite cassées plus ou moins près de leur base. Ces mêmes armes ont été également vues profondément plantées dans le corps de baleines franches. Ce n'est pas que nous pensions, avec quelques naturalistes, que les narwals aient une sorte de haine naturelle contre ces baleines : mais on a écrit qu'ils étoient très-avides de la langue de ces cétacées, comme les dauphins gladiateurs; qu'ils la dévoroient avec avidité, lorsque la mort ou la foiblesse de ces baleines leur permettoient de l'arracher sans danger. Et d'ailleurs, tant de causes peuvent allumer une ardeur passagère et une fureur aveugle contre toute espèce d'obstacles, même contre le plus irrésistible et contre l'animal le plus dangereux, dans un être moins grand, moins fort sans doute que la baleine franche,

NATURELLE
seulement dans la fa-
is encore dans ses me-
rs et dans ses divers
que ses nageoires pe-
tes et étroites, il s'
ilité, qu'il se tourne
célérité surprenan-
it nombre de circon-
als n'usent pas de cer-
le. On ne les voit or-
er avec un peu de le-
ls forment une grand
esque tous les autre
ocité est d'autant plu
le anime une grand
puis quatorze jusqu'
ngueur, et une épais-
atre mètres dans l'é-
de leur corps : au-
puis long-temps qu'
ipiter, par exemple
rerum, apud Vincentius

p. 244 a.
avant Schneider qui a po-
monimia, etc. Lipsiæ, 176

mais très-vif, très-agile, et armé d'une pique meurtrière! Comment cette lance si pointue, si longue, si droite, si dure, n'entreroit-elle pas assez avant dans le corps de la baleine pour y rester fortement attachée?

Et dès-lors, quel habitant des mers pourroit ne pas craindre le narwal? Non seulement avec ses dents il fait des blessures mortelles, mais il atteint son ennemi d'assez loin pour n'avoir point à redouter ses armes. Il fait pénétrer l'extrémité de sa défense jusqu'au cœur de cet ennemi, pendant que sa tête en est encore éloignée de trois ou quatre mètres. Il redouble ses coups; il le perce, il le déchire, il lui arrache la vie, toujours hors de portée, toujours préservé de toute atteinte, toujours garanti par la distance. D'ailleurs, au lieu d'être réduit à frapper ses victimes, il en est qu'il écarte, soulève, enlève, lance avec ses dents, comme le bœuf avec ses cornes, le cerf avec ses bois, l'éléphant avec ses défenses.

Mais ordinairement, au lieu d'assouvir sa rage ou sa vengeance, au lieu de

DES NA
défendre sa vie contre
autres grands squales
des mers, le narwal
soin de la faim, ne
facile : il aime, par
ceux que l'on a nourri
roit préférer, parmi les
ronectes pôles. On trouve
dans Worms, dans les
autres auteurs
diverses opinions relatives
qu'il n'est pas rebu
des habitans des mers
peuvent lui convenir
comme alimens, et
vient de *whal*, qui
de *nar*, qui, dans le
Nord, signifie *cadavre*.
Il lui arrive souvent
défense les poissons.
les fragmens d'animaux
nourrir. Il les enfle, les
près de sa bouche, et
ses lèvres et ses mâchoires
les réduit en lambeaux
sa dent, et les avale.

défendre sa vie contre les requins, les autres grands squales et les divers tyrans des mers, le narwal, ne cédant qu'au besoin de la faim, ne cherche qu'une proie facile : il aime, parmi les mollusques, ceux que l'on a nommé *planorbes* ; il paroît préférer, parmi les poissons, les *pleuronectes pôles*. On trouve dans Willughby, dans Worms, dans Klein, et dans quelques autres auteurs qui ont recueilli diverses opinions relatives à ce cétacée, qu'il n'est pas rebuté par les cadavres des habitans des mers ; que ces restes peuvent lui convenir, qu'il les recherche comme alimens, et que le mot *narwhal* vient de *whal*, qui veut dire *baleine*, et de *nar*, qui, dans plusieurs langues du Nord, signifie *cadavre*.

Il lui arrive souvent de percer avec sa défense les poissons, les mollusques et les fragmens d'animaux dont il veut se nourrir. Il les enfile, les ramène jusqu'auprès de sa bouche, et, les saisissant avec ses lèvres et ses mâchoires, les dépèce, les réduit en lambeaux, les détache de sa dent, et les avale.

Il trouve aisément, dans les mers qu'il fréquente, la nourriture la plus analogue à ses organes et à ses appétits.

Il vit vers le quatre-vingtième degré de latitude, dans l'Océan glacial arctique. Il s'approche cependant des latitudes moins élevées. Au mois de février 1736, Anderson vit à Hambourg un narwal qui avoit remonté l'Elbe, poussé, pour ainsi dire, par une marée très-forte.

Tous les individus de l'espèce à laquelle cet article est consacré , n'ont pas les mêmes couleurs : les uns sont noirs, les autres gris, les autres nuancés de noir et de blanc *. Le plus grand nombre est d'un blanc quelquefois éclatant et quelquefois un peu grisâtre , parsemé de taches noires, petites, inégales, irrégulières. Presque tous ont le ventre blanc, luisant et doux au toucher; et comme, dans le narwal, ni le ventre ni la gorge ne présentent de rides ou de plis, aucun trait saillant de la conformation extérieure n'indique l'existence d'une grande

* *Histoire des pêches des Hollandois dans les mers du Nord*, tome I, page 182.

poche natatoire au
inférieure de ce cétacé
jubarte, le rorqual
museau-pointu.

Sa forme générale
Il a le dos convexe
très-grosse, et assez
que sa longueur soit
à peu près de la
mâchoire supérieur
une lèvre plus épaisse
celle d'en-bas. L'ou
est très-petite ; l'o
cette ouverture, fo
que équilatéral ave
et l'orifice des éven
torales sont très-co
les deux lobes de
extrémités arrondie
ou de saillie longitu
sensible, s'étend de
vers la nageoire de
de hauteur à mes
voisine de cette na
Les deux évents se
qu'ils n'ont qu'un

poche natatoire auprès de la mâchoire inférieure de ce cétacée, comme dans la jubarte, le rorqual et la baleinoptère museau-pointu.

Sa forme générale est celle d'un ovoïde. Il a le dos convexe et large; la tête est très-grosse, et assez volumineuse pour que sa longueur soit égale au quart ou à peu près de la longueur totale. La mâchoire supérieure est recouverte par une lèvre plus épaisse, et avance plus que celle d'en-bas. L'ouverture de la bouche est très-petite; l'œil, assez éloigné de cette ouverture, forme un triangle presque équilatéral avec le bout du museau et l'orifice des événements. Les nageoires pectorales sont très-courtes et très-étroites; les deux lobes de la caudale ont leurs extrémités arrondies; une sorte de crête ou de saillie longitudinale, plus ou moins sensible, s'étend depuis les événements jusque vers la nageoire de la queue, et diminue de hauteur à mesure qu'elle est plus voisine de cette nageoire.

Les deux événements sont réunis de manière qu'ils n'ont qu'un seul orifice. Cette

E NATURELLE

ment, dans les mers
niture la plus analo
à ses appétits.

quatre-vingtième degré

Océan glacial arctique

pendant des latitudes

au mois de février à

Lambourg un narwal

Elbe, poussé, pour a

marée très-forte.

de l'espèce à laque

consacré, n'ont pas

les uns sont noirs,

autres nuancés de n

plus grand nombre

quelques fois éclatant et que

grisâtre, parsemé

petites, inégales, irrég

ous ont le ventre blan

au toucher; et comme

ni le ventre ni la gorge

rides ou de plis, avec

la conformation ext

l'existence d'une gran

ches des Hollandais dans

me I, page 182.

ouverture est située sur la partie postérieure et la plus élevée de la tête : l'animal la ferme à volonté, par le moyen d'un opercule frangé et mobile, comme sur une charnière ; et c'est à une assez grande hauteur que s'élève l'eau qu'il rejette par cet orifice.

On ne prendroit les narwals que très-difficilement, s'ils ne se rassembloient pas en troupes très-nombreuses dans les anes libres de glaçons, ou si on ne les rencontroit pas dans la haute mer, réunis en grandes bandes. Rapprochés les uns des autres, lorsqu'ils forment une sorte de légion au milieu du vaste océan, ils ne nagent alors qu'avec lenteur, ainsi que nous l'avons déjà dit. On s'approche avec précaution de leurs longues files. Ils serrent leurs rangs et se pressent tellement, que les défenses de plusieurs de ces cétacées portent sur le dos de ceux qui les précèdent. Embarrassés les uns par les autres, au point d'avoir les mouvemens de leurs nageoires presque entièrement suspendus, ils ne peuvent ni se retourner, ni avancer, ni échapper, ni combattre,

ni plonger, qu'avec peine, sans des chaloupes pour les soutenir sous les coups des poignards.

Au reste, on retire de l'huile qu'on a préférée à la graisse, parce qu'elle est plus franche. Les Groenlandais coupent la chair de ces animaux pour la sécher en l'exposant au soleil, et en font des mets délicieux. Les Groenlandais leur servent à faire des bouillottes fortes ; et l'on a écrit qu'ils tiroient de son gosier une huile utile pour la pêche. On ne peut faire croire que ce cétacé nage comme la baleine ou le rorqual et la jubilé, qu'il ait une poche très-souple, remplie d'air, une large veine, et qu'il n'ait aucun pli de la peau, à l'usage de cet organe.

On emploie la défense de cet animal mieux, l'ivoire du narwal, que l'ivoire de l'éléphant.

* Voyez le *Traité de*

ni plonger, qu'avec peine; et les plus voisins des chaloupes périssent sans défense sous les coups des pêcheurs.

Au reste, on retire des narwals une huile qu'on a préférée à celle de la baleine franche. Les Groenlandois aiment beaucoup la chair de ces cétacées, qu'ils font sécher en l'exposant à la fumée. Ils regardent les intestins de ces animaux comme un mets délicieux. Les tendons du narwal leur servent à faire de petites cordes très-fortes; et l'on a écrit que de plus ils retiroient de son gosier plusieurs *vessies* utiles pour la pêche*; ce qui pourroit faire croire que ce cétacée a sous la gorge, comme la baleinoptère museau-pointu, le rorqual et la jubarthe, une grande poche très-souple, un grand réservoir d'air, une large *vessie natatoire*, quoiqu'aucun pli de la peau n'annonce l'existence de cet organe.

On emploie la défense, ou, si on l'aime mieux, l'ivoire du narwal, aux mêmes usages que l'ivoire de l'éléphant, et même

* Voyez le *Traité des pêches* de Duhamel.

avec plus d'avantage, parce que, plus dur et plus compacte, il reçoit un plus beau poli, et ne jaunit pas aussi promptement. Les Groenlandois en font des flèches pour leurs chasses, et des pieux pour leurs cabanes. Les rois de Danemarck ont eu, dit-on, et ont peut-être encore, dans le château de Rosenberg, un trône composé de défenses de narwals. Quant aux prétendues propriétés de cet ivoire contre les poisons et les maladies pestilentiellles, on ne trouvera que trop de détails à ce sujet dans *Bartholin*, dans *Wormius*, dans *Tulpius*, etc. Mais comment n'auroit-on pas attribué des qualités extraordinaires à des défenses rares, d'une forme singulière, d'une substance assez belle, qu'on apportoit de très-loin, que l'on n'obtenoit qu'en bravant de grands dangers, et qu'on avoit pendant long-temps regardées comme l'arme toute puissante d'un animal aussi merveilleux que la fameuse licorne?

En écartant cependant toutes ces erreurs, quel résultat général peut-on tirer de la considération des organes et des

habitudes du Narwal
la mer, si supérieur
par sa masse, sa vîte
égal par ses armes, lu
par son industrie et
il n'a pas reçu cette
flexible; cette main
délicate; ce siège un
exquis, de l'odorat
sations si vives, et
rectifie; cet instru
puissance, cet orga
d'intelligence. Il faut
comparer au rhinoc
tame. Il est ce que
la nature le privoit

habitudes du Narwal? Cet éléphant de la mer, si supérieur à celui de la terre par sa masse, sa vitesse, sa force, et son égal par ses armes, lui est-il comparable par son industrie et son instinct? Non : il n'a pas reçu cette trompe longue et flexible ; cette main souple, déliée et délicate ; ce siège unique de deux sens exquis, de l'odorat qui donne des sensations si vives, et du toucher qui les rectifie ; cet instrument d'adresse et de puissance, cet organe de sentiment et d'intelligence. Il faudroit bien plutôt le comparer au rhinocéros ou à l'hippopotame. Il est ce que seroit l'éléphant, si la nature le privoit de sa trompe.

LE NARWAL MICROCÉPHALE *.

CETTE espèce est très-différente de celle du narwal vulgaire; nous pouvons en indiquer facilement les caractères, d'après un dessin très-exact fait dans la mer de Boston, au mois de février 1800, par M. W. Brand, et que sir Joseph Banks a eu la bonté de nous envoyer.

Nous nommons ce narwal, le *microcéphale*, parce que sa tête est en effet très-petite, relativement à celle du narwal vulgaire. Dans ce dernier cetacée, la longueur de la tête est le quart, ou à peu près, de la longueur totale: dans le *microcéphale*, elle n'en est que le dixième. La tête de ce *microcéphale* est d'ailleurs distincte du corps, au dessus de la surface duquel elle s'élève un peu en bosse.

* *Narwalus microcephalus.*

L'ensemble de ce narwal représente un ovoïde et forme un cône à l'extrémité se réunit à la partie opposée exclusivement par le ventre.

Ce cetacée ne parvient à des dimensions bien inférieures au narwal vulgaire. C'est à cet égard que nous rapportons la plupart des observations. On n'a trouvé la longueur que de huit mètres *. L'individu de Boston n'avoit pas tout de long; et nous avons vu un précédent, qu'un narwal souvent plus de vingt fois.

Malgré cette infériorité du *microcéphale*, ses défenses ont une longueur presque égale à la longueur entière de l'animal, et sont plus longues que celles du narwal vulgaire.

* Voyez l'édition de Linné par le professeur Gmelin, article de la description des planches rhodiques, par le professeur du Monodon narwal; et

L'ensemble de ce narwal, au lieu de représenter un ovoïde, est très-allongé, et forme un cône très-long, dont une extrémité se réunit à la caudale, et dont la partie opposée est grossie irrégulièrement par le ventre.

Ce cétacée ne parvient qu'à des dimensions bien inférieures à celles du narwal vulgaire. C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la plupart des narwals dont on n'a trouvé la longueur que de sept ou huit mètres *. L'individu pris auprès de Boston n'avoit pas tout-à-fait huit mètres de long; et nous avons dit, dans l'article précédent, qu'un narwal vulgaire avoit souvent plus de vingt mètres de longueur.

Malgré cette infériorité du microcéphale, ses défenses ont quelquefois une longueur presque égale au tiers de la longueur entière de l'animal, pendant que celles du narwal vulgaire n'atteignent

* Voyez l'édition de Linné donnée par le professeur Gmelin, article du *Monodon monoceros*; la description des planches de l'*Encyclopédie méthodique*, par le professeur Bonnaterre, article du *Monodon narwal*; et Artedi, genre 49, p. 78.

que le quart de cette longueur totale. Cette proportion dans les dimensions des défenses rend la petitesse de la tête du microcéphale encore plus sensible, et peut contribuer à le faire reconnoître. Dans l'individu dessiné par M. Brand, et dont nous avons fait graver la figure, on ne voyoit qu'une défense : cette arme étoit placée sur le côté gauche de la mâchoire supérieure ; la spirale formée par les stries assez profondes de cette dent alloit de droite à gauche. La longueur de cette défense étoit de huit-vingt cinquièmes de la longueur du cétacée ; mais nous trouvons une défense plus grande encore à proportion dans un narwal dont Tulpius a fait mention *, qui vraisemblablement étoit de l'espèce que nous décrivons, et dont le cadavre fut trouvé, en juin 1648, flottant sur la mer, près de l'île *maja*. La longueur de ce cétacée n'étoit que de sept mètres et un tiers ; et sa défense avoit trois mètres de longueur, en y comprenant la partie renfermée dans

* Tulpius, *Observ. medic.* cap. 59.

l'alvéole, et qui avoit long. Au reste, cette défense, selon Tulpius, étoit dure et blanche, striée profondément sur le côté droit.

Le microcéphale étoit plus délié que le narwal, et sa défense doit être plus grande en proportion. La ténacité, quelque étonnante qu'elle soit, avec laquelle nagent ces animaux, sa force seroit donc bien inférieure à sa masse ne le cédant qu'à la force vulgaire, encore plus inférieure à ses mouvemens naturels que celle des mouvemens de la tête.

Nous venons de voir que le microcéphale auprès duquel on se trouve conséquemment vers le pôle, et à cette latitude. D'un autre côté, on doit rapporter à cette espèce celui vu dans le détroit de Davis. Anderson avoit approuvé ce cétacée de vaisseau, qu'ils avoient pris, et qu'ils avoient allongé, qu'ils ressembloient à l'acipensère es-

l'alvéole, et qui avoit un demi-mètre de long. Au reste, cette défense, décrite par Tulpinus, étoit dure, très-polie, très-blanche, striée profondément, et placée sur le côté droit.

Le microcéphale étant beaucoup plus délié que le narwal vulgaire, sa vitesse doit être plus grande que celle de ce cétacée, quelque étonnante que soit la rapidité avec laquelle nage ce dernier narwal. Sa force seroit donc plus redoutable, si sa masse ne le cédoit à celle du narwal vulgaire, encore plus que la vivacité de ses mouvemens ne doit l'emporter sur celle des mouvemens du narwal à grande tête.

Nous venons de voir qu'on a pris un microcéphale auprès de Boston, et par conséquent vers le quarantième degré de latitude. D'un autre côté, il paroît qu'on doit rapporter à cette espèce les narwals vus dans le détroit de Davis, et desquels Anderson avoit appris par des capitaines de vaisseau, qu'ils avoient le corps très-alongé, qu'ils ressembloient par leurs formes à l'acipensère esturgeon, mais qu'ils

n'avoient pas la tête aussi pointue que ce cartilagineux.

L'individu pris dans la mer qui baigne les rivages de Boston, étoit d'un blanc varié par des taches très-petites, nuageuses, bleuâtres, plus nombreuses et plus foncées sur la tête, au bout du museau, sur la partie la plus élevée du dos, sur les nageoires pectorales, et sur la nageoire de la queue.

Le museau du microcéphale est très-arrondi; la tête, vue par-devant, ressemble à une boule. La mâchoire supérieure est un peu plus avancée que celle d'en-bas. L'ouverture de la bouche n'a qu'un petit diamètre. L'œil, très-petit, est un peu éloigné de l'angle que forme la réunion des deux mâchoires, et à peu près aussi bas que cet angle. Les pectorales sont à une distance du bout du museau, égale à trois fois ou environ la longueur de la tête. La saillie longitudinale que l'on remarque sur le dos, et qui s'étend jusqu'à la nageoire de la queue, s'élève assez vers le milieu de la longueur totale et auprès de la caudale,

DES NA
pour imiter dans ces
commencement de f
caudale se divise en
et recourbés vers le
à représenter une anc
événements est un croissa
sont tournées vers la

pour imiter dans ces deux endroits un commencement de fausse nageoire. La caudale se divise en deux lobes arrondis et recourbés vers le corps, de manière à représenter une ancre. L'ouverture des évents est un croissant dont les pointes sont tournées vers la tête.

LE NARWAL ANDERSON¹,

ANDERSON a vu à Hambourg des défenses de narwal qui n'étoient ni striées ni cannelées, mais dont la surface étoit absolument unie, et dont la longueur étoit considérable. D'autres observateurs en ont examiné de semblables². On ne peut pas regarder ces dents comme des produits d'une désorganisation individuelle; on ne peut pas les considérer non plus comme l'attribut de l'âge, le signe du sexe, ou la marque de l'influence du climat, puisqu'on a vu les narwals vulgaires, ou les microcéphales, de tout

¹ *Narwalus Andersonianus*.

² Willughby (livre II, page 43 de son Ichthyologie) dit que les défenses du narwal qui ne présentent ni spirale ni stries, sont rares; mais il donne la figure de trois de ces défenses lisses et coniques, planche A 2.

DES NARWALS
 âge, des deux sexes
 mers, présenter des dé-
 ture, de même forme
 en spirale, et profond
 Nous devons donc rap-
 unies à une troisième
 et nous lui donnons
 vateur auquel on doit
 ces grandes dents à s-
 lisse.

On a vu à Hambourg
narwal qui n'étoient
s, mais dont la surface
unie, et dont la lon-
gueur est considérable. D'autres observ-
ateurs ont vu de semblables?
garder ces dents comme
une désorganisation :
on ne peut pas les considérer
comme l'attribut de l'âge, le
la marque de l'influ-
ence qu'on a vu les narwal
les microcéphales, de

Andersonianus.

(livre II, page 43 de son
les défenses du narwal qui
rales ni striées, sont rares :
de trois de ces défenses
plaque A 2.

âge, des deux sexes et des différentes
mers, présenter des défenses de même na-
ture, de même forme, également striées
en spirale, et profondément sillonnées.
Nous devons donc rapporter ces défenses
unies à une troisième espèce de narwal;
et nous lui donnons le nom de l'obser-
vateur auquel on doit la connoissance de
ces grandes dents à surface entièrement
lisse.

LES ANARNAKS¹.

L'ANARNAK GROENLANDOIS².

LA brièveté des dents, la courbure de leur extrémité, et la nageoire du dos, distinguent le genre des *anarnaks*, de celui des narwals, qui n'ont pas de nageoire dorsale, et dont les défenses sont très-longues et très-droites dans toute leur longueur. Otho Fabricius a fait connoître la seule espèce de cétacée que nous puissions inscrire dans ce genre. Les Groenlandois ont donné à cette espèce le

¹ Voyez les caractères du genre des *anarnaks* dans la table méthodique qui est à la tête de cette Histoire.

² *Anarnak Groenlandicus*; *Anarnak* dans le Groenland; Oth. Fabricius, *Fauna Groenlandica*, 31; *monodon spurius*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

HISTOIRE NA
nom d'*anarnak*, que ne
comme dénomination
désigne la qualité viol
des chairs et de la gra
Il vit dans la mer qu
groenlandoises; il s'a
du rivage. Son corps
couleur noirâtre.

nom d'*anarnak*, que nous lui conservons comme dénomination générique. Ce nom désigne la qualité violemment purgative des chairs et de la graisse de ce cétacée. Il vit dans la mer qui baigne les côtes groenlandoises ; il s'approche rarement du rivage. Son corps est alongé, et sa couleur noirâtre.

lents, la courbure
la nageoire du do
re des *anarnaks*,
qui n'ont pas de
dont les défenses se
ès-droites dans tor
o Fabricius a fait co
ce de cétacée que no
dans ce genre. L
onné à cette espèce

es du genre des *anarn*
e qui est à la tête de c

ndicus ; *Anarnak* dans
icius, Fauna Groenlandi
, Bonnaterre, planches
ique.

LES CACHALOTS¹.

LE CACHALOT MACROCÉPHALE².

QUEL colosse nous avons encore sous les yeux ! Nous voyons un des géans de

¹ Voyez les caractères du genre des cachalots dans la table méthodique qui est à la tête de cette Histoire.

² *Catodon macrocephalus* ; *cachelot* ; *potvisch*, *kaisilot*, par les Hollandois ; *pottfisch*, *caschelott*, par les Allemands ; *kaskelot*, *potfisk*, *trold-hval*, *huns-hval*, *sue-hval*, *buur-hval*, *bardhvalir*, en Norvège ; *rod-kammen* (*peigne rouge*), par les Islandois ; *ill-hvel*, nom donné par les Islandois aux espèces de cétacées dont les mâchoires sont armées de dents, et qui sont carnassières et dangereuses ; *sperma ceti*, par les Anglois ; *fianfiro*, *mokos*, au Japon ; *physeter macrocephalus*, Linné, édition de Gmelin ; *grand cachalot* : *physeter macrocephalus*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique ; *id.* édition de Blech, publié par R. R. Castel ; *catodon fistula in cervice*, Faun. Suecic. 53 ; *id.* Arledi, gen. 78, syn. 108 ; *cetus bipinnis supra niger, infra albicans, fistula in cervice*, Brisson, Regn. animal.



1. CACHALOT *Macrocephalus*
2. CACHALOT *Truncatus*

ous avons encore
oyons un des gé-
res du genre des cachalots
ui est à la tête de cette Hie
ephalus ; cachelot ; pote-
andois ; pottfisch, casche-
askelot, potfisk, trolde-
l, buur-hval, bardhu-
men (peigne rouge), pe-
nom donné par les Is-
cées dont les mâchoires
qui sont carnassières et
ti, par les Anglois ; fies-
; *physeter macrocephalus*
nelin ; grand cachalot
e. Bonaparte, p. 10
d'après l'éd. de B.
Casel ; catoda ju-
ic. 53 ; id. Arredi, ge-
nais *serra niger*, mi-
ce, Brisson, Regn.



1. CACHALOT *Macrocephale*.

2. CACHALOT *Trumpo*.



HISTOIRE NAT

la mer, des dominateurs
rivaux de la baleine fran-
que le premier des cétacés
armes formidables, qu'
pas données à la baleine
ribles par leur force et p

p. 357, n. 1; *cetepot walfish*
accolis dictum, et *balæna*
tantum maxilla, dentata,
pinnis Sibb. Raj. Pisc. p. 1
— *pot. walfish*, — *cete* Clus
lib. 2, p. 41; *balæna*, id. p.
dentatus, Mus. Worm. p.
Pisc. p. 215, fig. 41-42;
Miss. pisc. 2, p. 14; *alinea*
Clus Exot. p. 131; Eggede
Anders. Isl. p. 232; Cranz.

Nous n'avons pas besoin de
qu'en citant dans la synonymie
dans celle des autres articles de
ouvrages des naturalistes an-
nous avons été souvent bien
descriptions qu'ils ont donné
ils ont parlé.

* Suivant Anderson, le nom
donné, sur les rives occide-
méridionale, au cétacée que
signifie *animal à dents*.

la mer, des dominateurs de l'océan, des rivaux de la baleine franche. Moins fort que le premier des cétacées, il a reçu des armes formidables, que la Nature n'a pas données à la baleine. Des dents terribles par leur force et par leur nombre *

p. 357, n. 1; *cetepot walfish Batavis maris accolis dictum*, et *balæna major, in inferiore tantum maxilla, dentata, macrocephala, bipinnis* Sibb. Raj. Pisc. p. 11; *a whirle-pool, — pot. walfish, — cete Clusio, etc.* Willughby, lib. 2, p. 41; *balæna*, id. pl. A 1, fig. 3; *cetus dentatus*, Mus. Worm. p. 280; *id.* Jonston, Pisc. p. 215, fig. 41-42; *cete Clusii*, Klein, Miss. pisc. 2, p. 14; *aliud cete admirabile*, Clus Exot. p. 131; Eggede, Groenland. p. 54; Anders. Isl. p. 232; Cranz, Groenland, p. 148.

Nous n'avons pas besoin de prévenir nos lecteurs qu'en citant dans la synonymie de cet article, ou dans celle des autres articles de cette Histoire, les ouvrages des naturalistes anciens ou modernes, nous avons été souvent bien éloignés d'adopter les descriptions qu'ils ont données des cétacées dont ils ont parlé.

* Suivant Anderson, le nom de *cachalot* a été donné, sur les rives occidentales de la France méridionale, au cétacée que nous décrivons, et signifie *animal à dents*.

garnissent les deux côtés de sa mâchoire inférieure. Son organisation intérieure, un peu différente de celle de la baleine, lui impose d'ailleurs le besoin d'une nourriture plus substantielle, que des légions d'animaux assez grands peuvent seules lui fournir. Aussi ne règne-t-il pas sur les ondes en vainqueur pacifique comme la baleine; il y exerce un empire redouté: il ne se contente pas de repousser l'ennemi qui l'attaque, de briser l'obstacle qui l'arrête, d'immoler l'audacieux qui le blesse; il cherche sa proie, il poursuit ses victimes, il provoque au combat; et s'il n'est pas aussi avide de sang et de carnage que plusieurs animaux féroces, s'il n'est pas le tigré de la mer, du moins n'est-il pas l'éléphant de l'océan.

Sa tête est une des plus volumineuses, si elle n'est pas la plus grande de toutes celles que l'on connoît. Sa longueur surpasse presque toujours le tiers de la longueur totale du cétacée. Elle paroît comme une grosse masse tronquée par-devant, presque cubique, et terminée par conséquent à l'extrémité du muscau par une

DES CACHALOTS
surface très-étendue, presque verticale. C'est l'inférieure de ce cube imparfait, que l'on voit la bouche, étroite, longue, reculée que le bout du museau à la volonté du cachalot d'en-bas, comme par un renversé.

Cette mâchoire d'en-bas est beaucoup plus courte que la supérieure. Nous avons dans le *Macrorhinus* d'histoire naturelle les dimensions d'un cachalot macrocéphale dont la mâchoire inférieure a cinq mètres quatre-vingt centimètres de longueur, et la supérieure longue que de quatre mètres six centimètres.

Mais la mâchoire d'en-bas de l'éléphant de mer l'emporte encore en longueur que par sa longueur la supérieure, qu'elle entoure, et qui se termine entre ses deux branches, que nous venons d'indiquer, de soixante-deux centimètres. L'inférieure n'a, vers le bout du museau,

surface très-étendue, presque carrée, et presque verticale. C'est dans la surface inférieure de ce cube immense, mais imparfait, que l'on voit l'ouverture de la bouche, étroite, longue, un peu plus reculée que le bout du museau, et fermée à la volonté du cachalot par la mâchoire d'en-bas, comme par un vaste couvercle renversé.

Cette mâchoire d'en-bas est donc évidemment plus courte que celle d'en-haut. Nous avons dans le Muséum national d'histoire naturelle les deux mâchoires d'un cachalot macrocéphale. La supérieure a cinq mètres quatre-vingt-douze centimètres de longueur; l'inférieure n'est longue que de quatre mètres quatre-vingt-six centimètres.

Mais la mâchoire d'en-haut du macrocéphale l'emporte encore plus par sa largeur que par sa longueur sur celle d'en-bas, qu'elle entoure, et qui s'emboîte entre ses deux branches. Celle du cachalot que nous venons d'indiquer, a un mètre soixante-deux centimètres de large: l'inférieure n'a, vers le bout du museau, que

38 HISTOIRE NATURELLE


trente-deux centimètres de largeur; et ses deux branches, en s'écartant, ne forment qu'un angle de quarante degrés *.

Chaque branche de la mâchoire d'en-bas a quelquefois cependant un tiers de mètre d'épaisseur. La chair des gencives est ordinairement très-blanche, dure comme de la corne, revêtue d'une sorte d'écorce profondément ridée, et ne peut être détachée de l'os qu'après avoir éprouvé pendant plusieurs heures une ébullition des plus forte.

Le nombre des dents qui garnissent de chaque côté la mâchoire d'en-bas, est de vingt-trois, suivant le professeur Gmelin; il étoit de vingt-quatre dans l'individu dont une partie de la charpente osseuse est conservée dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris; il étoit de vingt-cinq dans un autre individu examiné par Anderson; et selon plusieurs écrivains, il varie depuis vingt-trois jusqu'à trente.

* La figure de cette mâchoire inférieure a été gravée dans les planches de l'*Encyclopédie méthodique*, sous la direction du citoyen Bonnaterre, *Cétologie*, pl. 6, fig. 3.


Tam. II.



1. Mâchoire supérieure et la tête d'un CACHALOT
2. Mâchoire inférieure d'un Macrocephale

E NATURELLE
mètres de largeur; et
n s'écartant, ne forme
uarante degrés*.
e de la mâchoire d
s cependant un tiers
. La chair des genciv
nt très-blanche, de
e, revêtue d'une sorte
ent ridée, et ne peut
qu'après avoir épro
s heures une ébullit

dents qui garnissent
âchoire d'en-bas, est
nt le professeur Gmel
-quatre dans l'indivi
de la charpente osse
ns le Muséum d'histe
s; il étoit de vingt-c
individu examiné
on plusieurs écrivain
ingt-trois jusqu'à tre
ue mâchoire inférieure
ches de l'Encyclopédie
ection du citoyen Bonnau
g. 3.



1. Mâchoire supérieure et autres parties de
la tête d'un CACHALOT *Macrocephale*.
2. Mâchoire inférieure d'un CACHALOT
Macrocephale?

DES CACH

On ne peut plus douter
ne dépende de l'âge d
croisse avec cet âge : n
remarquer avec le sava
dans les cétacées, la
formée dans l'alvéole;
qu'en pénétrant dans
mâchoire s'accroît en se
son bout postérieur. C
qu'il paroît de nouvelle
que l'animal se dévelop
que dans les cétacées, e
dans le macrocéphale,
mâchoire supérieure se
profonds qu'ils sont plu
museau.

Ces dents sont fortes,
recourbées vers l'intéri
Les deux premières et le
de chaque rangée sont
grosses et plus pointue
Elles ont à l'extérieu
dureté de l'ivoire; m
l'intérieur, plus tendr
On a écrit qu'elles dev
gues, plus grosses, et p


On ne peut plus douter que ce nombre ne dépende de l'âge du cétacée, et ne croisse avec cet âge : mais nous devons remarquer avec le savant Hunter, que, dans les cétacées, la dent paroît toute formée dans l'alvéole; elle ne s'allonge qu'en pénétrant dans la gencive. La mâchoire s'accroît en se prolongeant par son bout postérieur. C'est vers le gosier qu'il paroît de nouvelles dents à mesure que l'animal se développe; et de là vient que dans les cétacées, et particulièrement dans le macrocéphale, les alvéoles de la mâchoire supérieure sont d'autant plus profonds qu'ils sont plus près du bout du museau.

Ces dents sont fortes, coniques, un peu recourbées vers l'intérieur de la gueule. Les deux premières et les quatre dernières de chaque rangée sont quelquefois moins grosses et plus pointues que les autres. Elles ont à l'extérieur la couleur et la dureté de l'ivoire; mais elles sont, à l'intérieur, plus tendres et plus grises. On a écrit qu'elles devenoient plus longues, plus grosses, et plus recourbées, à

mesure que le cétacée vieillit. Lorsqu'elles n'ont encore qu'un sixième de mètre de longueur, leur circonférence est d'un douzième de mètre à l'endroit où elles ont le plus de grosseur. La mâchoire supérieure présente autant d'alvéoles qu'il y a de dents à la mâchoire d'en-bas. Ces alvéoles reçoivent, lorsque la bouche se ferme, la partie de ses dents qui dépasse les gencives; et presque à la suite de chacune de ces cavités, on découvre une dent petite, pointue à son extrémité, située horizontalement, et dont on voit à peine, au-dessus de la chair, une surface plane, unie et oblique.


La langue est charnue, un peu mobile, d'un rouge livide, et remplit presque tout le fond de la gueule.

L'œil est situé plus haut que dans plusieurs grands cétacées. On le voit au-dessus de l'espace qui sépare l'ouverture de la gueule, de la base de la pectorale, et à une distance presque égale de cet espace et du sommet de la tête. Il est noirâtre, entouré de poils très-ras et très-difficiles à découvrir. Cet organe n'a



1.1. Vertèbres d'un CACHALOT.
2. une des premières côtes
Macrocéphale.

NATURELLE
 née vieillit. Lorsque
 an sixième de mètre
 circonférence est é
 re à l'endroit où e
 seur. La mâchoire
 autant d'alvéoles q
 mâchoire d'en-bas.
 , lorsque la bouche
 le ses dents qui dépe
 presque à la suite
 vités, on découvre
 tue à son extrémi
 ment, et dont on v
 s de la chair, une
 et oblique.
 arnue, un peu mob
 , et remplit presq
 a gueule.
 lus haut que dans p
 ncées. On le voit a
 qui sépare l'ouvert
 a base de la pectora
 presque égale de
 met de la tête. Il
 de poils très-rés
 couvrir. Cet organe



1. 1. Vertèbres d'un CACHALOT Macrocéphale
 2. une des premières côtes d'un CACHALOT
 Macrocéphale.



DES CACHA

d'ailleurs qu'un très-petit
Anderson assure que, c'est
de cette espèce, poussé
une forte tempête en d
qui avoit plus de vingt
longueur, le cristallin
gros seur d'une balle de

Au reste, nous devons
avec soin que l'œil du
placé au sommet d'une
ou de bosse, peu sens
mais qui cependant s'élève
de la surface de la tête,
seau n'empêche pas cet o
les rayons lumineux réfr
jets placés devant le céta
ces objets soient un peu
le capitaine Colnett dit-
de son voyage, que le cac
proie sans être obligé d
axe de sa tête et de son
le long de laquelle il s'

On a peine à disting
conduit auditif. Il est co
une sorte d'excroissance
l'œil et le bras ou la na

d'ailleurs qu'un très-petit diamètre ; et Anderson assure que , dans un individu de cette espèce , poussé dans l'Elbe par une forte tempête en décembre 1720 , et qui avoit plus de vingt-trois mètres de longueur , le cristallin n'étoit que de la grosseur d'une balle de fusil.

Au reste , nous devons faire remarquer avec soin que l'œil du macrocéphale est placé au sommet d'une sorte d'éminence ou de bosse , peu sensible à la vérité , mais qui cependant s'élève assez au-dessus de la surface de la tête , pour que le museau n'empêche pas cet organe de recevoir les rayons lumineux réfléchis par les objets placés devant le cétacée , pourvu que ces objets soient un peu éloignés. Aussi le capitaine Colnett dit-il dans la relation de son voyage , que le cachalot poursuit sa proie sans être obligé d'incliner le grand axe de sa tête et de son corps sur la ligne le long de laquelle il s'avance.

On a peine à distinguer l'orifice du conduit auditif. Il est cependant situé sur une sorte d'excroissance de la peau , entre l'œil et le bras ou la nageoire pectorale.

42 HISTOIRE NATURELLE

Les deux évents aboutissent à une même ouverture, dont la largeur est souvent d'un sixième de mètre. L'animal lance avec force, et à une assez grande hauteur, l'eau qu'il fait jaillir par cet orifice. Mais ce fluide, au lieu de s'élever verticalement, décrit une courbe dirigée en avant, et par conséquent, au lieu de retomber sur les évents, lorsque le cachalot est en repos, retombe dans la mer, à une distance plus ou moins grande de l'extrémité du museau. Cet effet vient de la direction des évents et de la position de leur orifice. Ces tuyaux forment une diagonale qui part du fond du palais, traverse l'intérieur de la tête, et se rend à l'extrémité supérieure du bout du museau, où elle se termine par une ouverture inclinée à l'horizon. L'eau lancée par cette ouverture et par ces tuyaux inclinés tend à s'élever dans l'atmosphère dans la même direction; et sa pesanteur, qui la ramène sans cesse vers la surface de la mer, doit alors lui faire décrire une parabole en avant du tube dont elle est partie.

DES CACHALOTS

Le macrocéphale n'est pas servit d'évents pour respirer, vent que la baleine franche; coup plus long-temps sous l'eau doit croire, d'après le capitaine, que plus il est grand, et moi d'ailleurs, il vient fréquemment face de l'océan.

La nuque est indiquée dans par une légère dépression, sur chaque côté jusqu'à la nuchale.

Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'élève insensiblement une callosité longitudinale, qui se tronque par-derrière, et qui figure d'un triangle rectangle.

Le ventre est gros et arrondi, dont la longueur est souvent plus grande que celle de la tête, est conique, et son diamètre vers la caudale, est très-mobilité.

Une gaine enveloppe la ventre et c'est dans une cavité longue de près d'un demi-mètre de longueur, chacune des deux mamelles

Le macrocéphale n'est pas obligé de se servir d'évents pour respirer, aussi souvent que la baleine franche : il reste beaucoup plus long-temps sous l'eau ; et l'on doit croire, d'après le capitaine Colnett, que plus il est grand, et moins, tout égal d'ailleurs, il vient fréquemment à la surface de l'océan.

La nuque est indiquée dans ce cétacée par une légère dépression, qui s'étend de chaque côté jusqu'à la nageoire pectorale.

Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'élève insensiblement une sorte de callosité longitudinale, que l'on croiroit tronquée par-derrière, et qui présente la figure d'un triangle rectangle très-allongé.

Le ventre est gros et arrondi. La queue, dont la longueur est souvent inférieure à celle de la tête, est conique, d'un très-petit diamètre vers la caudale, et par conséquent très-mobile.

Une gaine enveloppe la verge du mâle ; et c'est dans une cavité longitudinale de près d'un demi-mètre de longueur, que chacune des deux mamelles de la femelle

est cachée, et placée comme dans une sorte d'abri. La mamelle et le mamelon n'ont ensemble qu'une longueur d'un sixième de mètre ou à peu près; mais ils s'allongent, et la mamelle devient pendante, lorsque la mère allaite son petit.

La graisse ou le lard que l'on trouve au-dessous de la peau, a près de deux décimètres d'épaisseur. La chair est d'un rouge pâle.

On a écrit que le diamètre de l'aorte du macrocéphale étoit souvent d'un tiers de mètre, et qu'à chaque systole il sort du cœur de ce cétacée près de cinquante litres de sang.

Les sept vertèbres du cou, ou du moins les six dernières, sont soudées ensemble; elles sont réunies par une sorte d'ankilose, qui cependant n'empêche pas de les distinguer toutes, et de voir que les cinq intermédiaires sont très-minces *. Cette particularité contribue à montrer pourquoi le cachalot ne remue pas la tête sans mouvoir le corps.

* *Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier, rédigées par C. Duméril, etc. tome I, p. 154 et 163.*

On ignore encore le nombre des vertèbres dorsales et caudales du macrocéphale; mais on conserve, dans les collections d'anatomie comparée du Muséum, une queue naturelle, trente-trois vertèbres, dont la hauteur est de centimètres, et la largeur de centimètres.

Anderson ayant examiné la queue du cachalot macrorhynchus, qui avoit vingt-trois mètres de longueur, et dont nous avons parlé dans l'Elbe, et dont nous avons dit qu'il trouva que les vertèbres dorsales étoient, réunies les unes aux autres par des cartilages souples, devenus très-mobiles.

On peut voir aussi, dans le Muséum, deux vraies côtes de cachalot que nous tâchons de bien décrire. Elles sont comprimées, et ont la longueur d'un tiers de leur longueur, et les deux extrémités dont la distance en ligne droite est de centimètres, et articulées de manière à former, avec celles du macrocéphale, un angle de quatre-vingt environ.

On ignore encore le nombre des vertèbres dorsales et caudales du macrocéphale; mais on conserve, dans les galeries d'anatomie comparée du Muséum d'histoire naturelle, trente-trois de ces vertèbres, dont la hauteur est de dix-huit centimètres, et la largeur de vingt-un.

Anderson ayant examiné le bout de la queue du cachalot macrocéphale de vingt-trois mètres de longueur, pris dans l'Elbe, et dont nous avons déjà parlé, trouva que les vertèbres qui la soutenoient, réunies les unes aux autres par des cartilages souples, devoient avoir été très-mobiles.

On peut voir aussi, dans les galeries du Muséum, deux *vraies* côtes du cachalot que nous tâchons de bien connoître. Elles sont comprimées, courbées dans un tiers de leur longueur, terminées par deux extrémités dont la distance mesurée en ligne droite est de cent treize centimètres, et articulées de manière qu'elles forment, avec celles du côté opposé, un angle de quatre-vingt-dix degrés ou environ.

E NATURELLE
accée comme dans
mamelle et le mam
qu'une longueur
ou à peu près; mai
mamelle devient p
mère allaite son p
e lard que l'on tra
peau, à près de de
seur. La chair est d

le diamètre de l'ao
étoit souvent d'un ti
chaque systole il
acée près de cinquai

s du cou, ou du mo
sont soudées ensemb
ar une sorte d'ankilo
mpêche pas de les d
de voir que les ei
t très-minces *. Ce
ibue à montrer po
ne remue pas la t
orps.

ie comparée de G. Cur
il, etc. tome I, p. 154 et s

M. Chappuis de Quimper écrivit dans le temps à mon savant collègue Faujas de Saint-Fond, que des cachalots macrocéphales échoués sur la côte de Bretagne n'avoient que huit côtes de chaque côté, et que la longueur de ces côtes étoit de cent soixante-cinq centimètres.

L'os du front, très-étroit de devant en arrière, ressemble, dans le cachalot, comme dans tous les cétacées, à une bande transversale qui s'étend de chaque côté jusqu'à l'orbite, dont il compose le plafond; mais il descend moins bas dans le macrocéphale que dans plusieurs autres de ces mammifères, parce que l'œil y est plus élevé, ainsi que nous venons de le voir.

Si nous considérons le bras, nous trouverons que les deux os de l'avant-bras, le *cubitus* et le *radius*, sont aplatis, et articulés avec l'*humerus* et avec le carpe, de manière à n'avoir pas de mouvemens particuliers, au moins très-sensibles; que les phalanges des doigts sont également aplaties; et que toutes les parties qui composent le bras, sont réunies et recouvertes

de manière à former une nageoire un peu ovale, ordinairement de plus d'un mètre, plus d'un décimètre.

La nageoire de la queue se compose de deux lobes dont chacun est en forme de faux. Le bout d'une nageoire est souvent éloigné de l'extrémité du corps, de près de cinq mètres.

Le dos du macrocéphale est d'un noirâtre, quelquefois mêlé de grisâtre ou de nuances grises; la partie supérieure de la tête est aussi la partie supérieure du corps, teinte d'un brun et tachetée de blanc.

Le ventre du macrocéphale est d'un blanc châtre. Sa peau a la douceur

Nous avons déjà dit que la nageoire pouvoit être de plus de vingt fois sa circonférence, à l'endroit où elle se joint au corps, est alors à peu près dix-sept mètres; sa plus grande largeur est même quelquefois supérieure à sa longueur. Mais nous ne pouvons terminer la description de ce cétacée qu'après

de manière à former une véritable nageoire un peu ovale, ordinairement longue de plus d'un mètre, et épaisse de plus d'un décimètre.

La nageoire de la queue se divise en deux lobes dont chacun est échancré en forme de faux. Le bout d'un de ces lobes est souvent éloigné de l'extrémité de l'autre, de près de cinq mètres.

Le dos du macrocéphale est noir ou noirâtre, quelquefois mêlé de reflets verdâtres ou de nuances grises; on a vu aussi la partie supérieure d'individus de cette espèce, teinte d'un bleu d'ardoise et tachetée de blanc.

Le ventre du macrocéphale est blanchâtre. Sa peau a la douceur de la soie.

Nous avons déjà dit que sa longueur pouvoit être de plus de vingt-trois mètres: sa circonférence, à l'endroit le plus gros de son corps, est alors au moins de dix-sept mètres; sa plus grande hauteur est même quelquefois supérieure ou du moins égale au tiers de sa longueur totale.

Mais nous ne pouvons terminer la description de ce cétacée qu'après avoir parlé

48 HISTOIRE NATURELLE

de deux substances remarquables qu'on trouve dans son intérieur, ainsi que dans celui de presque tous les autres cachalots. L'une de ces deux substances est celle qui est connue dans le commerce sous le nom impropre de *blanc de baleine*; et l'autre est l'*ambre gris*.

Que la première soit d'abord l'objet de notre examen.

La tête du cachalot macrocéphale, cette tête si grande, si grosse, si élevée même dans celle de ses portions qui saille le plus en avant, renferme, dans sa partie supérieure, une cavité très-vaste et très-distincte de celle qui contient le cerveau, et qui est très-petite. Le capitaine Colnett nous dit, dans la relation de son voyage, que dans un macrocéphale pris auprès de la côte occidentale du Mexique en août 1793, cette cavité occupoit près du quart de la totalité de la tête. Elle étoit inclinée en avant, s'avançoit d'un côté jusqu'au bout du museau, et, de l'autre, s'étendoit jusqu'au-delà des yeux. On peut voir la position, la forme et la grandeur de cette cavité, dans la tête du

DES CACHALOTS
macrocéphale, qui a près de
long, que l'on conserve d'
d'histoire naturelle, que
graver, et dont l'os front
manière à laisser appercev
vide.

Cette cavité est recouverte
tégumens, par la peau de
une couche de graisse ou
décimètre au moins d'épa
une membrane dont le ca
dit que la couleur est no
laquelle on voit de très-g

La calotte solide que
quand on a enlevé ces tég
ou moins dure, suivant l'
mais il paroît que, tout
elle est toujours plus dure
céphale que dans d'autres
chalots qui produisent du
nous parlerons bientôt.

La cavité est divisée en
portions par une membrane
nerfs et étendue horizon

* Voyage to the south A

macrocéphale, qui a près de six mètres de long, que l'on conserve dans le Muséum d'histoire naturelle, que nous avons fait graver, et dont l'os frontal a été scié de manière à laisser appercevoir cet énorme vide.

Cette cavité est recouverte par plusieurs tégumens, par la peau du cétacée, par une couche de graisse ou de lard d'un décimètre au moins d'épaisseur, et par une membrane dont le capitaine Colnett dit que la couleur est noire *, et dans laquelle on voit de très-gros nerfs.

La calotte solide que l'on découvre quand on a enlevé ces tégumens, est plus ou moins dure, suivant l'âge du cétacée; mais il paroît que, tout égal d'ailleurs, elle est toujours plus dure dans le macrocéphale que dans d'autres espèces de cachalots qui produisent du *blanc*, et dont nous parlerons bientôt.

La cavité est divisée en deux grandes portions par une membrane parsemée de nerfs et étendue horizontalement. Ces

* *Voyage to the south Atlantic, etc.*

50 HISTOIRE NATURELLE

deux portions sont traversées obliquement par les évents : elles sont d'ailleurs inégales. La supérieure est la moins grande : l'inférieure , qui est située au-dessus du palais , a quelquefois plus de deux mètres et demi de hauteur. Il n'est donc pas surprenant qu'on retire souvent de ces deux cavités , lesquelles ont été comparées à des *cavernes* , plus de dix-huit ou même vingt tonneaux de blanc liquide. Mais cette substance fluide n'est pas contenue uniquement dans ces deux grands espaces. Chacune de ces vastes cavernes est séparée en plusieurs compartimens , formés par des membranes verticales , dont on a considéré la nature comme semblable à celle de la pellicule intérieure d'un œuf d'oiseau , et c'est dans ces compartimens qu'on trouve le *blanc*. Cette matière est liquide pendant la vie de l'animal ; elle est encore fluide lorsqu'on l'extrait peu de temps après la mort du cétacée. A mesure néanmoins qu'elle se refroidit , elle se coagule : si elle est mêlée avec une certaine quantité d'huile , il faut un refroidissement plus

DES CACHA
considérable pour la fixer
a perdu sa fluidité , elle
vant M. Hunter , à la p
du melon d'eau. Elle est
on a cependant écrit qu
étoient quelquefois altérée
vraisemblablement par la
l'état de l'individu. Deve
elle est cristalline et brilla
matière huileuse , que l'on
du cerveau , mais qui ex
par sa place , et très-di
nature , de la substance
blanc que l'on retire de l
rieure de la grande cavit
veut moins pur que celui
inférieure ; mais on amèn
à un très-haut degré de
séparant , à l'aide de la
certaine quantité d'huile
en le soumettant à plus
cristallisations et pression
est alors cristallise en la
brillantes et argentines.
particulière et fade , très
guer de celle que donn

considérable pour la fixer; et lorsqu'elle a perdu sa fluidité, elle ressemble, suivant M. Hunter, à la pulpe intérieure du *melon d'eau*. Elle est très-blanche: on a cependant écrit que ses nuances étoient quelquefois altérées par le climat, vraisemblablement par la nourriture et l'état de l'individu. Devenue concrète, elle est cristalline et brillante. C'est une matière huileuse, que l'on trouve autour du cerveau, mais qui est très-distincte par sa place, et très-différente par sa nature, de la substance médullaire. Le blanc que l'on retire de la portion supérieure de la grande cavité, est très-souvent moins pur que celui de la portion inférieure; mais on amène l'un et l'autre à un très-haut degré de pureté, en le séparant, à l'aide de la presse, d'une certaine quantité d'huile qui l'altère, et en le soumettant à plusieurs fusions, cristallisations et pressions successives. Il est alors cristallisé en lames blanches, brillantes et argentines. Il a une odeur particulière et fade, très-facile à distinguer de celle que donne la rancidité.

Lorsqu'on l'écrase, il se change en une poussière blanche, encore lamelleuse et brillante, mais onctueuse et grasse. On le fond à une température plus basse que la cire, mais à une température plus élevée que la graisse ordinaire. Mis en contact avec un corps incandescent, il s'enflamme, brûle sans pétillement, répand une flamme vive et claire, et peut être employé avec d'autant plus d'avantage à faire des bougies, que lorsqu'il est en fusion, il ne tache pas les étoffes sur lesquelles il tombe, mais s'en sépare par le frottement, sous la forme d'une poussière.

Un canal, que l'on a nommé très-improprement *veine spermatique*, communique avec la cavité qui contient le blanc du cachalot. Très-gros du côté de cette cavité, il s'en éloigne avec la moelle épinière, et se divise en un très-grand nombre de petits vaisseaux, qui, s'étendant jusqu'aux extrémités du cétacée, distribuent dans toutes les parties de l'animal la substance blanche et liquide que nous examinons. Ce canal se vide

DES CACHALOT
dans la cavité de la tête, à
retire le blanc de cette cavité
tance fluide qui sort de ce
remplace, pendant quelque
celui qu'on puise dans la
On trouve aussi, dans
macrocéphale, de petits in
plis de blanc. Lorsqu'on
ces loges particulières, e
bientôt de celui des loges
proche en proche, tous
reçoivent un nouveau fl
vient du grand canal d
épinière est accompagnée
longueur.

Il y a donc dans le cachalot
duquel cet article est con
tème général de vaisseaux
tenir et à transmettre le
système a beaucoup de
sa composition, dans
dans son étendue et dans
occupe, avec l'ensemble
cerveau, la moelle épini
proprement dits.

Il ne faut donc pas ét

dans la cavité de la tête, à mesure qu'on retire le blanc de cette cavité; et la substance fluide qui sort de ce gros vaisseau, remplace, pendant quelques momens, celui qu'on puise dans la tête.

On trouve aussi, dans la graisse du macrocéphale, de petits intervalles remplis de *blanc*. Lorsqu'on a vidé une de ces loges particulières, elle se remplit bientôt de celui des loges voisines; et de proche en proche, tous ces interstices reçoivent un nouveau fluide, qui provient du grand canal dont la moelle épinière est accompagnée dans toute sa longueur.

Il y a donc dans le cachalot à l'histoire duquel cet article est consacré, un système général de vaisseaux propres à contenir et à transmettre le blanc, lequel système a beaucoup de rapports, dans sa composition, dans sa distribution, dans son étendue et dans la place qu'il occupe, avec l'ensemble formé par le cerveau, la moelle épinière et les nerfs proprement dits.

Il ne faut donc pas être étonné qu'on

retire du corps et de la queue du macrocéphale une quantité de blanc égale, ou à peu près, à celle que l'on trouve dans sa tête, et que cette substance soit d'un égal degré de pureté dans les différentes parties du cétacée.

Pour empêcher que ce blanc ne s'altère et n'acquière une teinte jaune, on le conserve dans des vases fermés avec soin. Des commerçans infidèles l'ont quelquefois mêlé avec de la cire; mais en le faisant fondre on s'apperçoit aisément de la falsification de cette substance.

Pour achever de la faire connoître, nous ne pouvons mieux faire que de présenter une partie de l'analyse qu'on en peut voir dans le grand et bel ouvrage de notre eélébre et savant collègue Fourcroy *.

« Quand on distille le blanc à la cornue,
 » on ne le décompose qu'avec beaucoup
 » de difficulté : lorsqu'il est fondu et
 » bouillant, il passe presque tout entier

* *Système des connoissances chimiques*, tome X, p. 299. et suiv.

DES CACHALOTS

» et sans altération dans l'air
 » ne donne ni eau, ni acide
 » ses produits n'ont pas l'odeur
 » ceux des graisses. Cependant
 » de ce corps gras se sépare
 » turée, puisqu'elle est à
 » liquide; et si on le distille
 » de suite, on parvient à
 » plètement huileux, liquide
 » cible. Malgré l'espèce d'acidité
 » éprouve dans ces distillations
 » le blanc n'a point acquis
 » de volatilité qu'il n'en ait
 » suivant le citoyen Thénard
 » degré de chaleur pour le
 » dans la première opération
 » laquelle il se convertit
 » plus l'odeur vive et pénétrante
 » qu'on retire des autres
 » males traitées de la même
 » distillation du blanc avec
 » lente, d'après le chimiste
 » n'offre rien de remarquable
 » cette espèce de décoction
 » louche; filtrée et évaporée
 » un peu de matière muqueuse

de la queue du macr
tité de blanc égale, e
que l'on trouve de
ette substance soit d'
été dans les différen

que ce blanc ne s'altè
teinte jaune, on
vases fermés avec soie
nfidèles l'ont quelque
la cire; mais en le fai
perçoit aisément de la
le substance.

e la faire connoître,
mieux faire que de
tie de l'analyse qu'on
le grand et bel ou
bre et savant collègue

le le blanc à la cornue
se qu'avec beaucoup
rsqu'il est fondu et
se presque tout entier

issances chimiques, tome

» et sans altération dans le récipient; il
» ne donne ni eau, ni acide sébacique;
» ses produits n'ont pas l'odeur forte de
» ceux des graisses. Cependant une partie
» de ce corps grassex est déjà déna-
» turée, puisqu'elle est à l'état d'huile
» liquide; et si on le distille plusieurs fois
» de suite, on parvient à l'obtenir com-
» plètement huileux, liquide et inconcres-
» cible. Malgré l'espèce d'altération qu'il
» éprouve dans ces distillations répétées,
» le blanc n'a point acquis encore plus
» de volatilité qu'il n'en avoit; et il faut,
» suivant le citoyen Thouvenel, le même
» degré de chaleur pour le volatiliser que
» dans la première opération. L'huile dans
» laquelle il se convertit, n'a pas non
» plus l'odeur vive et pénétrante de celles
» qu'on retire des autres matières ani-
» males traitées de la même manière. La
» distillation du blanc avec l'eau bouil-
» lante, d'après le chimiste déjà cité,
» n'offre rien de remarquable. L'eau de
» cette espèce de décoction est un peu
» louche; filtrée et évaporée, elle donne
» un peu de matière muqueuse et amère

» pour résidu. Le blanc, traité par ébul-
 » lition dans l'eau, devient plus solide et
 » plus soluble dans l'alcool qu'il ne l'est
 » dans son état naturel.

» Exposé à l'air, le blanc devient jaune
 » et sensiblement rance. Quoique sa ranci-
 » dité soit plus lente que celle des graisses
 » proprement dites, et quoique son odeur
 » soit alors moins sensible que dans ces
 » dernières, en raison de celle qu'il a
 » dans son état frais, ce phénomène y est
 » cependant assez marqué pour que les
 » médecins aient fait observer qu'il falloit
 » en rejeter alors l'emploi. Il se combine
 » avec le phosphore et le soufre par la
 » fusion; il n'agit pas sur les substances
 » métalliques.

» Les acides nitrique et muriatique
 » n'ont aucune action sur lui. L'acide
 » sulfurique concentré le dissout en mo-
 » difiant sa couleur, et l'eau le sépare
 » de cette dissolution, comme elle préci-
 » pite le camphre de l'acide nitrique;
 » l'acide sulfureux le décolore et le
 » blanchit; l'acide muriatique oxigéné le
 » jaunit, et ne le décolore pas quand

» il a pris naturellement

» Les lessives d'alcalis fixes

» au blanc liquéfié, en le me-

» savonneux : cette espèce

» sèche et devient friable; sa

» dans l'eau est plus louche

» mogène que celle des savon-

» Bouilli dans l'eau avec l'

» de plomb, le blanc forme

» emplastique, dure et cas-

» Les huiles fixes se combi-

» tement avec cette substance

» à l'aide d'une douce chaleur

» pas plus la séparer de ces

» que les graisses et la cir-

» volatiles dissolvent égale-

» et mieux même qu'elle

» graisses proprement dite

» dissout en le faisant cha-

» sépare une grande partie

» dissement; et lorsque cel

» le blanc se cristallise en

» L'éther en opère la diss-

» plus promptement et l'

» que l'alcool; il l'enlève u

» et il en retient une plus g

» il a pris naturellement cette nuance.

» Les lessives d'alcalis fixes s'unissent
» au blanc liquéfié, en le mettant à l'état
» savonneux : cette espèce de savon se
» sèche et devient friable ; sa dissolution
» dans l'eau est plus louche et moins ho-
» mogène que celle des savons communs.

» Bouilli dans l'eau avec l'oxide rouge
» de plomb, le blanc forme une masse
» emplastique, dure et cassante.

» Les huiles fixes se combinent promp-
» tement avec cette substance grasseuse,
» à l'aide d'une douce chaleur ; on ne peut
» pas plus la séparer de ces combinaisons,
» que les graisses et la cire. Les huiles
» volatiles dissolvent également le blanc,
» et mieux même qu'elles ne font les
» graisses proprement dites. L'alcool le
» dissout en le faisant chauffer : il s'en
» sépare une grande partie par le refroi-
» dissement ; et lorsque celui-ci est lent,
» le blanc se cristallise en se précipitant.
» L'éther en opère la dissolution encore
» plus promptement et plus facilement
» que l'alcool ; il l'enlève même à celui-ci,
» et il en retient une plus grande quantité.

» On peut aussi faire cristalliser très-
 » régulièrement le blanc , si , après l'avoir
 » dissous dans l'éther à l'aide de la chaleur
 » douce que la main lui communique,
 » on le laisse refroidir et s'évaporer à
 » l'air. La forme qu'il prend alors est celle
 » d'écailles blanches, brillantes et argen-
 » tées comme l'acide boracique, tandis
 » que le suif et le beurre de cacao, traités
 » de même, ne donnent que des espèces
 » de mamelons opaques et groupés, ou
 » des masses grenues irrégulières. »

Comment ne pas penser maintenant, avec notre collègue Fourcroy, que le blanc du cachalot est une substance très-particulière, et qu'il peut être regardé comme ayant avec les huiles fixes les mêmes rapports que le camphre avec les huiles volatiles, tandis que la cire paroît être à ces mêmes huiles fixes ce que la résine est à ces huiles volatiles ?

Mais nous avons dit souvent qu'il n'existoit pas dans la nature de phénomène entièrement isolé. Aucune qualité n'a été attribuée à un être d'une manière exclusive. Les causes s'enchaînent comme

DES CACHALOT
 les effets; elles sont rappro-
 de manière à former des ser-
 rompues de nuances succe-
 rité, la lumière de la science
 encore toutes ces gradations
 ne pouvons pas appercevoir
 comme s'il n'existoit pas,
 quoi nous croyons voir des
 des phénomènes; voilà po-
 sommes portés à supposer d
 des facultés uniques, des pro-
 sives, des forces circonscrites
 ces démarcations ne sont qu'
 que le grand jour de la scie-
 elles n'existent que dans
 manières de voir. Nous ne
 pas penser qu'une substance
 n'appartienne qu'à quelque
 Quelque limitée qu'une ma-
 roisse, nous devons être
 bornes fantastiques disparo-
 sure que nos erreurs se diss-
 retrouvera plus ou moins
 plus ou moins modifiée, et
 voisins ou éloignés des pre-
 ront présentée. Nous en a-vo-

aire cristalliser très blanc, si, après l'avoir à l'aide de la chaleur lui communiqué, il prend alors est celle, brillantes et argente boracique, tant que de cacao, traitant que des espèces et groupés, et irrégulières.

Je pense maintenant à Fourcroy, que c'est une substance très pure il peut être regardé comme les huiles fixes et le camphre avec les huiles fixes ce que les huiles volatiles?

On dit souvent que la nature de phénomènes est isolée. Aucune qualité n'est d'une manière s'enchaînent comme

DES CACHALOTS. 59

les effets; elles sont rapprochées et liées de manière à former des séries non interrompues de nuances successives. A la vérité, la lumière de la science n'éclaire pas encore toutes ces gradations. Ce que nous ne pouvons pas appercevoir est pour nous comme s'il n'existoit pas, et voilà pourquoi nous croyons voir des vides autour des phénomènes; voilà pourquoi nous sommes portés à supposer des faits isolés, des facultés uniques, des propriétés exclusives, des forces circonscrites. Mais toutes ces démarcations ne sont que des illusions que le grand jour de la science dissipera; elles n'existent que dans nos fausses manières de voir. Nous ne devons donc pas penser qu'une substance particulière n'appartienne qu'à quelques êtres isolés. Quelque limitée qu'une matière nous paraisse, nous devons être sûrs que ses bornes fantastiques disparaîtront à mesure que nos erreurs se dissiperont. On la retrouvera plus ou moins abondante, ou plus ou moins modifiée, dans des êtres voisins ou éloignés des premiers qui l'auront présentée. Nous en avons une preuve

frappante dans le blanc du cachalot : pendant long-temps on l'a cru un produit particulier de l'organisation du macrocéphale. Mais continuons d'écouter Fourcroy, et nous ne douterons plus que cette substance ne soit très-abondante dans la Nature. Une des sources les plus remarquables de cette matière, est dans le corps et particulièrement dans la tête du cachalot macrocéphale; mais nous verrons bientôt que d'autres cétacées le produisent aussi. Il est même tenu en dissolution dans la graisse huileuse de tous les cétacées. L'huile de baleine franche ou d'autres baleines, à laquelle on a donné dans le commerce le nom impropre d'*huile de poisson*, dépose dans les vaisseaux où on la conserve, une quantité plus ou moins grande de *blanc*, entièrement semblable à celui du cachalot. La véritable huile de poisson, celle qu'on extrait du foie et de quelques autres parties de vrais poissons, donne le même blanc, qui s'en précipite lorsque l'huile a été pendant long-temps en repos, et qui se cristallise en se séparant de cette huile. Les habitans des mers, soit ceux

qui ont reçu des poumonnelles, soit ceux qui montent les chies et des ovaires, produisent le blanc dont nous recherchons. Mais continuons.

Fourcroy nous dit encore qu'il y a une substance analogue à celle des calculs biliaires, dans les bilies de plusieurs malades. Le renchyme du foie exposé pendant quelque temps à l'air et desséché, donne un blanc qui se sont putréfiés sous l'eau ou de terre humide. Les blancs conservés au milieu de l'eau dans plusieurs autres organes, sont moins décomposés. Il n'est pas difficile de clarifier que le *blanc* dont nous parlons, a les propriétés, est un des produits les plus ordinaires et les plus constants des animaux altérés.

Observons cependant que le blanc est une substance blanche et remarquable dans les animaux terrestres ne putréfiés, lorsque leurs organes ou leur organisation ordinaire des ani-

qui ont reçu des poumons et des mamelles, soit ceux qui montrent des branchies et des ovaires, produisent donc ce blanc dont nous recherchons l'origine.

Mais continuons.

Fourcroy nous dit encore qu'il a trouvé une substance analogue au blanc dans les calculs biliaires, dans les déjections bilieuses de plusieurs malades, dans le parenchyme du foie exposé pendant longtemps à l'air et desséché, dans les muscles qui se sont putréfiés sous une couche d'eau ou de terre humide, dans les cerveaux conservés au milieu de l'alcool, et dans plusieurs autres organes plus ou moins décomposés. Il n'hésite pas à déclarer que le *blanc* dont nous étudions les propriétés, est un des produits les plus constans et les plus ordinaires des composés animaux altérés.

Observons cependant que cette substance blanche et remarquable, que les animaux terrestres ne produisent que lorsque leurs organes ou leurs fluides sont viciés, est le résultat habituel de l'organisation ordinaire des animaux marins,

le signe de leur force constante, et la preuve de leur santé accoutumée, plutôt que la marque d'un dérangement accidentel, ou d'une altération passagère.

Observons encore, en rappelant et en réunissant dans notre pensée toutes les propriétés que l'analyse a fait découvrir dans le blanc du cachalot, que cette matière participe aux qualités des substances animales et à celles des substances végétales. C'est un exemple de plus de ces liens secrets qui unissent tous les corps organisés, et qui n'ont jamais échappé aux esprits attentifs.

Combien de raisons n'avons-nous pas, par conséquent, pour rejeter les dénominations si erronées de *blanc de baleine*, de *substance médullaire de cétacée*, de *substance cervicale*, de *sperma ceti* (sperme de cétacée), etc. et d'adopter pour le blanc le nom d'*adipocire*, proposé par Fourcroy*, et qui montre que ce blanc, différent de la graisse et de la cire, tient cependant le milieu entre ces deux substances, dont

* *Système des connoissances chimiques*, tome X, page 302, édit. in-8°.

DES CACHALOTS
l'une est animale, et l'autre
En adoptant la dénomination
devons à Fourcroy, nous cha-
dont on s'est servi pour désigner
longitudinal qui accompagne
épinière du macrocéphale, et
à la grande cavité de la tête de
Au lieu de l'expression si fautive
spermatique, nous emploierons
canal adipocireux.

On a beaucoup vanté les vertus
adipocire pour la guérison
maux internes et extérieurs.
de Douarnenez, que nous avons
au sujet des trente-un cachalots
sur les côtes de la ci-devant
1784, a écrit dans le temps
Bonnaterre : « Le blanc, etc. est
» souverain pour les plaies re-
» sieurs ouvriers occupés à
» cachalots échoués dans la
» dierne, en ont éprouvé l'efficacité
» gré la profondeur de leurs
Mais rapportons encore l'avis
notre collègue Fourcroy. « L'usage
» cinal de cette substance

l'une est animale, et l'autre végétale ?

En adoptant la dénomination que nous devons à Fourcroy, nous changerons celle dont on s'est servi pour désigner le canal longitudinal qui accompagne la moelle épinière du macrocéphale, et qui aboutit à la grande cavité de la tête de ce cachalot. Au lieu de l'expression si fautive de *veine spermatique*, nous emploierons celle de *canal adipocireux*.

On a beaucoup vanté les vertus de cette *adipocire* pour la guérison de plusieurs maux internes et extérieurs. M. Chappuis de Douarnenez, que nous avons déjà cité au sujet des trente-un cachalots échoués sur les côtes de la ci-devant Bretagne en 1784, a écrit dans le temps au professeur Bonnaterre : « Le *blanc*, etc. est un onguent » souverain pour les plaies récentes ; plusieurs ouvriers occupés à dépecer les » cachalots échoués dans la baie d'Audierne, en ont éprouvé l'efficacité, malgré la profondeur de leurs blessures. »

Mais rapportons encore les paroles de notre collègue Fourcroy. « L'usage médical de cette substance (*l'adipocire*)

64 HISTOIRE NATURELLE

» ne mérite pas les éloges qu'on lui pro-
 » diguoit autrefois dans les affections ca-
 » tarrhales, les ulcères des poumons, des
 » reins, les péripneumonies, etc. : à plus
 » forte raison est-il ridicule de le compter
 » parmi les vulnéraires, les balsamiques,
 » les détersifs, les consolidans, vertus qui
 » d'ailleurs sont elles-mêmes le produit
 » de l'imagination. Le citoyen Thouvenel
 » en a examiné avec soin les effets dans
 » les catarrhes, les rhumes, les rhuma-
 » tismes goutteux, les toux gutturales,
 » où on l'a beaucoup vanté; et il n'a rien
 » vu qui pût autoriser l'opinion avanta-
 » geuse qu'on en avoit conçue. Il n'en
 » a pas vu davantage dans les coliques
 » néphrétiques, les tranchées de femmes
 » en couche, dans lesquelles on l'avoit
 » beaucoup recommandé. Il l'a cependant
 » observé sur lui-même, en prenant ce
 » médicament à la fin de deux rhumes
 » violens, à une dose presque décuple de
 » celle qu'on a coutume d'en prescrire;
 » il a eu constamment une accélération
 » du pouls et une moiteur sensible. Il faut
 » observer qu'en restant dans le lit, cette

DES CACHALOTS
 » seule circonstance, jointe à
 » ce médicament inspire, à
 » l'effet qu'il annonce. Aussi
 » sonnes, à qui il l'a donné
 » ont-elles eu des pesanteurs
 » et des vomissemens, qu'on
 » soin de faire mêler le blanc
 » (l'adipocire) fondu dans l'huile
 » jaune d'œuf et le sirop, en
 » ainsi à l'état d'une espèce
 » n'a jamais retrouvé ce
 » excréments; ce qui prouve
 » sorbé par les vaisseaux la
 » s'en faisoit une véritable

Ajoutons à tout ce qu'on
 au sujet de l'adipocire, que ce
 est si distincte du cerveau, qu'elle
 le dessus de la tête du malade
 qu'on parvienne jusqu'à ce
 tacée ne donne souvent au
 sensibilité, au lieu qu'il ex
 atteint la substance cérébrale

* Recherches du docteur Swediaur
 dans les Transactions philosophiques
 en françois par M. Vigenère
 cine. — Journal de physique,

» seule circonstance, jointe au dégoût que
 » ce médicament inspire, a pu influencer sur
 » l'effet qu'il annonce. Aussi plusieurs per-
 » sonnes, à qui il l'a donné à forte dose,
 » ont-elles eu des pesanteurs d'estomac
 » et des vomissemens, quoiqu'il ait eu le
 » soin de faire mêler le blanc de baleine
 » (*l'adipocire*) fondu dans l'huile, avec le
 » jaune d'œuf et le sirop, en le réduisant
 » ainsi à l'état d'une espèce de crème. Il
 » n'a jamais retrouvé ce corps dans les
 » excréments; ce qui prouve qu'il étoit ab-
 » sorbé par les vaisseaux lactés, et qu'il
 » s'en faisoit une véritable digestion. »

Ajoutons à tout ce qu'on vient de lire
 au sujet de *l'adipocire*, que cette substance
 est si distincte du cerveau, que si l'on perce
 le dessus de la tête du macrocéphale, et
 qu'on parvienne jusqu'à ce blanc, le cé-
 tacée ne donne souvent aucun signe de
 sensibilité, au lieu qu'il expire lorsqu'on
 atteint la substance cérébrale *.

* *Recherches du docteur Swediawer*, publiées
 dans les *Transactions philosophiques*, et traduites
 en françois par M. Vigarous, docteur en méde-
 cine. — *Journal de physique*, octobre, 1784.

Le macrocéphale produit cependant, ainsi que nous l'avons dit, une seconde substance recherchée par le commerce : cette seconde substance est l'*ambre gris*. Elle est bien plus connue que l'adipocire, parce qu'elle a été consacrée au luxe, adoptée par la sensualité, célébrée par la mode, pendant que l'adipocire n'a été regardée que comme utile.

L'ambre gris est un corps opaque et solide. Sa consistance varie suivant qu'il a été exposé à un air plus chaud ou plus froid. Ordinairement néanmoins il est assez dur pour être cassant. A la vérité, il n'est pas susceptible de recevoir un beau poli, comme l'ambre jaune ou le succin; mais lorsqu'on le frotte, sa rudesse se détruit, et sa surface devient aussi lisse que celle d'un savon très-compacte, ou même de la stéatite. Si on le racle avec un couteau, il adhère, comme la cire, au tranchant de la lame. Il conserve aussi, comme la cire, l'impression des ongles ou des dents. Une chaleur modérée le ramollit, le rend onctueux, le fait fondre en huile épaisse

et noirâtre, fumer et se volatiliser en degrés, en entier, et sans charbon, mais en laissant à la surface une tache noire, lorsqu'il se voit en métal. Si ce métal est rouge, il fond, s'enflamme, se boursouffle et s'évapore avec rapidité, sans laisser aucun résidu, sans laisser de sa combustion. Approchée d'une allumée, cet ambre prend feu et sume en répandant une flamme. Une aiguille rougie le pénètre, et en huile noirâtre, et par conséquent est retirée, comme si on l'avait tirée dans de la cire fondue.

L'humidité, ou au moins l'humidité, peut ramollir l'ambre gris par la chaleur. En effet, en parcourant le *Journal de physique*, du mois de mai 1790, que M. Donadei, capitaine de Champagne, et très-instruit, avoit trouvé dans l'Océan atlantique, dans le golfe de Gascogne, un morceau d'ambre gris, du poids de près d'une livre, et qui, mou et vis-

et noirâtre, fumer et se volatiliser par degrés, en entier, et sans produire du charbon, mais en laissant à sa place une tache noire, lorsqu'il se volatilise sur du métal. Si ce métal est rouge, l'ambre se fond, s'enflamme, se boursouffle, fume, et s'évapore avec rapidité sans former aucun résidu, sans laisser aucune trace de sa combustion. Approché d'une bougie allumée, cet ambre prend feu et se consume en répandant une flamme vive. Une aiguille rougie le pénètre, le fait couler en huile noirâtre, et paroît, lorsqu'elle est retirée, comme si on l'avoit trempée dans de la cire fondue.

L'humidité, ou au moins l'eau de la mer, peut ramollir l'ambre gris, comme la chaleur. En effet, on peut voir dans le *Journal de physique*, du mois de mars 1790, que M. Donadei, capitaine au régiment de Champagne, et observateur très-instruit, avoit trouvé sur le rivage de l'Océan atlantique, dans le fond du golfe de Gascogne, un morceau d'ambre gris, du poids de près d'un hectogramme, et qui, mou et visqueux, acquit

bientôt de la solidité et de la dureté.

L'ambre dont nous nous occupons est communément d'une couleur grise, ainsi que son nom l'annonce; il est d'ailleurs parsemé de taches noirâtres, jaunâtres ou blanchâtres. On trouve aussi quelquefois de l'ambre d'une seule couleur, soit blanchâtre, soit grise, soit jaune, soit brune, soit noirâtre.

Peut-être devoit-on croire, d'après plusieurs observations, que ses nuances varient avec sa consistance.

Son goût est fade; mais son odeur est forte, facile à reconnoître, agréable à certaines personnes, désagréable et même nuisible et insupportable à d'autres. Cette odeur se perfectionne, et, pour ainsi dire, se purifie, à mesure que l'ambre gris vieillit, se dessèche et se durcit; elle devient plus pénétrante et cependant plus suave, lorsqu'on frotte et lorsqu'on chauffe le morceau qui la répand; elle s'exalte par le mélange de l'ambre avec d'autres aromates; elle s'altère et se vicie par la réunion de cette même substance avec d'autres corps; et c'est ainsi qu'on

DES CACHALOTS
pourroit expliquer l'odeur d'
que répandoit l'ambre gris tr
bords du golfe de Gascogne
nadei, et qui se dissipa qu
après que ce physicien l'eut
L'ambre gris est si léger
non seulement sur la mer,
sur l'eau douce.

Il se présente en boules sèches
unes montrent dans leur cassure
grenu; d'autres sont formées
presque concentriques de dilata-
tions, et qui se brisent en

Le grand diamètre de ces boules
ordinairement depuis un
qu'à un tiers de mètre; et
depuis un jusqu'à quinze
Mais on a vu des morceaux
grosseur bien supérieure. Les
des Indes de France en 1755, une
de l'Orient, en 1755, une
qui pesoit soixante-douze
Un pêcheur américain d'Alaska
dans le ventre d'un cétacé
diamètres au sud-est des Indes
morceau d'ambre pesant

pourroit expliquer l'odeur d'alcali volatil que répandoit l'ambre gris trouvé sur les bords du golfe de Gascogne par M. Donadei, et qui se dissipa quelque temps après que ce physicien l'eut ramassé.

L'ambre gris est si léger, qu'il flotte non seulement sur la mer, mais encore sur l'eau douce.

Il se présente en boules irrégulières : les unes montrent dans leur cassure un tissu grenu ; d'autres sont formées de couches presque concentriques de différentes épaisseurs, et qui se brisent en écailles.

Le grand diamètre de ces boules varie ordinairement depuis un douzième jusqu'à un tiers de mètre ; et leur poids, depuis un jusqu'à quinze kilogrammes. Mais on a vu des morceaux d'ambre d'une grosseur bien supérieure. La compagnie des Indes de France exposa à la vente de l'Orient, en 1755, une boule d'ambre qui pesoit soixante-deux kilogrammes. Un pêcheur américain d'Antigoa a trouvé dans le ventre d'un cétacée, à seize myriamètres au sud-est des îles du vent, un morceau d'ambre pesant soixante-cinq

kilogrammes, et qu'il a vendu 500 livres sterling. La compagnie des Indes orientales de Hollande a donné *onze mille rix-dalers* à un roi de Tidor pour une masse d'ambre gris, du poids de quatre-vingt-onze kilogrammes. Nous devons dire cependant que rien ne prouve que ces masses n'aient pas été produites artificiellement par la fusion, la réunion et le refroidissement gradué de plusieurs boules ou morceaux naturels. Mais quoi qu'il en soit, l'état de mollesse et de liquidité que plusieurs causes peuvent donner à l'ambre gris, et qui doit être son état primitif, explique comment ce corps odorant peut se trouver mêlé avec plusieurs substances très-différentes de cet aromate, telles que des fragmens de végétaux, des débris de coquilles, des arêtes ou d'autres parties de poisson.

Mais, indépendamment de cette introduction accidentelle et extraordinaire de corps étrangers dans l'ambre gris, cette substance renferme presque toujours des *becs* ou plutôt des mâchoires du mollusque auquel Linné a donné le nom de

DES CACHALOT
sepia octopodia, et que mon
 que le citoyen Lamarck a p
 genre auquel il a donné le n
 Ce sont ces mâchoires, ou
 mens, qui produisent ces :a
 tres, noirâtres ou blanchâtr
 breuses sur l'ambre gris.

On a publié différentes op
 production de cet aromate. L
 turalistes l'ont regardé comm
 comme une huile minérale,
 sorte de pétrole. Épaissi p
 du soleil et durci par un l
 milieu de l'eau salée, avalé p
 macrocéphale ou par d'aut
 et soumis aux forces ains
 digestifs de son estomac, i
 dans l'intérieur de ces anim
 ration plus ou moins gran
 chimistes, tels que Geoffroy
 Grim et Brow ont adopté c
 parce qu'ils ont retiré de
 quelques produits analogu
 bitumes. Cette substance l
 par l'analyse, une liqueur
 acide concret, de flui

sepia octopodia, et que mon savant collègue le citoyen Lamarck a placé dans un genre auquel il a donné le nom d'*octopode*. Ce sont ces mâchoires, ou leurs fragmens, qui produisent ces taches jaunâtres, noirâtres ou blanchâtres, si nombreuses sur l'ambre gris.

On a publié différentes opinions sur la production de cet aromate. Plusieurs naturalistes l'ont regardé comme un bitume, comme une huile minérale, comme une sorte de pétrole. Épaissi par la chaleur du soleil et durci par un long séjour au milieu de l'eau salée, avalé par le cachalot macrocéphale ou par d'autres cétacées, et soumis aux forces ainsi qu'aux suc digestifs de son estomac, il éprouveroit dans l'intérieur de ces animaux une altération plus ou moins grande. D'habiles chimistes, tels que Geoffroy, Neumann, Grim et Brow ont adopté cette opinion, parce qu'ils ont retiré de l'ambre gris quelques produits analogues à ceux des bitumes. Cette substance leur a donné, par l'analyse, une liqueur acide, un sel acide concret, de l'huile et un résidu

charbonneux. Mais , comme l'observe notre collègue Fourcroy , ces produits appartiennent à beaucoup d'autres substances qu'à des bitumes. De plus , l'ambre gris est dissoluble , en grande partie , dans l'alcool et dans l'éther ; sa dissolution est précipitée par l'eau comme celle des résines , et les bitumes sont presque insolubles dans ces liquides.

D'autres naturalistes , prenant les fragmens de mâchoires de mollusque disséminés dans l'ambre gris pour des portions de becs d'oiseau , ont pensé que cette substance provenoit d'excrémens d'oiseaux qui avoient mangé des herbes odoriférentes.

Quelques physiciens n'ont considéré l'ambre gris que comme le produit d'une sorte d'écume rendue par des phoques , ou un excrément de crocodile.

Pomet , Lémery , et Forney de Berlin , ont cru que ce corps n'étoit qu'un mélange de cire et de miel , modifié par le soleil et par les eaux de la mer , de manière à répandre une odeur très-suave.

Dans ces dernières hypothèses , des céta-
cées auroient avalé des morceaux d'ambre

gris entraînés par les vagues sur la surface de l'océan : et le résultat d'un bitume , ou de miel , ou d'écume de fiente d'oiseau , ou d'excrément de crocodile , roulé par les flots de rivage en rivage pendant une longue mollesse , auroit pu rencontrer et s'attacher plusieurs substances étrangères , et particulièrement des débris d'oiseaux , de poissons , de testacées.

Des physiciens plus rapides de vérité ont dit , avec *Clusius* , que l'ambre gris étoit une substance animale trouvée dans l'estomac d'un certain animal , et qu'elle étoit une sorte de bézoard. *Dudley* a rapporté dans les *Transactions philosophiques* , que l'ambre étoit une substance comparable au musc ou au castoreum , et qu'elle se formoit dans un sac par lequel l'animal étoit au-dessus des testicules , et que ce sac étoit plein d'une substance analogue par sa consistance à de la cire , et de couleur d'orange foncée , et très-peu différente de celle des céta-
cées.

gris entraînés par les vagues et flottant sur la surface de l'océan; et cet aromate, résultat d'un bitume, ou composé de cire et de miel, ou d'écume de phoque, ou de fiente d'oiseau, ou d'excrémens de crocodile, roulé par les flots et transporté de rivage en rivage pendant son état de mollesse, auroit pu rencontrer, retenir et s'attacher plusieurs substances étrangères, et particulièrement des dépouilles d'oiseaux, de poissons, de mollusques, de testacées.

Des physiciens plus rapprochés de la vérité ont dit, avec *Clusius*, que l'ambre gris étoit une substance animale produite dans l'estomac d'un cétacée, comme une sorte de bézoard. Dudley a écrit, dans les *Transactions philosophiques*, tome XXIII, que l'ambre étoit une production semblable au *musc* ou au *castoreum*, et qui se formoit dans un sac particulier, placé au-dessus des testicules d'un cachalot; que ce sac étoit plein d'une liqueur analogue par sa consistance à de l'huile, d'une couleur d'orange foncée, et d'une odeur très-peu différente de celle des morceaux

d'ambre qui nageoient dans ce fluide huileux ; que l'ambre sortoit de ce sac par un conduit situé le long du pénis ; et que les cétacées mâles pouvoient seuls le contenir.

D'autres auteurs ont avancé que ce sac n'étoit que la vessie de l'urine, et que les boules d'ambre étoient des concrétions analogues aux pierres que l'on trouve dans la vessie de l'homme et de tant d'animaux : mais le savant docteur Svediaur a fait remarquer avec raison, dans l'excellent travail qu'il a publié sur l'ambre gris *, que l'on trouve des morceaux de cet aromate dans les cachalots femelles comme dans les mâles, et que les boules qu'elles renferment sont seulement moins grosses et souvent moins recherchées. Il a montré que la formation de l'ambre dans la vessie, et l'existence d'un sac particulier, étoient entièrement contraires aux résultats de l'observation ; il a fait voir que ce prétendu sac n'est autre chose que le cœcum du macrocéphale, lequel

* *Transactions philosophiques.*

cœcum a plus d'un mètre de long et après avoir rappelé qu'Kempfer, l'ambre gris, non japonais excrément de baleine (sic), étoit en effet un excrément de cétacée, il a exposé la vérité de cette substance singulière et la démontrent des faits bien connus.

L'ambre gris se trouve dans le cœcum du macrocéphale, à l'issue de l'anus, qui varie entre un et deux mètres. Il est parsemé de filaments et de mâchoires du mollusque non parce que le cachalot macrocéphale se nourrit principalement de ce mollusque et que ces mâchoires sont d'une substance de corne qui ne peut pas être dissoute.

Il n'est qu'un produit de la digestion du cachalot ; mais ce résultat n'est que dans certaines circonstances et ne se trouve pas par conséquent chez tous les individus. Il faut, pour qu'il y ait une cause quelconque de formation d'ambre, une maladie assez grave, une inflammation forte, qui se détermine dans le cœcum, et un glissement extraordinaire,

cæcum a plus d'un mètre de longueur; et après avoir rappelé que, suivant Kœmpfer, l'ambre gris, nommé par les Japonois *excrément de baleine* (*kusura no fu*), étoit en effet un excrément de ce cétacée, il a exposé la véritable origine de cette substance singulière, telle que la démontrent des faits bien constatés.

L'ambre gris se trouve dans le canal intestinal du macrocéphale, à une distance de l'anús, qui varie entre un et plusieurs mètres. Il est parsemé de fragmens de mâchoires du mollusque nommé *seiche*, parce que le cachalot macrocéphale se nourrit principalement de ce mollusque, et que ces mâchoires sont d'une substance de corne qui ne peut pas être digérée.

Il n'est qu'un produit des excréments du cachalot; mais ce résultat n'a lieu que dans certaines circonstances, et ne se trouve pas par conséquent dans tous les individus. Il faut, pour qu'il existe, qu'une cause quelconque donne au cétacée une maladie assez grave, une constipation forte, qui se dénote par un affoiblissement extraordinaire, par une sorte

d'engourdissement et de torpeur, se termine quelquefois d'une manière funeste à l'animal par un abcès à l'abdomen, altère les excréments, et les retient pendant un temps assez long pour qu'une partie de ces substances se ramasse, se coagule, se modifie, se consolide, et présente enfin les propriétés de l'ambre gris.

L'odeur de cet ambre ne doit pas étonner. En effet, les déjections de plusieurs mammifères, tels que les bœufs, les porcs, etc. répandent, lorsqu'elles sont gardées pendant quelque temps, une odeur semblable à celle de l'ambre gris. D'ailleurs, on peut observer, avec Romé de Lille *, que les mollusques dont se nourrit le macrocéphale, et dont la substance fait la base des excréments de ce cétacée, répandent pendant leur vie, et même après qu'ils ont été desséchés, des émanations odorantes très-peu différentes de celles de l'ambre, et que ces émanations sont très-remarquables dans

* *Journal de physique*, novembre 1784.

DES CACHALOTS
l'espèce de ces mollusques qui
soit des Grecs anciens, soit d
modernes, les noms de *cajan*
com, los, com, los et *musc* etc. pa
sent le musc *.

L'ambre gris est donc une po
excréments du cachalot macr
d'autres cétacées, endurcie par
d'une maladie, et mêlée avec
parties d'alimens non digérés
pandu dans le canal intestinal
ou morceaux irréguliers, dont
est quelquefois de quatre ou d

Les pêcheurs exercés conna
cachalot qu'ils ont sous les ye
de l'ambre gris.

Lorsqu'après l'avoir harpo
voient rejeter tout ce qu'il a
tomac, et se débarrasser très
ment de toutes ses matières
assurent qu'ils ne trouveront
gris dans son corps : mais le
présente des signes d'engour

* Rondelet, *Histoire des poissons*
partie, liv. 17, chap. 6. — Tru
poulpe.

l'espèce de ces mollusques qui a reçu, soit des Grecs anciens, soit des Grecs modernes, les noms de *eledone*, *bolitaine*, *osmylos*, *osmylios* et *moschites*, parce qu'elle sent le musc *.

L'ambre gris est donc une portion des excréments du cachalot macrocéphale ou d'autres cétacées, endurcie par les suites d'une maladie, et mêlée avec quelques parties d'alimens non digérés. Il est répandu dans le canal intestinal en boules ou morceaux irréguliers, dont le nombre est quelquefois de quatre ou de cinq.

Les pêcheurs exercés connoissent si le cachalot qu'ils ont sous les yeux contient de l'ambre gris.

Lorsqu'après l'avoir harponné ils le voient rejeter tout ce qu'il a dans l'estomac, et se débarrasser très-promptement de toutes ses matières fécales, ils assurent qu'ils ne trouveront pas d'ambre gris dans son corps : mais lorsqu'il leur présente des signes d'engourdissement et

* *Rondelet, Histoire des poissons*, première partie, liv. 17, chap. 6. — Troisième espèce de poulpe.

de maladie, qu'il est maigre, qu'il ne rend pas d'excrémens, et que le milieu de son ventre forme une grosse protubérance, ils sont surs que ses intestins contiennent l'ambre qu'ils cherchent. Le capitaine Colnett dit, dans la relation de son voyage, que, dans certaines circonstances, l'on coupe la queue et une partie du corps du cachalot, de manière à découvrir la cavité du ventre, et qu'on s'assure alors facilement de la présence de l'ambre gris, en sondant les intestins avec une longue perche.

Mais de quelque manière qu'on ait reconnu l'existence de cet ambre dans l'individu harponné, ou trouvé mort en flottant sur la surface de la mer, on lui ouvre le ventre, en commençant par l'anus, et en continuant jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objet de sa recherche.

Quelle est donc la puissance du luxe, de la vanité, de l'intérêt, de l'imitation et de l'usage! Quels voyages on entreprend, quels dangers on brave, à quelle cruauté on se condamne, pour obtenir une matière vile, un objet dégoûtant,

mais que le caprice et le desir de vanances privilégiées ont su mettre en aromate précieux!

L'ambre contenu dans le tinal du macrocéphale n'a pas le degré de dureté que celui de l'océan, ou que les vagues déposent sur le rivage : dans l'instant où on coupe le corps du cétacée, il a la couleur et l'odeur des excréments de l'animal à un si haut degré qu'il n'en est distingué que par un moins de mollesse; mais, en se desséchant, il acquiert bientôt la consistance d'une matière dure et d'une odeur forte et suave qui le caractérise.

On a vu de ces morceaux d'ambre traînés, par les mouvemens du vent, sur les côtes du Japon, de la Chine, des Moluques, de l'Hollande occidentale*, de l'Inde, des Maldives, de l'Afrique orientale et occidentale.

* Auprès de la rivière de la Chine, dans le manuscrit du naturaliste L. Baudin, (voir les couvertes.)

mais que le caprice et le désir des jouissances privilégiées ont su métamorphoser en aromate précieux !

L'ambre contenu dans le canal intestinal du macrocéphale n'a pas le même degré de dureté que celui qui flotte sur l'océan, ou que les vagues ont rejeté sur le rivage : dans l'instant où on le retire du corps du cétacée, il a même encore la couleur et l'odeur des véritables excréments de l'animal à un si haut degré, qu'il n'en est distingué que par un peu moins de mollesse ; mais, exposé à l'air, il acquiert bientôt la consistance et l'odeur forte et suave qui le caractérisent.

On a vu de ces morceaux d'ambre entraînés, par les mouvemens de l'océan, sur les côtes du Japon, de la mer de Chine, des Moluques, de la Nouvelle-Hollande occidentale *, du grand golfe de l'Inde, des Maldives, de Madagascar, de l'Afrique orientale et occidentale, du

* Auprès de la rivière des Cygnes. (Journal manuscrit du naturaliste Levilain, embarqué avec le capitaine Baudin, pour une expédition de découvertes.)

Mexique occidental, des îles Gallapagos, du Brésil, des îles Bahama, de l'île de la Providence, et même à des latitudes plus éloignées de la ligne, dans le fond du golfe de Gascogne, entre l'embouchure de l'Adour et celle de la Gironde, où M. Donadei a reconnu cet aromate, et où, dix ans auparavant, la mer en avoit rejeté une masse du poids de quarante kilogrammes. Ces morceaux d'ambre délaissés sur le rivage sont, pour les pêcheurs, des indices presque toujours assurés du grand nombre de cachalots qui fréquentent les mers voisines. Et en effet, le golfe de Gascogne, ainsi que l'a remarqué le citoyen Donadei, termine cette portion de l'Océan atlantique septentrional qui baigne les bancs de Terre-Neuve, autour desquels naviguent beaucoup de cachalots, et qu'agitent si souvent des vents qui soufflent de l'est et poussent les flots contre les rivages de France. D'un autre côté, le citoyen Levilain a vu non seulement une grande quantité d'ossemens de cétacée gisans sur les bords de la Nouvelle-Hollande, auprès

DES CACHALOTS
de morceaux d'ambre gris, dans la mer voisine peuplée d'un grand nombre de cétacées, et bouleversée par des tempêtes horribles, qui tent sans cesse vers la côte des amoncelées; et c'est d'après l'habitude de trouver beaucoup d'ambre auprès des rives où l'on a ramassé des morceaux d'ambre, que la culière du macrocéphale et des cétacées, auprès de Madagascar, le temps proposée en Angleterre.
L'ambre gris, gardé pendant plusieurs mois, se couvre, comme le fer, d'une poussière grisâtre. Malheureusement de cette décomposition, on ne peut souvent profiter par le commerce, qu'autant qu'on le falsifie communément avec des fleurs de riz, du safran, et des résines*. Il peut aussi être purifié par les sucs digestifs de plusieurs plantes d'eau qui l'avalent, et le fait beaucoup changer ses propriétés.

* Mémoire du docteur Swediaur.

de morceaux d'ambre gris, mais encore la mer voisine peuplée d'un grand nombre de cétacées, et bouleversée pendant l'hiver par des tempêtes horribles, qui précipitent sans cesse vers la côte les vagues amoncelées; et c'est d'après cette certitude de trouver beaucoup de cachalots auprès des rives où l'on avoit vu des morceaux d'ambre, que la pêche particulière du macrocéphale et d'autres cétacées, auprès de Madagascar, a été dans le temps proposée en Angleterre.

L'ambre gris, gardé pendant plusieurs mois, se couvre, comme le chocolat, d'une poussière grisâtre. Mais, indépendamment de cette décomposition naturelle, on ne peut souvent se le procurer par le commerce, qu'altéré par la fraude. On le falsifie communément en le mêlant avec des fleurs de riz, du styrax ou d'autres résines *. Il peut aussi être modifié par les sucs digestifs de plusieurs oiseaux d'eau qui l'avalent, et le rendent sans beaucoup changer ses propriétés; et le

* *Mémoire du docteur Swediawer, déjà cité.*

82 HISTOIRE NATURELLE

citoyen Donadei a écrit que les habitans de la côte qui borde le golfe de Gascogne, appeloient *renardé* l'ambre dont la nuance étoit noire ; que, suivant eux, on ne trouvoit cet ambre noir que dans des forêts voisines du rivage, mais élevées au-dessus de la portée des plus hautes vagues ; et que cette variété d'ambre tenoit sa couleur particulière des forces intérieures des renards, qui étoient très-avides d'ambre gris, n'en altéroient que foiblement les fragmens, et cependant ne les rendoient qu'après en avoir changé la couleur.

L'ambre gris a été autrefois très-recommandé en médecine. On l'a donné en substance ou en *teinture alcoolique*. On s'en est servi pour l'*essence d'Hofmann*, pour la *teinture royale* du *codex* de Paris, pour des *trochisques* de la pharmacopée de Wirtemberg, etc. On l'a regardé comme stomachique, cordial, antispasmodique. On a cité des effets surprenans de cette substance dans les maladies convulsives les plus dangereuses, tels que le tétanos et l'hydrophobie. Le docteur Swediawer

DES CACHALOT

rapporte que cet aromate a été employé pour un marin qui en avoit décagramme et demi après l'avoir brûlé au feu. Dans plusieurs contrées de l'Asie et de l'Afrique, on en fait usage dans la cuisine, suivant Swediawer. Les pèlerins de Jérusalem en achètent une grande quantité pour l'offrir à la place de l'encens. On a aussi recours à cet aromate, comme aphrodisiaque.

Mais il est principalement employé pour les parfums : il en est un des plus fréquemment employés. On le mêle avec le musc, qu'il atténue, et il tempère les effets au point de donner une odeur plus douce et plus agréable. C'est enfin une des substances les plus divisibles, puisque la plus petite quantité d'ambre suffit pour parfumer pendant un très-long un espace très-grand.

Lorsque le docteur Swediawer étoit à son travail, l'ambre gris se vendoit à Londres pour trois sterling les trois décagrammes ; et le citoyen Donadei, l'ambre gris, du golfe de Gascogne, étoit vendu,

rapporte que cet aromate a été très-purgatif pour un marin qui en avoit pris un décagramme et demi après l'avoir fait fondre au feu. Dans plusieurs contrées de l'Asie et de l'Afrique, on en fait un grand usage dans la cuisine, suivant le docteur Swediawer. Les pélerins de la Mecque en achètent une grande quantité, pour l'offrir à la place de l'encens. Les Turcs ont recours à cet aromate, comme à un aphrodisiaque.

Mais il est principalement recherché pour les parfums : il en est une des bases les plus fréquemment employées. On le mêle avec le musc, qu'il atténue, et dont il tempère les effets au point d'en rendre l'odeur plus douce et plus agréable. Et c'est enfin une des substances les plus divisibles, puisque la plus petite quantité d'ambre suffit pour parfumer pendant un temps très-long un espace très-étendu *.

* Lorsque le docteur Swediawer a publié son travail, l'ambre gris se vendoit à Londres une livre sterling les trois décagrammes; et, suivant le citoyen Donadei, l'ambre gris, trouvé sur les côtes du golfe de Gascogne, étoit vendu, en 1790, à peu

Ne cessons cependant pas de parler de l'ambre gris sans faire observer que l'altération qui produit cet aromate, n'a lieu que dans les cétacées dont la tête, le corps et la queue, organisés d'une manière particulière, renferment de grandes masses d'adipocire; et il semble que l'on a voulu indiquer cette analogie en donnant à l'adipocire le nom d'*ambre blanc*, sous lequel cette matière blanche a été connue dans plusieurs pays.

Nous venons d'examiner les deux substances singulières que produit le cachalot macrocéphale; continuons de rechercher les attributs et les habitudes de cette espèce de cétacée.

Il nage avec beaucoup de vitesse. Plus vif que plusieurs baleines, et même que le norcaper, ne le cédant par sa masse qu'à la baleine franche, il n'est pas surprenant qu'il réunisse une grande force aux armes terribles qu'il a reçues. Il

près le même prix dans le commerce, où on le regardoit comme apporté des grandes Indes, quoique les pêcheurs n'en vendissent le même poids à Bayonne ou à Bordeaux que 5 ou 6 francs.

s'élance au-dessus de la surface avec plus de rapidité que le par un élan plus élevé. Un on prit en 1715 auprès Sardaigne, et qui n'avoit seize mètres de longueur, coup de queue une grosse laquelle on l'avoit attaché à et lorsqu'on eut doublé la la coupa pas, mais il entra en arrière, quoiqu'elle fût un vent favorable.

Il est vraisemblable qu'il pèce du macrocéphale. Ce ce n'est pas étranger à la Méditerranée. Les anciens n'en ont pas eu ce idée nette. Il paroît même qu'excepter Plin ni Aristote, bien distingué les formes ni les des grands cétacées, malgré de plusieurs de ces énormes dans la Méditerranée, et même signemens que leurs relations avec les Indes pour en tirer sur plusieurs autres. Nous ont appliqué à leur m.

s'élance au-dessus de la surface de l'océan avec plus de rapidité que les baleines, et par un élan plus élevé. Un cachalot que l'on prit en 1715 auprès des côtes de Sardaigne, et qui n'avoit encore que seize mètres de longueur, rompit d'un coup de queue une grosse corde, avec laquelle on l'avoit attaché à une barque; et lorsqu'on eut doublé la corde, il ne la coupa pas, mais il entraîna la barque en arrière, quoiqu'elle fût poussée par un vent favorable.

Il est vraisemblable qu'il étoit de l'espèce du macrocéphale. Ce cétacée en effet n'est pas étranger à la Méditerranée. Les anciens n'en ont pas eu cependant une idée nette. Il paroît même que, sans en excepter Pline ni Aristote, ils n'ont pas bien distingué les formes ni les habitudes des grands cétacées, malgré la présence de plusieurs de ces énormes animaux dans la Méditerranée, et malgré les renseignemens que leurs relations commerciales avec les Indes pouvoient leur procurer sur plusieurs autres. Non seulement ils ont appliqué à leur *mysticetus* des

36 HISTOIRE NATURELLE

organes, des qualités ou des gestes du rorqual aussi-bien que de la baleine franche, mais encore ils ont attribué à leur baleine des formes ou des propriétés du gibbar, du rorqual et du cachalot macrocéphale; et ils ont composé leur *physalus*, des traits de ce même macrocéphale mêlés avec ceux du gibbar. Au reste, on ne peut mieux faire, pour connoître les opinions des anciens au sujet des cétacées, que de consulter l'excellent ouvrage du savant professeur Schneider sur les synonymes des cétacées et des poissons, recueillis par Artédi.

Mais la Méditerranée n'est pas la seule mer intérieure dans laquelle pénètre le macrocéphale : il appartient même à presque toutes les mers. On l'a reconnu dans les parages du Spitzberg; auprès du cap Nord et des côtes de Finmarck; dans les mers du Groenland; dans le détroit de Davis; dans la plus grande partie de l'Océan atlantique septentrional; dans le golfe britannique, auprès de l'embouchure de l'Elbe, dans lequel un macrocéphale fut poussé par une violente tempête,

DES CACHALOT
moura et périt, en décembre
Terre-Neuve; aux environ
non loin du cap de Bonne
près du canal de Mozambique
Mascare et de l'île de France;
qui baigne les rivages occi
la Nouvelle-Hollande, où il
figuré parmi ces troupes d'in
et grands cétacées que le
Levilain a vu attirer des pétr
contre les vagues furieuses,
lancer avec force, poursuiv
sons, et se presser auprès de
Lewin, de la rivière des Cy
la baie des Chiens-marins,
gner la navigation; vers le
Nouvelle-Zélande²; près du
rientes du golfe de la Cal
de distance de Guatimala, où
Colnett rencontra une légion
¹ Voyez, dans l'article de la
ce que nous avons dit, d'après le
Colnett, d's troupes de pétr
et des plus grands cétacées.
² Lettre du capitaine Baudin.
Jussieu.

échoua et périt, en décembre 1720; auprès de Terre-Neuve; aux environs de Bayonne, non loin du cap de Bonne-Espérance; près du canal de Mosambique, de Madagascar et de l'île de France; dans la mer qui baigne les rivages occidentaux de la Nouvelle-Hollande, où il doit avoir figuré parmi ces troupes d'innombrables et grands cétacées que le naturaliste Levilain a vu attirer des pétrels¹, lutter contre les vagues furieuses, bondir, s'élançer avec force, poursuivre des poissons, et se presser auprès de la terre de Lewin, de la rivière des Cygnes, et de la baie des Chiens-marins, au point de gêner la navigation; vers les côtes de la Nouvelle-Zélande²; près du cap de Corrientes du golfe de la Californie; à peu de distance de Guatimala, où le capitaine Colnett rencontra une légion d'individus

¹ Voyez, dans l'article de la *baleine franche*, ce que nous avons dit, d'après le capitaine anglois Colnett, des troupes de pétrels qui accompagnent celles des plus grands cétacées.

² Lettre du capitaine Baudin à mon collègue Jussieu.

de cette espèce; autour des îles Gallapagos; à la vue de l'île Mocha et du Chili, où, suivant le même voyageur, la mer paroissoit couverte de cachalots; dans la mer du Brésil, et enfin auprès de notre Finisterre.

En 1784, trente-deux macrocéphales échouèrent sur la côte occidentale d'Audierne, sur la grève nommée *Très-Couaren*. Le professeur Bonnaterre a publié dans l'*Encyclopédie méthodique*, au sujet de ces cétacées, des détails intéressans qu'il devoit à MM. Bastard, Chappuis le fils et Derrien, et à M. Lecoq, mon ancien collègue à la première assemblée législative de France, et maintenant archevêque de Besançon. Le 13 mars, on vit avec surprise une multitude de poissons se jeter à la côte, et un grand nombre de marsouins entrer dans le port d'Audierne. Le 14, à six heures du matin, la mer étoit fort grosse; et les vents souffloient du sud-ouest avec violence. On entendit vers le cap Estain des mugissemens extraordinaires, qui retentissoient dans les terres à plus de quatre kilomètres. Deux hommes,

DES CACHALOTS
côtoyoient alors le rivage
de frayeur, sur-tout lorsqu'ils
perçurent un peu au large de
normes, qui s'agitoient avec
efforçoient de résister aux
vagues qui les rouloient et
toient vers la côte, battant
ment les flots soulevés, à cou
de leur large queue, et reprenant
vivacité par leurs éventails un
lonnante, qui s'élançoit en
froi des spectateurs augmentant
premiers de ces cétacées, n'osant
à la mer qu'une lutte inutile
sur le sable; il redoubla encore
les virent suivis d'un très-grand
d'autres colosses vivans. Les
phales étoient cependant en
les moins grands n'avoient
douze mètres de longueur
grands n'en avoient pas plus
ou seize. Ils vécurent sur la
quatre heures ou environ.
Il ne faut pas être étonné
liers de poissons, troublés
aient précédé l'arrivée de

qui côtoyoient alors le rivage , furent saisis de frayeur , sur-tout lorsqu'ils aperçurent un peu au large des animaux énormes , qui s'agitoient avec violence , s'efforçoient de résister aux vagues écumantes qui les rouloient et les précipitoient vers la côte , battoient bruyamment les flots soulevés , à coups redoublés de leur large queue , et rejetoient avec vivacité par leurs évents une eau bouillonnante , qui s'élançoit en sifflant. L'effroi des spectateurs augmenta lorsque les premiers de ces cétacées , n'opposant plus à la mer qu'une lutte inutile , furent jetés sur le sable ; il redoubla encore lorsqu'ils les virent suivis d'un très-grand nombre d'autres colosses vivans. Les macrocéphales étoient cependant encore jeunes ; les moins grands n'avoient guère plus de douze mètres de longueur , et les plus grands n'en avoient pas plus de quinze ou seize. Ils vécurent sur le sable vingt-quatre heures ou environ.

Il ne faut pas être étonné que des milliers de poissons , troublés et effrayés , aient précédé l'arrivée de ces cétacées ,

et fui rapidement devant eux. En effet, le macrocéphale ne se nourrit pas seulement du mollusque *seiche*, que quelques marins anglois appellent *squild* ou *squill*, qui est très-commun dans les parages qu'il fréquente, qui est très-répandu particulièrement auprès des côtes d'Afrique et sur celles du Pérou, et qui y parvient à une grandeur si considérable, que son diamètre y est quelquefois de plus d'un tiers de mètre *. Il n'ajoute pas seulement d'autres mollusques à cette nourriture; il est aussi très-avide de poissons, notamment de cycloptères. On peut voir dans Duhamel qu'on a trouvé des poissons de deux mètres de longueur dans l'estomac du macrocéphale. Mais voici des ennemis bien autrement redoutables, dont ce cétacée fait ses victimes. Il poursuit les phoques, les baleinoptères à bec, les dauphins vulgaires. Il chasse les requins avec acharnement; et ces squales, si

* Observations faites par M. Starbue, capitaine de vaisseau des États-Unis, et communiquées à Lapeyrouse par le citoyen Joseph Dourlen, de Dunkerque, en frimaire de l'an 4.

si dangereux pour tant d'autres animaux, suivant Otho Fabricius, ont une telle frayeur à la vue du macrocéphale, qu'ils s'empêchent de se cacher sous le sable ou sous les rochers, et se précipitent au travers des vagues pour se jeter contre les rochers, avec une violence pour se donner la mort. Ils n'osent pas même approcher de lui, malgré l'avidité avec laquelle ils dévorent les restes des autres cétacées. D'après la relation du voyage de MM. Olafsen et Povelsen, on ne peut pas douter que le macrocéphale est assez vorace pour saisir un homme, le briser dans sa gueule, et gloutir les hommes qui le menacent. Les pêcheurs islandais redoutent sa proximité. Leurs idées superstitieuses ont donné à leur crainte, au point de leur permettre de prononcer le véritable nom du macrocéphale, et ne négligeant rien pour l'éloigner de la mer, lorsqu'ils aperçoivent ce féroce cétacée, du son de leurs filets, des noix de genévrier, des noix

devant eux. En effet, se nourrit pas seule-
seulement que quelques
squalid ou squali-
dans les parages
est très-répandu par
des côtes d'Afrique
ou, et qui y parvien-
considérable, que son
quelquefois de plus d'un
ajoute pas seulement
à cette nourriture; il
de poissons, notam-
s. On peut voir dans
trouvée des poissons de
gucur dans l'estomac
lais voici des ennemis
doutables, dont ce
times. Il poursuit les
noptères à bec, les
Il chasse les requins
et ces squales, si
par M. Starbue, capitaine
nis, et communiquées à
n Joseph Dourlen, de
de l'an 4.

dangereux pour tant d'autres animaux, sont, suivant Otho Fabricius, saisis d'une telle frayeur à la vue du terrible macrocéphale, qu'ils s'empressent de se cacher sous le sable ou sous la vase, qu'ils se précipitent au travers des écueils, qu'ils se jettent contre les rochers avec assez de violence pour se donner la mort, et qu'ils n'osent pas même approcher de son cadavre, malgré l'avidité avec laquelle ils dévorent les restes des autres cétacées. D'après la relation du voyage en Islande de MM. Olafsen et Povelsen, on ne doit pas douter que le macrocéphale ne soit assez vorace pour saisir un bateau pêcheur, le briser dans sa gueule, et engloutir les hommes qui le montent : aussi les pêcheurs islandais redoutent-ils son approche. Leurs idées superstitieuses ajoutent à leur crainte, au point de ne pas leur permettre de prononcer en haute mer le véritable nom du macrocéphale; et ne négligeant rien pour l'éloigner, ils jettent dans la mer, lorsqu'ils apperçoivent ce féroce cétacée, du soufre, des rameaux de genévrier, des noix muscades,

de la fiente de bœuf récente, ou tâchent de le détourner par un grand bruit et par des cris perçans.

Le macrocéphale cependant rencontre dans de grands individus, ou dans d'autres habitans des mers que ceux dont il veut faire sa proie, des rivaux contre lesquels sa puissance est vaine. Une troupe nombreuse de macrocéphales peut même être forcée de combattre contre une autre troupe de cétacées redoutables par leurs forces ou par leurs armes. Le sang coule alors à grands flots sur la surface de l'océan, comme lorsque des milliers de harponneurs attaquent plusieurs baleines; et la mer se teint en rouge sur un espace de plusieurs kilomètres*.

* Traduction du *Voyage en Islande de MM. Olafsen et Povelsen*, tome IV, p. 439.

Le P. Feuillée dit, dans le recueil des observations qu'il a faites en Amérique (tome I, page 395), qu'auprès de la côte du Pérou il vit l'eau de la mer mêlée avec un sang fétide; que, selon les Indiens, ce phénomène avoit lieu tous les mois, et que ce sang provenoit, suivant ces mêmes Indiens, d'une évacuation à laquelle les baleines femelles étoient

Au reste, n'oublions pas d'attacher l'attention à ces mugissemens entendus par les cachalots échoués sur la baie d'Audierne, et de rapporter ce que nous avons dit des sons produites par les cétacées, dans l'article de la baleine et dans celui de la balénoptère.

La contrainte, la douleur, la rage, n'arrachent peut-être que des sons plus ou moins foibles.

Les sons les moins expressifs aux cétacées

sont ceux qui se produisent particulièrement au cachalot.

Peut-être le sentiment le plus commun

chez ceux que les animaux peuvent éprouver

leur inspire-t-il aussi des sons qui leur

qui l'annoncent au loin. Les macrocéphales du moins doivent

se réunir en couple, la femelle avec une sorte de

s'accouplent comme la baleine et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

et pour se livrer à leurs

Au reste, n'oublions pas de faire faire attention à ces mugissemens qu'ont fait entendre les cachalots échoués dans la baie d'Audierne, et de rappeler ce que nous avons dit des sons produits par les cétacées, dans l'article de la *baleine franche* et dans celui de la *baleinoptère jubarte*.

La contrainte, la douleur, le danger, la rage, n'arrachent peut-être pas seuls des sons plus ou moins forts et plus ou moins expressifs aux cétacées, et particulièrement au cachalot macrocéphale. Peut-être le sentiment le plus vif de tous ceux que les animaux peuvent éprouver, leur inspire-t-il aussi des sons particuliers qui l'annoncent au loin. Les macrocéphales du moins doivent rechercher leur femelle avec une sorte de fureur. Ils s'accouplent comme la baleine franche; et pour se livrer à leurs amours avec

sujettes chaque mois, et lorsqu'elles étoient en chaleur. Les combats que se livrent les cétacées, et le nombre de ceux qui périssent sous les coups des pêcheurs, suffisent pour expliquer le fait observé par le P. Feuillée, sans qu'on ait besoin d'avoir recours aux idées des Indiens.

moins d'inquiétude ou de trouble, ils se rassemblent, dans le temps de leur union la plus intime avec leur femelle, auprès des rivages les moins fréquentés. Le capitaine Colnett dit, dans la relation de son voyage, que les environs des îles Gallapagos sont dans le printemps le rendez-vous de tous les cachalots macrocéphales (*sperma ceti*) des côtes du Mexique, de celles du Pérou, et du golfe de Panama; qu'ils s'y accouplent, et qu'on y voit de jeunes cachalots qui n'ont pas *deux mètres* de longueur.

On a écrit que le temps de la gestation est de neuf ou dix mois, comme pour la baleine franche; que la mère ne donne le jour qu'à un petit et tout au plus à deux. Mon ancien collègue, M. l'archevêque de Besançon, et M. Chappuis, que j'ai déjà cités, ont communiqué dans le temps au professeur Bonnaterre, qui l'a publiée, une observation bien précieuse à ce sujet.

Les trente-un cachalots échoués en 1784 auprès d'Audierne étoient presque tous femelles. L'équinoxe du printemps appro-

DES CACHALOTS
choit : deux de ces femelles
sur le rivage. Cet événement
être par tous les efforts qu'
faits pour se soutenir en
par la violence avec laquelle
avoient poussées sur le sable
par des explosions bruyantes.
deux petits, et l'autre un s
rent enlevés par les vagues :
qui resta sur la côte, étoit bi
n'avoit pas encore de dent
gueur étoit de trois mètres
qui pourroit faire croire q
cachalots vus par M. Colne
îles Gallapagos lui ont par
qu'un double mètre, à ca
tance à laquelle il a dû être
cétacées, et de la difficulté d
au milieu des flots qui deve
les cacher en partie.
La mère montre pour s
affection plus grande enc
presque toutes les autres c
tacées. C'est peut-être à un
femelle qu'il faut rapporte
vant, que l'on trouve dan

NATURELLE.

DES CACHALOTS. 95

choit : deux de ces femelles mirent bas sur le rivage. Cet événement, hâté peut-être par tous les efforts qu'elles avoient faits pour se soutenir en pleine mer et par la violence avec laquelle les flots les avoient poussées sur le sable, fut précédé par des explosions bruyantes. L'une donna deux petits, et l'autre un seul. Deux furent enlevés par les vagues : le troisième, qui resta sur la côte, étoit bien conformé, n'avoit pas encore de dents, et sa longueur étoit de trois mètres et demi ; ce qui pourroit faire croire que les jeunes cachalots vus par M. Colnett auprès des îles Gallapagos lui ont paru moins longs qu'un double mètre, à cause de la distance à laquelle il a dû être de ces jeunes cétacées, et de la difficulté de les observer au milieu des flots qui devoient souvent les cacher en partie.

La mère montre pour son petit une affection plus grande encore que dans presque toutes les autres espèces de cétacées. C'est peut-être à un macrocéphale femelle qu'il faut rapporter le fait suivant, que l'on trouve dans la relation

du voyage de Fr. Pyrard *. Cet auteur raconte que, dans la mer du Brésil, un grand cétacée, voyant son petit pris par des pêcheurs, se jeta avec une telle furie contre leur barque, qu'il la renversa, et précipita dans la mer son petit, qui par-là fut délivré, et les pêcheurs, qui ne se sauvèrent qu'avec peine.

Ce sentiment de la mère pour le jeune cétacée auquel elle a donné le jour, se retrouve même dans presque tous les macrocéphales pour les cachalots avec lesquels ils ont l'habitude de vivre. Nous lisons dans la relation du voyage du capitaine Colnett, que lorsqu'on attaque une troupe de macrocéphales, ceux qui sont déjà pris sont bien moins à craindre pour les pêcheurs, que leurs compagnons encore libres, lesquels, au lieu de plonger dans la mer ou de prendre la fuite, vont avec audace couper les cordes qui retiennent les premiers, repousser ou immoler leurs vainqueurs, et leur rendre la liberté.

Mais les efforts des macrocéphales sont

* Seconde partie, page 208.

DES CACHALOTS
aussi vains que ceux de la baleine.
Le génie de l'homme domine
l'intelligence des animaux.
enchaînera la force des plus
On pêche avec succès les ma-
non seulement dans notre
mais dans l'hémisphère au-
mesure que d'illustres ex-
grandes leçons apprennent
teurs à faire avec facilité ce
étoit réservé à l'audace écla-
gellan, des Bougainville et
les stations et le nombre
de cachalots, ainsi que d'
cétacées dont on recherche
fanons, l'ambre ou l'adipo-
tiplient dans les deux oc-
cheries ouvrent de nouvelles
richesses, et créent de nou-
nières de marins pour le
pour les Américains des É-
peuple que la nature, la
philosophie appellent aux
tinées, et qui l'emporte
d'autres nations par l'habi-
diesse avec laquelle il pa-

aussi vains que ceux de la baleine franche. Le génie de l'homme dominera toujours l'intelligence des animaux, et son art enchaînera la force des plus redoutables. On pêche avec succès les macrocéphales, non seulement dans notre hémisphère, mais dans l'hémisphère austral; et à mesure que d'illustres exemples et de grandes leçons apprennent aux navigateurs à faire avec facilité ce qui naguère étoit réservé à l'audace éclairée des Magellan, des Bougainville et des Cook, les stations et le nombre de pêcheurs de cachalots, ainsi que d'autres grands cétacées dont on recherche l'huile, les fanons, l'ambre ou l'adipocire, se multiplient dans les deux océans. Ces pêcheries ouvrent de nouvelles sources de richesses, et créent de nouvelles pépinières de marins pour les Anglois, et pour les Américains des États-Unis, ce peuple que la nature, la liberté et la philosophie appellent aux plus belles destinées, et qui l'emporte déjà sur tant d'autres nations par l'habileté et la hardiesse avec laquelle il parcourt la mer

98 HISTOIRE NATURELLE

comme ses belles contrées, et recueille les trésors de l'océan aussi facilement que les moissons de ses campagnes *.

Les macrocéphales résistent plus longtemps que beaucoup d'autres cétacées, aux blessures que leur font la lance et le harpon des pêcheurs. On ne leur arrache que difficilement la vie, et on assure qu'on a vu de ces cachalots respirer encore, quoique privés de parties considérables de leur corps, que le fer avoit désorganisées au point de les faire tomber en putréfaction.

Il faut observer que cette force avec laquelle les organes du cachalot retiennent, pour ainsi dire, la vie, quoiqu'étroitement liés avec d'autres organes lésés, altérés et presque détruits, appartient à une espèce de cétacée qui a moins besoin que les autres animaux de sa famille, de venir respirer à la surface des mers le fluide de l'atmosphère, et qui par con-

* Le citoyen Cossigny a parlé de ces pêcheries australes dans l'intéressant ouvrage qu'il a publié sur les colonies.

DES CACHALOTS

séquent peut vivre sous l'eau plus de temps *.

La peau, le lard, la chair, et les tendons du cachalot sont employés dans plusieurs contrées septentrionales aux mêmes usages que ceux du narwal vulgaire.

Plusieurs de ses os y servent d'instrumens ou de pêche.

Sa langue cuite y est recherchée comme un très-bon mets. Son huile est employée par plusieurs auteurs, donne une lumière claire, sans exhaler de mauvaise odeur, et l'on peut faire une bougie avec les fibres de ses muscles.

On retire de ces produits l'adipocire et l'huile de baleine, et vous verrez combien de monde inspire à l'homme l'envie de le désir de chercher le cachalot dans le milieu des frimas et des tempêtes pour le provoquer jusqu'au bout.

* On peut voir ce que nous avons dit de ces phénomènes analogues, dans le premier tome de l'Histoire naturelle des poissons.

séquent peut vivre sous l'eau pendant plus de temps *.

La peau, le lard, la chair, les intestins et les tendons du cachalot macrocéphale, sont employés dans plusieurs contrées septentrionales aux mêmes usages que ceux du narwal vulgaire. Ses dents et plusieurs de ses os y servent à faire des instrumens ou de pêche ou de chasse. Sa langue cuite y est recherchée comme un très-bon mets. Son huile, suivant plusieurs auteurs, donne une flamme claire, sans exhaler de mauvaise odeur; et l'on peut faire une colle excellente avec les fibres de ses muscles. Réunissez à ces produits l'adipocire et l'ambre gris, et vous verrez combien de motifs peuvent inspirer à l'homme entreprenant et avide le desir de chercher le macrocéphale au milieu des frimas et des tempêtes, et de le provoquer jusqu'au bout du monde.

* On peut voir ce que nous avons dit sur des phénomènes analogues, dans le Discours qui est à la tête de l'Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares.

LE CACHALOT TRUMPO*.

QUE l'on jette les yeux sur la figure du trumpo, et nous n'aurons pas besoin de faire observer combien sa tête est colossale. La longueur de cette tête énorme

* *Catodon trumpo*; cachalot de la Nouvelle-Angleterre; *trumpo*, par les habitans des Bermudes; *sperma ceti whale*, par les Anglois; *catodon macrocephalus* (var. *gamma*). Linné, édition de Gmelin; *cachalot trumpo*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; Dudley, Philosoph. Transact., n. 357; *cetus (Novæ Angliæ) bipinnis, fistulâ in cervice, dorso gibboso*, Brisson, Regn. anim. p. 360, n. 3; *Dudleyi balæna*, Klein, Miss. pisc. 2, p. 15; Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1741, 26; Robertson, Philosoph. Transact. vol. LX; *Blund headed*, Pennant, Zoolog. Britann. vol. III, p. 61; *cachalot trumpo*, édition de Bloch publiée par R. R. Castel; *cachalot trumpo*, Histoire des pêches des Hollandois dans les mers du Nord, traduites du hollandois en françois par le citoyen Bernard Dereste, tome I, p. 163.

DES CACHALOT
peut surpasser la moitié de
totale du cétacée: et cependant
entièrement développé, a p
trois-mètres de long. La tête d
est donc longue de douze
réservoir d'adipocire!

La mâchoire supérieure, b
longue et beaucoup plus la
férieure, reçoit dans des alve
qui garnissent la mâchoire
partie antérieure de la tête,
presque tous les sens, re
grande portion d'un iminer
tronqué par-devant de mat
trer très en grand l'image
taureau gigantesque.

Les dents dont la mâche
est armée, ne sont, le
qu'au nombre de dix-hu
côté. Chacune de ces den
grosse, pointue, blanche
bel ivoire, et longue de
décimètres.

L'œil est petit, placé a
verture de la bouche, et
cette ouverture.

les yeux sur la figure
ous n'aurons pas besoin
combien sa tête est co
ur de cette tête énorme

; cachalot de la Nouvelle
, par les habitans des Be
whale, par les Anglo
lus (var. gamma). Linné
cachalot trumpo, Bonnaterre
pédie méthodique; Dudley
n. 357; cetus (Noë Anglie

cervice, dorso gibber.
p. 360, n. 3; Dudley le
isc. 2, p. 15; Mémoires de

res, année 1741, 26; Re
Transact. vol. LX; Blau
log. Britann. vol. III, p. 61

tion de Bloch publiée par
trumpo, Histoire des pêche
les mers du Nord, traduite
ois par le Croyen Bernier
163.

DES CACHALOTS. 101

peut surpasser la moitié de la longueur totale du cétacée; et cependant le trumpo, entièrement développé, a plus de vingt-trois mètres de long. La tête de ce cachalot est donc longue de douze mètres. Quel réservoir d'adipocire!

La mâchoire supérieure, beaucoup plus longue et beaucoup plus large que l'inférieure, reçoit dans des alvéoles les dents qui garnissent la mâchoire d'en-bas. La partie antérieure de la tête, convexe dans presque tous les sens, représente une grande portion d'un immense ellipsoïde, tronqué par-devant de manière à y montrer très en grand l'image d'un mufle de taureau gigantesque.

Les dents dont la mâchoire inférieure est armée, ne sont, le plus souvent, qu'au nombre de dix-huit de chaque côté. Chacune de ces dents est droite, grosse, pointue, blanche comme le plus bel ivoire, et longue de près de deux décimètres.

L'œil est petit, placé au-delà de l'ouverture de la bouche, et plus élevé que cette ouverture.

On voit, à l'extrémité supérieure du museau, une bosse dont la sommité présente l'orifice des événements, lequel a très-souvent plus d'un tiers de mètre de largeur.

Au-delà de cette sommité, le dessus de la tête forme une grande convexité, séparée de celle du dos, qui est plus large, plus longue et plus élevée, par un enfoncement très-sensible, que l'on seroit tenté de prendre pour la nuque. Mais au lieu de trouver cet enfoncement au-delà de la tête et au-dessus du cou, on le voit avec étonnement correspondre au milieu de la mâchoire inférieure, et n'être pas moins éloigné de l'œil que de l'éminence des événements; et c'est à l'endroit où finit la tête et où le corps commence, que le cétacée montre sa plus grande grosseur, et que sa circonférence est, par exemple, de quatorze mètres, lorsqu'il en a vingt-quatre de longueur.

La bosse dorsale ressemble beaucoup à la sommité des événements; mais elle est plus haute et plus large à sa base. Elle correspond à l'intervalle qui sépare l'anus des parties sexuelles.

Les bras ou nageoires pectorales sont extrêmement courts.

La peau est douce au toucher, gris noirâtre sur presque toute la surface du trumpe. La graisse qui recouvre, fournit une huile est moins âcre et plus claire que celle de la baleine franche¹.

De plus, un trumpe mâle capturé en avril 1741 près de la barre de l'embouchure de la rivière de la Louisiane, donna dix tonneaux d'une qualité supérieure à celle du crocéphale, et qu'on retire de l'antérieure de sa tête². On

¹ Histoire des pêches hollandaises, par le citoyen Bernard Vereste; t. 1.

² Voyez, dans l'article du crocéphale, ce que nous avons dit de la graisse blanche de cachalot, si impure, et de celle de baleine, et sur la nature de l'huile.

³ Ce trumpe avoit plus de six mètres de longueur totale. Sa circonférence, au milieu du corps, étoit de vingt mètres, et de l'orifice des événements, d'un tiers de la distance de l'extrémité de la caudale.

Les bras ou nageoires pectorales sont extrêmement courts.

La peau est douce au toucher, et d'un gris noirâtre sur presque toute la surface du trumpo. La graisse que cette peau recouvre, fournit une huile qui, dit-on, est moins âcre et plus claire que l'huile de la baleine franche ¹.

De plus, un trumpo mâle qui échoua en avril 1741 près de la barre de Bayonne, et de l'embouchure de la rivière de l'Adour, donna dix tonneaux d'adipocire ² d'une qualité supérieure à celui du macrocéphale, et qu'on retira de la cavité antérieure de sa tête ³. On trouva aussi

¹ *Histoire des pêches hollandaises, traduction du citoyen Bernard Dereste; tome I, p. 163.*

² Voyez, dans l'article du *cachalot macrocéphale*, ce que nous avons dit sur l'*adipocire* ou *blanc de cachalot*, si improprement appelé *blanc de baleine*, et sur la nature de l'ambre gris.

³ Ce trumpo avoit plus de seize mètres de longueur totale. Sa circonférence, à l'endroit le plus gros du corps, étoit de neuf mètres; le diamètre de l'orifice des événements, d'un tiers de mètre; la distance de l'extrémité de la caudale à l'anus, de

dans son intérieur une boule d'ambre gris, du poids de soixante-cinq hectogrammes.

On a cru que, tout égal d'ailleurs, le trumpo étoit plus agile, plus audacieux et plus redoutable que les autres cachalots : mais il paroît qu'il a plus de confiance dans la force de ses mâchoires, la grandeur et le nombre de ses dents, que dans la masse et la vitesse de sa queue; car on assure que lorsqu'il est blessé, il se retourne de manière à se défendre avec sa gueule.

Le trumpo se plaît dans la mer qui baigne la Nouvelle-Angleterre, et auprès des Bermudes : mais on l'a vu aussi dans les eaux du Groenland, dans le golfe Britannique, dans celui de Gascogne; et

près de cinq mètres; la longueur de l'anus, d'un tiers de mètre; la largeur de cette ouverture, d'un sixième de mètre; la distance de l'anus à la verge, de deux mètres; la longueur de la gaine qui entoure la verge, d'un demi-mètre; le diamètre de cette gaine, d'un tiers de mètre; la longueur de la verge, d'un mètre et un tiers; et la hauteur de la bosse du dos, d'un tiers de mètre.

je ne serois pas éloigné de
étoit parmi les cachalots nor
seti, et que le capitaine B
servés récemment auprès de
Nouvelle-Zélande *.

* Lettre du capitaine Barthelemy
Jussieu.

NATURELLE
une boule d'ambre
soixante-cinq hecto-

out égal d'ailleurs, le
agile, plus audacieux
que les autres cachalots
qu'il a plus de con-
e de ses mâchoires, la
mbre de ses dents, que
a vitesse de sa queue;
lorsqu'il est blessé, il
ière à se défendre avec

plait dans la mer qui
-Angleterre, et auprès
is on l'a vu aussi dans
land, dans le golfe
celui de Gascogne; et

a longueur de l'anus, d'un
ur de cette ouverture, d'un
stance de l'anus à la verge.
ueur de la gaine qui entou-
être; le diamètre de cette
mètre; la longueur de la
n tiers; et la hauteur de
tiers de mètre.

DES CACHALOTS. 105

je ne serois pas éloigné de croire qu'il étoit parmi les cachalots nommés *sperma ceti*, et que le capitaine Baudin a observés récemment auprès des côtes de la Nouvelle-Zélande *.

* Lettre du capitaine Baudin à notre collègue Jussieu.

LE CACHALOT SVINEVAL*.

Nous n'appelons pas ce cétacée le *petit cachalot*, parce que nous allons en décrire un qui lui est inférieur par ses dimensions; d'ailleurs cette épithète *petit* ne peut le plus souvent former qu'un mauvais nom spécifique. Nous conservons au cachalot dont nous nous occupons dans cet article, le nom de *svinehval* qu'on lui donne en Norvège et dans plusieurs autres contrées du Nord; ou plutôt, de cette

* *Catodon svineval*; *petit cachalot*; *svinehval*, en Norvège; *kegutilik*, en Groenland; *physeter catodon*, Linné, édition de Gmelin; *catodon fistula in rostro*, Artedi, gen. 78, syn. 108; *petit cachalot*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *cetus (minor) bipinnis*, *fistulâ in rostro*, Brisson, Regn. anim. p. 361, n. 4; Sibbald, Phal. nov. p. 24; *balæna minor*, *in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso*, Sibb. Raj. Pisc. p. 15; Otho Fabricius, Faun. Groenland, 44.

DES CACHALOT
dénomination de *svinehval*
tiré celle de *svineval*, plus
noncer.

Ce cétacée a la tête arron-
ture de la bouche petite;
inférieure plus étroite que ce
et garnie, des deux côtés,
correspondent à des alvéoles
la mâchoire supérieure.

On a trouvé souvent ce
au point de se terminer dan
une surface plate, presque
sur laquelle on voyoit pl
concentriques qui marquo
rentes couches de la den
diminuées dans leur longue
tement, avoient à peine de
de hauteur au-dessus de la

L'orifice des événements, situ
de la partie supérieure d
été pris, par quelques obs
une ouverture de narines;
a pu faire croire que le sv
pas d'évents proprement
Une éminence raboteuse
placée sur le dos.

dénomination de *svinehval* nous avons tiré celle de *svineval*, plus aisée à prononcer.

Ce cétacée a la tête arrondie; l'ouverture de la bouche petite; la mâchoire inférieure plus étroite que celle d'en-haut, et garnie, des deux côtés, de dents qui correspondent à des alvéoles creusés dans la mâchoire supérieure.

On a trouvé souvent ces dents usées au point de se terminer dans le haut par une surface plate, presque circulaire, et sur laquelle on voyoit plusieurs lignes concentriques qui marquoient les différentes couches de la dent. Ces dents, diminuées dans leur longueur par le frottement, avoient à peine deux centimètres de hauteur au-dessus de la gencive.

L'orifice des événements, situé à l'extrémité de la partie supérieure du museau, a été pris, par quelques observateurs, pour une ouverture de narines; et c'est ce qui a pu faire croire que le *svineval* n'avoit pas d'événements proprement dits.

Une éminence raboteuse et calleuse est placée sur le dos.

Les svinevals vivent en troupes dans les mers septentrionales. Vers la fin du dernier siècle, cent deux de ces cachalots échouèrent dans l'une des Orcades : les plus grands n'avoient que huit mètres de longueur. Il est présumable que le svineval fournit une quantité plus ou moins abondante d'adipocire, et que, dans certaines circonstances, il produit de l'ambre gris, comme les cachalots dont nous venons de parler *.

* On peut voir, dans l'article du *macrocéphale*, ce que l'on doit penser de la nature de l'adipocire et de celle de l'ambre gris.

LE CACHALOT BLANC

Ce cétacée paroît de loin avoir de rapports avec la baleine fr. on distingue aisément cependant sa tête, plus allongée que la baleine, et la figure du museau arrondi que celui du premier.

Ses dents sont fortes, mais à leur extrémité; elles sont comprimées et courbées. Sa couleur est blanc mêlé de teintes jaunes. Sa longueur n'excède pas

* *Catodon albicans*; *sperm.*
macrocephalus, var. B. Linn. é.
cetus albicans, *bipinnis et alba*
dorso laevi. Brisson, *Reyn. an.*
weisfisch, Martens, *Sperm.*
bicans, *weisfisch* Martens
Klein, *Miss. pisc.* 2, p. 12;
hoïdfiske, Eggede, *Groenl.*
piscis cetaceus, Raf. *Pisc. F.*
Cetaceus.

LE CACHALOT BLANCHATRE *.

CE cétacée paroît de loin avoir beaucoup de rapports avec la baleine franche; mais on distingue aisément cependant la forme de sa tête, plus alongée que celle de cette baleine, et la figure du museau, moins arrondi que celui du premier des cétacées.

Ses dents sont fortes, mais émoussées à leur extrémité; elles sont d'ailleurs comprimées et courbées. Sa couleur est d'un blanc mêlé de teintes jaunes.

Sa longueur n'excède pas souvent cinq

* *Catodon albicans*; *sperma ceti*; *catodon macrocephalus*, var. B. Linné, édition de Gmelin; *cetus albicans*, *bipinnis ex albo flavescens*, *dorso lævi*. Brisson, Regn. anim. p. 359, n. 2; *weisfisch*, Martens, Spitzb. p. 94; *balæna albicans*, *weisfisch Martensii* et *Zorgdrageri*, Klein, Miss. pisc. 2, p. 12; *poisson blanc*: *hviidfiske*, Eggede, Groenland. p. 55; *albus piscis cetaceus*, Raj. Pisc. p. 11.

Cétacées.

10



ou six mètres : il est donc bien inférieur, par ses dimensions et par sa force, aux cachalots dont nous venons de parler. On l'a rencontré dans le détroit de Davis. On ne peut guère douter que ce cétacée ne fournisse de l'adipocire ; et peut-être donne-t-il aussi de l'ambre gris*.

* Voyez, dans l'article du *macrocéphale*, ce que nous avons dit de ces deux substances.

LES PHY

LE PHYSALÉ CY

Plusieurs naturalistes ont confondu ce cétacée avec le *micropodius* ; mais c'est un genre différent de celui-ci. On ne prendra ce dernier animal que pour un autre pas non plus à la faune proprement dits : la p

¹ Voyez, au commencement de l'article intitulé *Nomenclature*, le tableau général des ordres de ces animaux.

² *Physalus cylindricornis* les Hollandois ; *cachalot* dans les planches de l'Encyclopédie, Histoire du Groenland, environs du cap Nord. Les Hollandois dans les mers du Nord par le citoyen B. p. 157, pl. 2, fig. C.

E NATURELLE.
est donc bien inférieure
ns et par sa force, au
ous venons de parler. C
s le détroit de Davis. On
outer que ce cétacée
lipocire; et peut-être
de l'ambre gris*.

article du *macrocéphale*,
ces deux substances.

LES PHYSALES¹.

LE PHYSALE CYLINDRIQUE².

PLUSIEURS naturalistes ont confondu ce cétacée avec le *microps* dont nous parlerons bientôt; mais il est même d'un genre différent de celui qui doit comprendre ce dernier animal. Il n'appartient pas non plus à la famille des cachalots proprement dits: la position de ses évents

¹ Voyez, au commencement de cette Histoire, l'article intitulé *Nomenclature des cétacées*, et le tableau général des ordres, genres et espèces de ces animaux.

² *Physalus cylindricus*; *walvischvangst*, par les Hollandois; *cachalot cylindrique*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; Anderson, Histoire du Groenland, 148; *cachalot pris aux environs du cap Nord*. Histoire des pêches des Hollandois dans les mers du Nord, traduite en françois par le citoyen Bernard Dereste; tome I, p. 157, pl. 2, fig. C.

auroit suffi pour nous obliger à l'en séparer. Nous avons donc considéré cet espèce remarquable, hors des deux groupes que nous avons formés de tous les autres cétacées auxquels on avoit donné jusqu'à nous le même nom générique, celui de *cachalot* en français, et de *physeter* en latin; et nous avons cru devoir distinguer le genre particulier qu'elle forme, par la dénomination de *physalus*, dont on s'est déjà servi pour désigner la force avec laquelle tous les cétacées qu'on a nommés *cachalots* font jaillir l'eau par leurs évents, et qu'on n'avoit pas encore adoptée pour un genre ni même pour une espèce particulière de ces cétacées énormes et armés de dents.

De tous les grands animaux, le physale cylindrique est celui dont les formes ont le plus de cette régularité que la géométrie imprime aux productions de l'art, et qui, vu de loin, ressemble peut-être le moins à un être animé. La forme cylindrique qu'il présente dans la plus grande partie de sa longueur, le feroit prendre pour un immense tronc d'arbre,

son connoissoit un assez gros
lui être comparé, ou pour
tours antiques que des commu-
lentes ont précipitées dans
elles bordoient le rivage, et
voyoit pas flotter sur la sur-
face.

Sa tête sur-tout ressemble d
à un cylindre colossal, que
inférieure disparoit, pour a-
milieu de celle d'en-haut, q
exactement, et que le muse-
roit comme tronqué, se ter-
surface énorme, verticale,
et presque circulaire.

Que l'on se suppose placé
ce disque gigantesque, et l
la hauteur de cette surface
égaler celle d'un de ces rem-
vés qui ceignent les ancien-
En effet, la tête du physal-
peut être aussi longue qu
cétacée, et sa hauteur pe-
très-grande partie de sa l-
La mâchoire inférieure
courte que celle d'en-haut

si on connoissoit un assez gros arbre pour lui être comparé, ou pour une de ces tours antiques que des commotions violentes ont précipitées dans la mer dont elles bordoient le rivage, si on ne le voyoit pas flotter sur la surface de l'océan.

Sa tête sur-tout ressemble d'autant plus à un cylindre colossal, que la mâchoire inférieure disparoît, pour ainsi dire, au milieu de celle d'en-haut, qui l'encadre exactement, et que le museau, qui paroît comme tronqué, se termine par une surface énorme, verticale, presque plane et presque circulaire.

Que l'on se suppose placé au-devant de ce disque gigantesque, et l'on verra que la hauteur de cette surface verticale peut égaler celle d'un de ces remparts très-élevés qui ceignent les anciennes forteresses. En effet, la tête du physale cylindrique peut être aussi longue que la moitié du cétacée, et sa hauteur peut égaler une très-grande partie de sa longueur.

La mâchoire inférieure est un peu plus courte que celle d'en-haut, et d'ailleurs

114 HISTOIRE NATURELLE

plus étroite. L'ouverture de la bouche , qui est égale à la surface de cette mâchoire inférieure , est donc beaucoup plus longue que large ; et cependant elle est effrayante : elle épouvante d'autant plus , que lorsque le cétacée abaisse sa longue mâchoire inférieure , on voit cette mâchoire hérissée , sur ses deux bords , d'un rang de dents pointues , très-recourbées , et d'autant plus grosses qu'elles sont plus près de l'extrémité du museau , au bout duquel on en compte quelquefois une impaire. Ces dents sont au nombre de vingt-quatre ou de vingt-cinq de chaque côté. Lorsque l'animal relève sa mâchoire , elles entrent dans des cavités creusées dans la mâchoire supérieure. Et quelle victime , percée par ces cinquante pointes dures et aiguës , résisteroit d'ailleurs à l'effort épouvantable des deux mâchoires , qui , comme deux leviers longs et puissans , se rapprochent violemment , et se touchent dans toute leur étendue ?

On a écrit que les plus grandes de ces dents d'en-bas présentent un peu la forme et les dimensions d'un gros concombre. On a

DES PHYSAL.
écrit aussi que l'on trouvoit
dents à la mâchoire supé-
rieure ressemblent sans dou-
tes-courtes , à surface plane
entièrement cachées dans la
appartiennent à la machoi-
du cachalot **macrocéphale**.

La langue est mobile , au-
lement , mais étroite et très-

L'œsophage , au lieu d'être
comme celui de la baleine

assez large pour que , suiv-
auteurs , un bœuf entier pu-

L'estomac avoit plus de vi-
mètres de long dans un in-

une description très-étendu-
tiquée dans le temps à An-

estomac renfermoit des ar-
des animaux à demi dévo-

On voit l'orifice des évacua-
assez grande distance de l'a-

érieure du museau , pou-
milieu de la longueur de

d'en-bas.

L'œil est placé un peu pl-
du bout du museau , qu-

écrit aussi que l'on trouvoit trois ou quatre dents à la mâchoire supérieure. Ces dernières ressemblent sans doute à ces dents très-courtes , à surface plane , et presque entièrement cachées dans la gencive , qui appartiennent à la mâchoire d'en-haut du cachalot macrocéphale.

La langue est mobile , au moins latéralement , mais étroite et très-courte.

L'œsophage , au lieu d'être resserré comme celui de la baleine franche , est assez large pour que , suivant quelques auteurs , un bœuf entier puisse y passer. L'estomac avoit plus de vingt-trois décimètres de long dans un individu dont une description très-étendue fut communiquée dans le temps à Anderson ; et cet estomac renfermoit des arrêtes , des os et des animaux à demi dévorés.

On voit l'orifice des événements situé à une assez grande distance de l'extrémité supérieure du museau , pour répondre au milieu de la longueur de la mâchoire d'en-bas.

L'œil est placé un peu plus loin encore du bout du museau , que l'ouverture

des évents; mais il n'en est pas aussi éloigné que l'angle formé par la réunion des deux lèvres. Au reste, il est très-près de la lèvre supérieure, et n'a qu'un très-petit diamètre.

Un marin hollandois et habile, cité par Anderson, disséqua avec soin la tête d'un physale cylindrique pris aux environs du cap Nord. Ayant commencé son examen par la partie supérieure, il trouva au-dessous de la peau une couche de graisse d'un sixième de mètre d'épaisseur. Cette couche graisseuse recouvroit un cartilage que l'on auroit pris pour un tissu de tendons fortement attachés les uns aux autres. Au-dessous de cette calotte vaste et cartilagineuse, étoit une grande cavité pleine d'adipocire*. Une membrane cartilagineuse, comme la calotte, divisoit cette cavité en deux portions situées l'une au-dessus de l'autre. La portion supérieure, nommée par le marin hollandois *klapmutz*, étoit séparée en plusieurs compartimens par des cloisons verticales,

* On peut voir, dans l'article du *cachalot macrocéphale*, ce que nous avons dit de l'adipocire.

DES PHYSALIDÉES
risqueuses, et un peu trans-
sournit trois cent cinquante
d'une substance huileuse,
fine, très-claire et très-bl
substance, à laquelle nous d
notre collègue Fourcroy, le
cire, se coaguloit et form
masses rondes, dès qu'on la
de l'eau froide.

La portion inférieure de
vité avoit deux mètres et de
deur. Les compartimens d
étoit divisée, lui donnoien
d'une immense ruche garni
et ouverte. Ils étoient fo
cloisons plus épaisses que
partimens supérieurs; et l
ces cloisons parut à l'obser
dois, analogue à celle qu
coque des œufs d'oiseau.

Les compartimens de la
rieure contenoit un adipe
lité inférieure à celui de la
tion. Lorsqu'ils furent vi
hollandois les vit se remp
semblable à celle qu'il ven

visqueuses, et un peu transparentes. Elle fournit trois cent cinquante kilogrammes d'une substance huileuse, fluide, très-fine, très-claire et très-blanche. Cette substance, à laquelle nous donnons, avec notre collègue Fourcroy, le nom d'*adipocire*, se coaguloit et formoit de petites masses rondes, dès qu'on la versoit dans de l'eau froide.

La portion inférieure de la grande cavité avoit deux mètres et demi de profondeur. Les compartimens dans lesquels elle étoit divisée, lui donnoient l'apparence d'une immense ruche garnie de ses rayons et ouverte. Ils étoient formés par des cloisons plus épaisses que celle des compartimens supérieurs; et la substance de ces cloisons parut à l'observateur hollandois, analogue à celle qui compose la coque des œufs d'oiseau.

Les compartimens de la portion inférieure contenoit un adipocire d'une qualité inférieure à celui de la première portion. Lorsqu'ils furent vidés, le marin hollandois les vit se remplir d'une liqueur semblable à celle qu'il venoit d'en retirer.

118 HISTOIRE NATURELLE

Cette liqueur y couloit par l'orifice d'un canal qui se prolongeoit le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'extrémité de la queue. Ce canal diminuoit graduellement de grosseur, de telle sorte qu'ayant auprès de son orifice une largeur de près d'un décimètre, il n'étoit pas large de deux centimètres à son extrémité opposée. Un nombre prodigieux de petits tuyaux aboutissoit à ce canal, de toutes les parties du corps de l'animal, dont les chairs, la graisse et même l'huile, étoient mêlées avec de l'adipocire. Le canal versa dans la portion inférieure de la grande cavité de la tête, cinq cent cinquante kilogrammes d'un adipocire qui, mis dans de l'eau froide, y prenoit la forme de flocons de neige, mais qui étoit d'une qualité bien inférieure à celui de la cavité supérieure; ce qui paroîtroit indiquer que l'adipocire s'élabore, s'épure et se perfectionne dans cette grande et double cavité de la tête à laquelle le canal aboutit.

La cavité de l'adipocire doit être plus grande, tout égal d'ailleurs, dans le

DES PHYSALÉES
physale cylindrique, que dans
lots, à cause de l'elevation
antérieure du museau.

Le corps du physale que
vous, est cylindrique du côté
et conique du côté de la queue
antérieure ressemble d'autant
continuation du cylindre de
tête, que la nuque n'est marquée
par un enfoncement presque
C'est vers la fin de ce long
l'on voit une bosse, dont la
ordinairement d'un demi-mètre
sa base, qui est très-prolongée
portion de sa grosseur, est
mètre et un tiers.

La queue, qui commence
cette bosse, est grosse, conique
très-courte à proportion de
du physale; ce qui donne
une rame et un gouvernail
moins étendus que ceux
autres cétacées, et par consé-
quent tout égal d'ailleurs, rendre
moins rapide et moins facile.
Cependant la caudale a

physale cylindrique, que dans les cachalots, à cause de l'élévation de la partie antérieure du museau.

Le corps du physale que nous décrivons, est cylindrique du côté de la tête, et conique du côté de la queue. Sa partie antérieure ressemble d'autant plus à une continuation du cylindre formé par la tête, que la nuque n'est marquée que par un enfoncement presque insensible. C'est vers la fin de ce long cylindre que l'on voit une bosse, dont la hauteur est ordinairement d'un demi-mètre, lorsque sa base, qui est très-prolongée à proportion de sa grosseur, est longue d'un mètre et un tiers.

La queue, qui commence au-delà de cette bosse, est grosse, conique, mais très-courte à proportion de la grandeur du physale; ce qui donne à cet animal une rame et un gouvernail beaucoup moins étendus que ceux de plusieurs autres cétacées, et par conséquent doit, tout égal d'ailleurs, rendre sa natation moins rapide et moins facile.

Cependant la caudale a très-souvent

plus de quatre mètres de longueur, depuis l'extrémité d'un lobe jusqu'à l'extrémité de l'autre. Chacun de ces lobes est échancré de manière que la caudale paroît en présenter quatre.

La base de chaque pectorale est très-près de l'œil, presque à la même hauteur que cet organe, et par conséquent plus haut que l'ouverture de la bouche. Cette nageoire latérale est d'ailleurs ovale, et si peu étendue, que très-fréquemment elle n'a guère plus d'un mètre de longueur.

Le ventre est un peu arrondi.

La verge du mâle a près de deux mètres de longueur, et un demi-mètre de circonférence à sa base.

L'anus n'est pas éloigné de cette base; mais comme la queue est très-courte, il se trouve près de la caudale.

La chair a une assez grande dureté pour résister aux lames tranchantes, au harpon et aux lances que de grands efforts ne mettent pas en mouvement.

La couleur du cylindrique est noirâtre, et presque du même ton sur toute la surface de ce physale.

DES PHYSALIES
On a rencontré ce cétacé
océan glacial arctique, et
boréale de l'Océan atlantique.
trional.

E NATURELLE
mètres de longueur, de
d'un lobe jusqu'à l'ex-
re. Chacun de ces lobes
manière que la caudale
fer quatre.

aque pectorale est très-
sque à la même hauteur
et par conséquent par
ture de la bouche. Cette
est d'ailleurs ovale, et
e très-fréquemment el-
un mètre de longueur,
un peu arrondi.

nâle a près de deux mè-
r, et un demi-mètre de
a base.

is éloigné de cette base
queue est très-courte, et
e la caudale.

ne assez grande dureté
lames tranchantes, et
lances que de grande
nt pas en mouvement
cylindrique est noirâtre
ême ton sur toute la sur-
e.

DES PHYSALES.

121

On a rencontré ce cétacée dans l'Océan glacial arctique, et dans la partie boréale de l'Océan atlantique septentrional.

LES PHYSÉTÈRES¹.

LE PHYSÉTÈRE MICROPS².

LE microps est un des plus grands, des plus cruels et des plus dangereux habitans

¹ On trouvera au commencement de cette Histoire le tableau général des ordres, genres et espèces de cétacées.

² *Physeter microps*; cachalot à dents en faucille; staur-himing, kobbe-herre, en Norvège; tikagusik, weisfisch, en Groenland; *physeter microps*, Linné, édition de Gmelin; *cachalot microps*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *physeter microps*, R. R. Castel, nouvelle édition de Bloch; *phkyseter dorso pinnâ longâ, maxillâ superiore longiore*, Artedi, gen. 74, syn. 104; *balæna major in inferiore tantum maxillâ dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens*, Sibbaldi Phalæen; *id.* Raj. Synops. pisc. p. 15; *id.* Klein. Misc. pisc. 2, p. 15; *dritte species der cachelotte*, Anders. Isl. p. 248; Muller, Zoolog. Danic. Prodrum, n. 53; Strom. — 1, 298; Act. Nidros, 4, 112; Oth. Fabricius, Faun. Groenland, 44; Zörgdrager, Groenlandsche vischery, p. 162.

HISTOIRE NATURELLE
de la mer. Réunissant à
doutables les deux éléments
la masse et la vitesse, avec
ennemi audacieux, combat
quelle plage de l'océan n'est
il pas? On dirait que les
logues l'avoient sous les yeux
ont créé le monstre marin
délivra la belle Andromède
dévorer, et celui dont l'aspect
épouvanta les coursiers de
Hippolyte. On croiroit au
effrayante de ce cétacée a
nie poétique de l'Arioste c
description de l'orque, do
enchaînée sur un rocher,
proie près des rivages d
Lorsqu'il nous montre cette
qui s'agit, cette tête de
ment des dents terribles,
cer les principaux traits de
détournons nos yeux des
teresses et fantasmagoriques
allégories des philosophes,
sublimes des anciens poètes
imagination des poètes rec

de la mer. Réunissant à des armes redoutables les deux élémens de la force, la masse et la vîtesse, avide de carnage, ennemi audacieux, combattant intrépide, quelle plage de l'océan n'ensanglante-t-elle pas ? On diroit que les anciens mythologues l'avoient sous les yeux, lorsqu'ils ont créé le monstre marin dont Persée délivra la belle Andromède qu'il alloit dévorer, et celui dont l'aspect horrible épouvanta les coursiers du malheureux Hippolyte. On croiroit aussi que l'image effrayante de ce cétacée a inspiré au génie poétique de l'Arioste cette admirable description de l'*orque*, dont Angélique, enchaînée sur un rocher, alloit être la proie près des rivages de la Bretagne. Lorsqu'il nous montre cette masse énorme qui s'agite, cette tête démesurée qu'armement des dents terribles, il semble retracer les principaux traits du microps. Mais détournons nos yeux des images enchantées et fantastiques dont les savantes allégories des philosophes, les conceptions sublimes des anciens poètes, et la divine imagination des poètes récents, ont voulu,

SÉTÈRES.

RE MICROPS.

des plus grands, des
s dangereux habitansmmencement de cette His-
s ordres, genres et espècescachalot à dents en fau-
obbe-herre, en Norvège;en Groenland; *physeter*

on de Gmelin; cachalot

blanches de l'Encyclopédie

microps, R. R. Castel,h; *pkyseter dorso pinnâ*

re longiore, Artedi, gen.

nejn in inferiore tantu

s arcuatis falciformibus.

habens, Sibbald

s. pisc. p. 15; id. Klein

e species der cachelotte,

ler, Zoolog. Danic. Pro-

- 1. 293; Act. Nidros,

, Faun. Groenland, 44

che vischery, p. 162.

pour ainsi dire, couvrir la Nature entière, écartons ces voiles dont la fable a orné la vérité. Contemplons ces tableaux impérissables que nous a laissé le grand peintre qui fit l'ornement du siècle de Vespasien. Ne serons-nous pas tentés de retrouver les physétères que nous allons décrire, dans ces *orques* * que Pline nous représente comme ennemies mortelles du premier des cétacées, desquelles il nous dit qu'on ne peut s'en faire une image qu'en se figurant une masse immense, animée et hérissée de dents, et qui, poursuivant les baleines jusque dans les golfes les plus écartés, dans leurs retraites les plus secrètes, dans leurs asyles les plus sûrs, attaquent, déchirent et percent de leurs dents aiguës, et les baleineaux, et les femelles qui n'ont pas encore donné le jour à leurs petits ? Ces baleines encore pleines, continue le naturaliste romain,

* Nous avons vu à l'article de la *baleinoptère rorqual*, que la note de Daléchamp sur le sixième chapitre du neuvième livre de Pline se rapportoit à cette baleinoptère; mais l'orque du naturaliste de Rome ne peut pas être ce même cétacée.

DES PHYSÉTÈRES
chargées du poids de leur ba
barrassées dans leurs mou
couragées dans leur défen
par les douleurs et les fati
état, paroissent ne conn
moyen d'échapper à la fure
qu'en fuyant dans la haute
tâchant de mettre tout l'océ
et leurs ennemis. Vains effo
leur ferment le passage, s'o
fuite, les attaquent dans l
les pressent sur les bas-fon
contre les roches. Et cepe
qu'aucun vent ne souffle
la mer est agitée par les m
pides et les coups redoublé
mes animaux; les flots
comme par un violent tour
ces orques parut dans le
pendant que l'empereur C
cupé à y faire faire des cons
velles. Elle y étoit entree
naufnage de bâtimens arriv
et entraînée par les peaux d
ces bâtimens avoient etc
s'étoit creusé dans le sable

chargées du poids de leur baleineau , embarrassées dans leurs mouvemens , découragées dans leur défense , affoiblies par les douleurs et les fatigues de leur état , paroissent ne connoître d'autre moyen d'échapper à la fureur des orques , qu'en fuyant dans la haute mer , et en tâchant de mettre tout l'océan entre elles et leurs ennemis. Vains efforts ! les orques leur ferment le passage , s'opposent à leur fuite , les attaquent dans leurs détroits , les pressent sur les bas-fonds , les serrent contre les roches. Et cependant , quoiqu'aucun vent ne souffle dans les airs , la mer est agitée par les mouvemens rapides et les coups redoublés de ces énormes animaux ; les flots sont soulevés comme par un violent tourbillon. Une de ces orques parut dans le port d'Ostie pendant que l'empereur Claude étoit occupé à y faire faire des constructions nouvelles. Elle y étoit entrée à la suite du naufrage de bâtimens arrivés de la Gaule , et entraînée par les peaux d'animaux dont ces bâtimens avoient été chargés ; elle s'étoit creusé dans le sable une espèce de

vaste sillon , et , poussée par les flots vers le rivage , elle élevoit au-dessus de l'eau un dos semblable à la carène d'un vaisseau renversé. Claude l'attaqua à la tête des cohortes prétoriennes , montées sur des bâtimens qui environnèrent le géant cétacée , et dont un fut submergé par l'eau que les événements de l'*orque* avoient lancé. Les Romains du temps de Claude combattirent donc sur les eaux un énorme tyran des mers , comme leurs pères avoient combattu dans les champs de l'Afrique un immense serpent devin , un sanguinaire dominateur des déserts et des sables brûlans *.

Examinons le type de ces orques de Pline.

Le microps a la tête si démesurée , que sa longueur égale , suivant Artédi , la moitié de la longueur du cétacée lorsqu'on lui a coupé la nageoire de la queue , et que sa grosseur l'emporte sur celle de toute autre partie du corps de ce physcète.

* Article du *serpent devin* , dans notre *Histoire naturelle des serpens*.

La bouche s'ouvre au-dessus de la tête remarquable. La mâchoire supérieure , quoique moins armée que la mâchoire inférieure , est cependant proprement dite , et un peu plus que la mâchoire inférieure. Elle présente des cavités pour recevoir les dents de cette mâchoire ; et nous croyons qu'il faut observer de nouveau que , dans cette conformation , les mâchoires s'appliquent mieux l'une sur l'autre , et ferment la bouche plus exactement.

Les dents qui garnissent la mâchoire d'en-bas , sont coniques , et creuses vers leurs racines , qui sont dans l'os de la mâchoire inférieure , et tiers de leur longueur. La dent qui est cachée dans la mâchoire supérieure est comprimée de devant en derrière , et inclinée du côté du gosier , la racine qui est petite.

La partie extérieure est de l'ivoire , et son sommet est courbé vers le gosier se fléchissant dehors.

La bouche s'ouvre au-dessous de cette tête remarquable. La mâchoire supérieure, quoique moins avancée que le museau proprement dit, l'est cependant un peu plus que la mâchoire d'en-bas. Elle présente des cavités propres à recevoir les dents de cette mâchoire inférieure; et nous croyons devoir faire observer de nouveau que, par une suite de cette conformation, les deux mâchoires s'appliquent mieux l'une contre l'autre, et ferment la bouche plus exactement.

Les dents qui garnissent la mâchoire d'en-bas, sont coniques, courbées, creuses vers leurs racines, et enfoncées dans l'os de la mâchoire jusqu'aux deux tiers de leur longueur. La partie de la dent qui est cachée dans l'alvéole, est comprimée de devant en arrière, cannelée du côté du gosier, et rétrécie vers la racine qui est petite.

La partie extérieure est blanche comme de l'ivoire, et son sommet aigu et recourbé vers le gosier se fléchit un peu en dehors.

Cette partie extérieure n'a communément qu'un décimètre de longueur. Lorsque l'animal est vieux, le sommet de la dent est quelquefois usé et parsemé de petites éminences aiguës ou tranchantes; et c'est ce qui a fait croire que le microps avoit des dents molaires.

On a beaucoup varié sur le nombre des dents qui hérissent la mâchoire inférieure du microps. Les uns ont écrit qu'il n'y en avoit que huit de chaque côté; d'autres n'en ont compté que onze à droite et onze à gauche. Peut-être ces auteurs n'avoient-ils vu que des microps très-jeunes, ou si vieux, que plusieurs de leurs dents étoient tombées, et que plusieurs de leurs alvéoles s'étoient oblitérés. Mais quoi qu'il en soit, Artédi, Gmelin et d'autres habiles naturalistes, disent positivement qu'il y a quarante-deux dents à la mâchoire inférieure du microps.

Les Groenlandois assurent que l'on trouve aussi des dents à la mâchoire supérieure de ce cétacée. S'ils y en ont vu en effet, elles sont courtes, cachées presque en entier dans la gencive, et plus ou moins

DES PHYSÉTÈ
aplaties, comme celles que
couvrir dans la mâchoire
cachalot macrocéphale.
L'orifice commun des de
situé à une petite distance
du museau.

Artédi a écrit que l'œil du
aussi petit que celui d'un p
présente que très-raremen
d'un mètre, et auquel no
servé le nom de *gode agl*
petitesse de cet organe qui
au physétère que nous décr
de microps, lequel signifie

Chaque pectorale a plus
longueur. La nageoire du c
haute, et assez pointue p
assimilée à un long aiguil
La cavité située dans la
rière et supérieure de la
contient plusieurs tonneaux
a été comparée à un vaste

* Histoire naturelle des poissons.
* L'article du cachalot macrocéphale
l'exposition de la nature de l'animal
cétacée, improprement appelé

aplaties, comme celles que l'on peut découvrir dans la mâchoire supérieure du cachalot macrocéphale.

L'orifice commun des deux événements est situé à une petite distance de l'extrémité du museau.

Artédi a écrit que l'œil du *microps* étoit aussi petit que celui d'un poisson qui ne présente que très-rarement la longueur d'un mètre, et auquel nous avons conservé le nom de *gade æglefin*¹. C'est la petitesse de cet organe qui a fait donner au physétère que nous décrivons, le nom de *microps*, lequel signifie *petit œil*.

Chaque pectorale a plus d'un mètre de longueur. La nageoire du dos est droite, haute, et assez pointue pour avoir été assimilée à un long aiguillon.

La cavité située dans la partie antérieure et supérieure de la tête, et qui contient plusieurs tonneaux d'*adipocire*, a été comparée à un vaste four².

¹ *Histoire naturelle des poissons*, tom II in-4°.

² L'article du *cachalot macrocéphale* contient l'exposition de la nature de l'*adipocire* ou *blanc de cétacée*, improprement appelé *blanc de baleine*.

On a souvent remarqué la blancheur de la graisse

La chair est un mets délicieux pour les Groenlandois et d'autres habitans du nord de l'Europe ou de l'Amérique.

La peau n'a peut-être pas autant d'épaisseur, à proportion de la grandeur de l'animal, que dans la plupart des autres cétacées. Elle est d'ailleurs très-unie, très-douce au toucher, et d'un brun noirâtre. Il se peut cependant que l'âge, ou quelque autre cause, lui donne d'autres nuances, et que quelques individus soient d'un blanc jaunâtre, ainsi qu'on l'a écrit.

La longueur du microps est ordinairement de plus de vingt-trois ou vingt-quatre mètres, lorsqu'il est parvenu à son entier développement.

Est-il donc surprenant qu'il lui faille une si grande quantité de nourriture, et qu'il donne la chasse aux bélugas et aux marsouins qu'il poursuit jusque sur le rivage où il les force à s'échouer, et aux phoques qui cherchent en vain un asyle sur d'énormes glaçons? Le microps a

bientôt brisé cette masse co-
malgré sa dureté, se dispo-
se dissipe en poussière et
être la proie qu'il veut devor-
Son audace s'enflamme
des jubartes ou des baleines
seau pointu; il ose s'atta-
grands cétacés, et les dé-
dents recourbées, si forte-
breuses.

On dit même que la bal-
lorsqu'elle est encore jeune
sister aux armes terribles d'
sanguinaire ennemi; et quel-
ont ajouté que la rencon-
annonçoit l'approche des
baleines, que, dans leur
aveugle, ils osent chercher
attaquer et combattre.

La pêche du microps est
pagnée de beaucoup de
présente d'ailleurs des diffé-
nières: la peau de ce physé-
peu épaisse, et sa graisse
sa chair, pour que le lard
lement retenu.

bientôt brisé cette masse congelée, qui, malgré sa dureté, se disperse en éclats, se dissipe en poussière cristalline, et lui livre la proie qu'il veut dévorer.

Son audace s'enflamme lorsqu'il voit des jubartes ou des balcinoptères à museau pointu ; il ose s'élancer sur ces grands cétacées, et les déchire avec ses dents recourbées, si fortes et si nombreuses.

On dit même que la baleine franche, lorsqu'elle est encore jeune, ne peut résister aux armes terribles de ce féroce et sanguinaire ennemi ; et quelques pêcheurs ont ajouté que la rencontre des microps annonçoit l'approche des plus grandes baleines, que, dans leur sorte de rage aveugle, ils osent chercher sur l'océan, attaquer et combattre.

La pêche du microps est donc accompagnée de beaucoup de dangers. Elle présente d'ailleurs des difficultés particulières : la peau de ce physétère est trop peu épaisse, et sa graisse ramollit trop sa chair, pour que le harpon soit facilement retenu.

Ce cétacée habite dans les mers voisines du cercle polaire.

En décembre 1723, dix-sept microps furent poussés, par une tempête violente, dans l'embouchure de l'Elbe. Les vagues amoncelées les jetèrent sur des bas-fonds; et comme nous ne devons négliger aucune comparaison propre à répandre quelque lumière sur les sujets que nous étudions, que l'on rappelle ce que nous avons écrit des macrocéphales précipités par la mer en courroux contre la côte voisine d'Audierne.

Les pêcheurs de Cuxhaven, sur le bord de l'Elbe, crurent voir dix-sept bâtimens hollandois amarrés au rivage. Ils gouvernèrent vers ces bâtimens; et ce fut avec un grand étonnement qu'ils trouvèrent à la place de ces vaisseaux dix-sept cétacées que la tempête avoit jetés sur le sable, et que la marée, en se retirant avec d'autant plus de vivacité qu'elle étoit poussée par un vent d'est, avoit abandonnés sur la grève. Les moins grands de ces dix-sept microps étoient longs de treize ou quatorze mètres, et les plus grands

DES PHYSÉTÈRES
avoient près de vingt-quatre
longueur. Les barques de pêche
rées à côté de ces physétères
comme les chaloupes des
cétacées représentoient. Ils
tournés vers le nord, parce
succombé sous la même pu
couchés sur le côté, morts,
encore froids: et ce que no
pas passer sous silence, c
trace ce que nous avons d
sibilité des cétacées, cette
microps renfermoit huit fem
males; huit mâles avoien
près de lui sa femelle, av
avoit expiré.

avoient près de vingt-quatre mètres de longueur. Les barques de pêcheurs amarées à côté de ces physétères paroisoient comme les chaloupes des navires que ces cétacées représentoient. Ils étoient tous tournés vers le nord, parce qu'ils avoient succombé sous la même puissance, tous couchés sur le côté, morts, mais non pas encore froids : et ce que nous ne devons pas passer sous silence, et ce qui retrace ce que nous avons dit de la sensibilité des cétacées, cette troupe de microps renfermoit huit femelles et neuf mâles ; huit mâles avoient chacun auprès de lui sa femelle, avec laquelle il avoit expiré.

LE PHYSÉTÈRE ORTHODON.

LA tête de l'orthodon, conformée à peu près comme celle des autres physétères, a une longueur presque égale à la moitié de la longueur du cétacée. L'orifice commun des deux évents est placé au-dessus de la partie antérieure du museau. L'œil paroît aussi petit que celui de la baleine franche; mais sa couleur est jaunâtre, et il brille d'un éclat très-vif.

La mâchoire inférieure, plus étroite et

* *Physeter orthodon*; *physeter microps*, var B. Linné, édition de Gmelin; *cetus tripinnis*, *dentibus acutis, rectis*, Brisson, Regn. anim. p. 362, n. 9; *zweyte species der cachelote*, Anderson, Island. p. 246; *variété A du cachalot trumpo*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *Lalæna macrocephala in inferiore tantum maxillâ dentata, dentibus acutis, humanis non prorsus absimilibus, pinnam in dorso habens*. — Plusieurs auteurs du Nord.

DES PHYSÉTÈRES

plus courte que celle d'en-
tant près de six mètres
que le cétacée est long de
mètres. Elle forme un angle
antérieure.

Elle est garnie de cinquante
dents, droites, aiguës. P
plus d'un kilogramme. Ce
nous a suggéré le nom *orthodon*
*, par lequel nous av
distinguer le cétacée que n

Chacune de ces dents est
alvéole de la mâchoire
comme on peut l'imaginer
en résulte une application
des mâchoires l'une contre
lorsque la bouche est fermée
difficile de distinguer la
lèvres.

La gueule n'est pas aussi
portion que celle de la baleine
langue, que sa couleur d
vif fait aisément apperce
et pointue; mais la gueule

* *Orthos*, en grec, signifie
gauche dent, etc.

don, conformée à peu
des autres physétères,
esque égale à la moitié
cétacée. L'orifice com-
nts est placé au-dessus
eure du museau. L'œil
que celui de la baleine
couleur est jaunâtre,
lat très-vif.

érieure, plus étroite et

on ; *Physeter microps*, 20
e Gmelin; *Cetus tripinnatus*,
t s, Brissou, Regn. anim.
species der cachelote, An-
t 6; variété A du cachelote
planches de l'Encyclopédie
macrocephala in inferno
tata, dentibus acutis, bu-
similibus, pinnam in dor-
auteurs du Nord.

DES PHYSÉTÈRES. 135

plus courte que celle d'en-haut, a cepen-
dant près de six mètres de longueur,
lorsque le cétaée est long de vingt-quatre
mètres. Elle forme un angle dans sa partie
antérieure.

Elle est garnie de cinquante-deux dents
fortes, droites, aiguës, pesant chacune
plus d'un kilogramme, et dont la forme
nous a suggéré le nom spécifique d'*ortho-*
don *, par lequel nous avons cru devoir
distinguer le cétaée que nous décrivons.

Chacune de ces dents est reçue dans un
alvéole de la mâchoire supérieure; et
comme on peut l'imaginer aisément, il
en résulte une application si exacte des
deux mâchoires l'une contre l'autre, que
lorsque la bouche est fermée, il est très-
difficile de distinguer la séparation des
lèvres.

La gueule n'est pas aussi grande à pro-
portion que celle de la baleine franche. La
langue, que sa couleur d'un rouge très-
vif fait aisément appercevoir, est courte
et pointue; mais le gosier est si large,

* *Orthos*, en grec, signifie *droit*; *odoys* si-
gnifie *dent*, etc.

qu'on a trouvé dans l'estomac de l'orthodon, des squales requins tout entiers et de plus de quatre mètres de longueur. Ce physétère vaincroit sans peine des ennemis plus puissans. Sa longueur, voisine de celle de plusieurs baleines franches, peut s'étendre, en effet, à plus de trente-trois mètres.

Ses pectorales néanmoins sont beaucoup plus petites que celles du microps : elles n'ont souvent qu'un demi-mètre de longueur. On a compté sept articulations ou phalanges au doigt le plus long des cinq qui composent l'extrémité de ces nageoires.

Une bosse très-haute s'élève sur la partie antérieure du dos, à une certaine distance de la nageoire dorsale.

La peau, très-mince, n'a pas quelquefois deux centimètres d'épaisseur ; mais la chair est si compacte, qu'elle présente au harpon une très-grande résistance, et rend l'orthodon presque invulnérable dans la plus grande partie de sa surface.

Ce physétère est ordinairement noirâtre ; mais une nuance blanchâtre règne

DES PHYSETÈRES
une grande partie de sa
ore. Par combien de diffé-
ce distingué du microps ?
dents, sa bosse dorsale
ses pectorales, ses dimen-
sures de ses muscles, l'en-
est séparé, et par des trait-
par sa conformation inter-
On a vu un orthodon dor-
rité de la tête contenoit
ante myriagrammes de bla-
ure¹. On l'avoit pris dans
al arctique, vers le soix-
me degré et demi de latitu-

¹ Consultez, au sujet de l'adip-
cachalot macrocéphale.

Anderson ; et *Histoire des p-*
chais dans les mers du Nord
zigyen Dereste, tome I, p.

sur une grande partie de sa surface inférieure. Par combien de différences n'est-il pas distingué du microps ? Sa couleur, ses dents, sa bosse dorsale, la brièveté de ses pectorales, ses dimensions et la nature de ses muscles, l'en éloignent. Il en est séparé, et par des traits extérieurs, et par sa conformation intérieure.

On a vu un orthodon dont la grande cavité de la tête contenoit plus de cinquante myriagrammes de *blanc* ou d'*adipocire*¹. On l'avoit pris dans l'Océan glacial arctique, vers le soixante-dix-septième degré et demi de latitude².

¹ Consultez, au sujet de l'*adipocire*, l'article du *cachalot macrocéphale*.

² *Anderson*; et *Histoire des pêches des Hollandois dans les mers du Nord*, traduite par le citoyen *Dereste*, tome I, p. 173.

LE PHYSÉTÈRE MULAR*.

La nageoire qui s'élève sur le dos de ce physétère, est si droite, si pointue et si longue, que Sibbald et d'autres auteurs l'ont comparée à un mât de navire, et ont dit qu'elle paroissoit au-dessus du corps du mular, comme un mât de misaine au-dessus d'un vaisseau. Cette comparaison est sans doute exagérée; mais

* *Physeter mular*; *physeter tursio*, Linné, édit. de Gmelin; *cachalot mular*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *physeter dorsi pinnâ altissimâ, apice dentium plano*, Artedi, gen. 74, syn. 104; *cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus*, Brisson, Regn. anim. p. 364, n. 7; *balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minus inflexos et in planum desinentes*, Sibbald; *id.* Raj. Pisc. p. 16; *mular Nieremburgii*, Klein, Misc. pisc. 2, p. 15; Anderson, Histoire d'Islande, etc. 2, p. 118; *le mular*, R. R. Castel, nouvelle édition de Bloch.

DES PHYSÉTÈRES
ne prouve la grande hauteur
qui seule a pu en faire
Mais, indépendamment
si élevée, on voit
au-delà de cette éminence,
la première a souvent
de hauteur, la secon
deux décimètres, et la troi
mètre.

Ces traits seuls feroient dis
ment le mular du microps
on; mais d'ailleurs les den
ont une forme différente de
l'orthodon et de celles du micr
Elles ne sont pas très-cour
s dents du microps, ni dro
elles de l'orthodon; et leur
ne d'être aigu, est très-ém
que plat.

De plus, les dents du
gales: les plus grandes son
le bout du museau; elles
sont un centimètre de
sont quatre de circonferen
sont le plus de gross
grandes ne sont longues

i s'élève sur le dos de
si droite, si pointue et
bald et d'autres autem
à un mât de navire, et
paroissoit au-dessus de
, comme un mât de mi
d'un vaisseau. Cette con
ns doute exagérée; ma

ar; *physeter tursio*, Linn.
achalot mular, Bonnaterre
lopédie méthodique; *physeter*
mâ, *apice dentium plani*
104; *cetus tripinnis*, de
desinentibus, Brisson, Reç.
halæna macrocephala in
dibulâ inferiore dentes hanc
planum desinentes, Sibbald.
mular Nicremburgii, Klein
15; Anderson, Histoire d'Éc.
16; le mular, R. R. Casse.
Blocq.

DES PHYSÉTÈRES. 139

elle prouve la grande hauteur de cet organe, qui seule a pu en faire naître l'idée.

Mais, indépendamment de cette nageoire si élevée, on voit sur le dos et au-delà de cette éminence, trois bosses dont la première a souvent un demi-mètre de hauteur, la seconde près de deux décimètres, et la troisième un décimètre.

Ces traits seuls feroient distinguer facilement le mular du microps et de l'orthodon; mais d'ailleurs les dents du mular ont une forme différente de celles de l'orthodon et de celles du microps.

Elles ne sont pas très-courbées, comme les dents du microps, ni droites, comme celles de l'orthodon; et leur sommet, au lieu d'être aigu, est très-émoussé ou presque plat.

De plus, les dents du mular sont inégales: les plus grandes sont placées vers le bout du museau; elles peuvent avoir vingt-un centimètres de longueur, sur vingt-quatre de circonférence, à l'endroit où elles ont le plus de grosseur: les moins grandes ne sont longues alors que de

seize centimètres. Toutes ces dents ne renferment pas une cavité.

On découvre une dent très-aplatie dans plusieurs des intervalles qui séparent l'un de l'autre les alvéoles de la mâchoire supérieure.

Les deux évents aboutissent à un seul orifice.

Les mulars vont par troupes très-nombreuses. Le plus grand et le plus fort de ces physétères réunis leur donne, pour ainsi dire, l'exemple de l'audace ou de la prudence, de l'attaque ou de la retraite. Il paroît, d'après les relations des marins, comme le conducteur de la légion, et, suivant un navigateur cité par Anderson, il lui donne, *par un cri terrible*, et dont la surface de la mer propage au loin le frémissement, le signal de la victoire ou d'une fuite précipitée.

On a vu des mulars si énormes, que leur longueur étoit de plus de trente-trois mètres. On ne leur donne cependant la chasse que très-rarement, parce que leur caractère farouche et sauvage rend leur rencontre peu fréquente, et leur approche

DES PHYSÉTÈRES
ou dangereuse. D'un
et faire pénétrer aisément
leur corps, qu'en le la-
petit espace que l'on voit a-
et leur graisse four-
lité.

On a reconnu néanmoins qu'
née dans la partie antérieure
contenoit beaucoup d'adipocire
cavité étoit divisée en vici-
remplies de cette substance
presque toute la graisse d'
mélée avec cet adipocire
trouvait plusieurs dépôts
ce blanc dans différentes
de ce cétacée.

Sous pouvons donc assurer
cet adipocire se trouve en
tité, distingué par les m-
et disséminé de la même
toutes les espèces connues
cachalots, de celui des phy-
des physétères.

On a écrit que lorsque le m-
onger dans la mer, il com-
Voyez l'article du cachalot

pénible ou dangereuse. D'ailleurs, on ne peut faire pénétrer aisément le harpon dans leur corps, qu'en le lançant dans un petit espace que l'on voit au-dessus du bras; et leur graisse fournit très-peu d'huile.

On a reconnu néanmoins que la cavité située dans la partie antérieure de leur tête contenoit beaucoup d'adipocire; que cette cavité étoit divisée en vingt-huit cellules remplies de cette substance blanche; que presque toute la graisse du physétère étoit mêlée avec cet adipocire, et qu'on découvroit plusieurs dépôts particuliers de ce blanc dans différentes parties du corps de ce cétacée.

Nous pouvons donc assurer maintenant que cet adipocire se trouve en très-grande quantité, distingué par les mêmes qualités et disséminé de la même manière, dans toutes les espèces connues du genre des cachalots, de celui des physales, et de celui des physétères *.

On a écrit que lorsque le mular vouloit plonger dans la mer, il commençoit par

* Voyez l'article du *cachalot macrocéphale*.

se coucher sur le côté droit; et les mêmes auteurs ont ajouté que ce cétacée pouvoit rester sous l'eau pendant plus de temps que la baleine franche.

On l'a rencontré dans l'Océan atlantique septentrional, ainsi que dans l'Océan glacial arctique, et particulièrement dans la mer du Groenland, dans les environs du cap Nord, et auprès des îles Orcades.

LES DELPHINAPT

DELPHINAPTÈRE B

Ce cétacée a porté pendant
nom de *petite baleine* et de *bal*

Consultez l'article intitulé *No*
trées, et le tableau général des
espèces de ces animaux.

Delphinapterus beluga; *ma*
Walfisch; *balæna obliquans*: *27*
am.; édit. de Gmelin; *delphin*
27, *scorpaen* *inclinata*, *planch*
28, *l. 2*, p. 92. *Walfisch* de
Walfisch, *planch* de *Planch*
29; *delphin* *Walfisch* de *Walfisch*
30 animal. p. 374, *l. 5*; *Walfisch*
31, p. 357; *Walfisch*, *Walfisch*
32; *Walfisch* *Walfisch*
33, p. 251; *Walfisch*, *Walfisch*
34, *Walfisch*, *Walfisch*
35, *Walfisch*, *Walfisch*

RE NATURELLE.
le côté droit; et les mi-
uté que ce cétacée pour-
u pendant plus de ter-
ranche.

tré dans l'Océan atlantiq-
ainsi que dans l'Océan
t particulièrement dans
and, dans les environs
près des îles Orcades.

LES DELPHINAPTÈRES¹.

LE DELPHINAPTÈRE BÉLUGA².

Ce cétacée a porté pendant long-temps
le nom de *petite baleine* et de *baleine blanche*.

¹ Consultez l'article intitulé *Nomenclature des cétacées*, et le tableau général des ordres, genres et espèces de ces animaux.

² *Delphinapterus beluga*; marsouin blanc; wittfisch; *balæna albicans*; *delphinus leucas*, Linné, édit. de Gmelin; *delphinus rostro conico obtuso, deorsum inclinato, pinnâ dorsali nullâ*, Pallas, It. 3, p. 84, tab. 4; *dauphin béluga*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *delphinus pinnâ in dorso nullâ*, Brisson, Regn. animal. p. 374, n. 5; *beluga*, Pennant, Quadr. p. 357; *bieluga*, Steller, Kamtschatka, p. 106; *witfisch oder weissfisch*, Anderson Island. p. 251; *weisfisch*, Crauz, Groenland. p. 150; Mull. Prodrum. Zoolog. Dan. p. 50; Oth. Fabric. Faun. Groenland. p. 50.

Il a été l'objet de la recherche des premiers navigateurs basques et hollandois qui osèrent se hasarder au milieu des montagnes flottantes de glaces et des tempêtes horribles de l'Océan arctique, et qui, effrayés par la masse énorme, les mouvemens rapides et la force irrésistible des baleines franches, plus audacieux contre les élémens conjurés que contre ces colosses, ne bravoient encore que très-rarement leurs armes et leur puissance.

On a trouvé que le béluga avoit quelques rapports avec ces baleines, par le défaut de nageoire dorsale et par la présence d'une saillie peu sensible, longitudinale, à demi calleuse, et placée sur sa partie supérieure; mais par combien d'autres traits n'en est-il pas séparé!

Il ne parvient que très-rarement à une longueur de plus de six ou sept mètres. Sa tête ne forme pas le tiers ou la moitié de l'ensemble du cétacée, comme celle de la baleine franche, des cachalots, des physales, des physétères : elle est petite et alongée. La partie antérieure du corps représente un cône, dont la base, située

DES DELPHINAPTÈ
les pectorales, est appu
ed un autre cône beaucoup
que composent le reste du
teue.

Les nageoires pectorales
cisses et ovales; et les plu
ngis cachés sous leur en
q articulations.

Le museau s'allonge et s'a
cant.

L'œil est petit, rond, sailla

Le dessus de la partie anté

ne proprement dite montre

prance au milieu de laquelle

que commun de deux éventu

de cet orifice est telle, s

observateurs, que l'on

etée par les vents, au lieu

avant, comme par le

verticalement, comme

autres cétacées, est classé

amère

On découvre derrière l'œil

du canal auditif; mais

perceptible.

Génée II.

DES DELPHINAPTÈRES. 145

vers les pectorales, est appuyée contre celle d'un autre cône beaucoup plus long, et que composent le reste du corps et la queue.

Les nageoires pectorales sont larges, épaisses et ovales; et les plus longs des doigts cachés sous leur enveloppe ont cinq articulations.

Le museau s'allonge et s'arrondit par-devant.

L'œil est petit, rond, saillant et bleuâtre.

Le dessus de la partie antérieure de la tête proprement dite montre une protubérance au milieu de laquelle on voit l'orifice commun de deux événements; et la direction de cet orifice est telle, suivant quelques observateurs, que l'eau de la mer, rejetée par les événements, au lieu d'être lancée en avant, comme par les cachalots, ou verticalement, comme par plusieurs autres cétacées, est chassée un peu en arrière.

On découvre derrière l'œil l'orifice extérieur du canal auditif; mais il est presque imperceptible.

L'ouverture de la gueule paroît petite à proportion de la longueur du delphinaptère : elle n'est pas située au-dessous de la tête, comme dans les cachalots, les physales et les physétères, mais à l'extrémité du museau.

La mâchoire inférieure avance presque autant que celle d'en-haut. Chaque côté de cette mâchoire est garni de dents au nombre de neuf, petites, émoussées à leursommet, éloignées les unes des autres, inégales, et d'autant plus courtes qu'elles sont plus près du bout du museau.

Neuf dents un peu moins obtuses, un peu recourbées, mais d'ailleurs semblables à celles que nous venons de décrire, garnissent chaque côté de la mâchoire supérieure.

La langue est attachée à la mâchoire d'en-bas.

Le béluga se nourrit de pleuronectes soles, d'holocentres norvégiens, de plusieurs gades, particulièrement d'églefins et de morues. Il les cherche avec constance, les poursuit avec ardeur, les avale avec avidité; et comme son gosier est très-

DES DELPHINAPTÈRES
il court souvent le danger
acquies par une proie trop vo-
trop abondante.
Ces alimens substantiels et co-
ent à sa chair une teinte v-
générale.

La graisse qui la recouvre
un centimètre d'épaisseur; mais
elle, que souvent elle ne pe-
le harpon. La peau, qui est
unie, est d'ailleurs déch-
par cet instrument, e-
lueuse, et épaisse quelquefo-
trois centimètres.

Aussi ne cherche-t-on pres-
prendre des bélugas; mais on l-
se paroître sur la surface des
quelques pêcheurs, oubl-
curriture de ces cétacées e-
de celle des baleines f-
édité l'opinion que ces ba-
delphinaptères fréquentent
dans les mêmes sa-
ser les mêmes alimens,
quent annoncent l'approc-
autres.

étroit, il court souvent le danger d'être suffoqué par une proie trop volumineuse ou trop abondante.

Ces alimens substantiels et copieux donnent à sa chair une teinte vermeille et rougeâtre.

La graisse qui la recouvre a près d'un décimètre d'épaisseur; mais elle est si molle, que souvent elle ne peut pas retenir le harpon. La peau, qui est très-douce, très-unie, est d'ailleurs déchirée facilement par cet instrument, quoiqu'ongueuse, et épaisse quelquefois de deux ou trois centimètres.

Aussi ne cherche-t-on presque plus à prendre des bélugas; mais on les voit avec joie paroître sur la surface des mers, parce que quelques pêcheurs, oubliant que la nourriture de ces cétacées est très-différente de celle des baleines franches, ont accrédité l'opinion que ces baleines et ces delphinaptères fréquentent les mêmes parages dans les mêmes saisons, pour trouver les mêmes alimens, et par conséquent annoncent l'approche les uns des autres.

Au reste , comment , au milieu des ennuis d'une longue navigation , ne verroit-on pas avec plaisir les vastes solitudes de l'océan animées par l'apparition de cétacées remarquables dans leurs dimensions , sveltes dans leurs proportions , agiles dans leurs mouvemens , rapides dans leur natation , réunis en grandes troupes , montrant de l'attachement pour leurs semblables , familiers même avec les pêcheurs , s'approchant avec confiance des vaisseaux , leur composant une sorte de cortège , se jouant avec confiance autour de leurs chaloupes , et se livrant presque sans cesse et sans aucune crainte à de vives évolutions , à des combats simulés , à de joyeux ébats ?

Leurs nuances sont d'ailleurs si agréables !

Leur couleur est blanchâtre ; des taches brunes et d'autres taches bleuâtres sont répandues sur ce fond gracieux pendant que les bélugas ne sont pas très-âgés. Plus jeunes encore , ils offrent un plus grand nombre de teintes foncées ou mêlées de bleu ; et l'on a écrit que , très-peu de

DES DELPHINAPTÈRES
 temps après leur naissance , leur surface est blanchâtre.
 Des fœtus arrachés du ventre ont paru d'une couleur Laquelle ne porte ordinairement à la fois.

Ce delphinaptère , parvenu à l'âge de quatre mois , quitte sa mère que très-bientôt à ses côtés , plonge avec elle respirer l'air , suit tous ses mouvements , toutes ses actions , et suce le lait de deux mamelles très-voisines de l'organe de la génération.

On a joui de ce spectacle touchant d'un attachement d'une affection vive et d'une attention , dans l'Océan glacial , dans l'Océan atlantique , particulièrement dans l'Arctique , par Davis.

On a écrit que , pendant les hivers , les bélugas qu'on trouve sur les bords gelés , et les bords que les glaces couvrent ; mais ce qui est

DES DELPHINAPTÈRES. 149

temps après leur naissance, presque toute leur surface est bleuâtre.

Des foetus arrachés du ventre de leur mère ont paru d'une couleur verte.

La femelle ne porte ordinairement qu'un petit à la fois.

Ce delphinaptère, parvenu à la lumière, ne quitte sa mère que très-tard. Il nage bientôt à ses côtés, plonge avec elle, revient avec elle respirer l'air de l'atmosphère, suit tous ses mouvemens, imite toutes ses actions, et suce un lait très-blanc de deux mamelles très-voisines de l'organe de la génération.

On a joui de ce spectacle agréable et touchant d'un attachement mutuel, d'une affection vive et d'une tendresse attentive, dans l'Océan glacial arctique et dans l'Océan atlantique septentrional, particulièrement dans le détroit de Davis.

On a écrit que, pendant les hivers rigoureux, les bélugas quittent la haute mer et les plages gelées, pour chercher des baies que les glaces n'aient pas envahies ; mais ce qui est plus digne

d'attention, c'est qu'on a vu de ces delphinaptères remonter dans des fleuves.

Notre célèbre confrère M. Pallas , qui a répandu de si grandes lumières sur toutes les branches de l'histoire naturelle , est un des savans qui nous ont le plus éclairés au sujet du béluga.

Le cétacé devient très-grand. Sa gueule est vaste, les dents sont aiguës; on en voit neuf de la mâchoire supérieure et dix de la mâchoire d'en-bas. L'opercule est aussi avancée que celle du requin et présente au moins huit. La nageoire est grande et charnue. L'orifice anal est placé entre les deux évents, est situé au-dessus des yeux, mais un peu en dedans du museau, qui est alongé. Cet orifice a plus de largeur que chez plusieurs autres cétacées; et

Delphinapterus senedon, ...
lar, des ...
senedon, ...
canadien, ...
sivant R ...
H source des ...
chap. 10, ...

LE DELPHINAPTÈRE SÉNEDETTE *.

CE cétacée devient très-grand, suivant Rondelet. Sa gueule est vaste : ses dents sont aiguës ; on en voit neuf de chaque côté de la mâchoire supérieure ; et chacun des côtés de la mâchoire d'en-bas, qui est presque aussi avancée que celle d'en-haut, en présente au moins huit. La langue est grande et charnue. L'orifice auquel aboutissent les deux évents, est situé presque au-dessus des yeux, mais un peu plus près du museau, qui est alongé et pointu.

Cet orifice a plus de largeur que celui de plusieurs autres cétacées ; et le sénedette

* *Delphinapterus senedetta* ; mular ; souffleur ; peis mular, dans les départemens méridionaux de France ; sénedette, dans plusieurs autres départemens ; capidolio, en Italie ; physer, par les Grecs, suivant Rondelet ; mular ou sénedette, Rondelet, Histoire des poissons, première partie, liv. 16, chap. 10, édition de Lyon, 1558.

fait jaillir par cette ouverture une grande quantité d'eau.


Le corps et la queue forment un cône très-long. Les pectorales sont larges, et leur longueur égale celle de l'ouverture de la bouche.

Il paroît que le sénedette a été vu dans l'Océan et dans la Méditerranée.



E NATURELLE.
te ouverture une grande
queue forment un cône
ctorales sont larges, et
ale celle de l'ouverture
sénédetto a été vu dans
Méditerranée.





- | | | |
|-----|---------|---------------|
| 1 . | DAUPHIN | Vulgaire. |
| 2 . | DAUPHIN | Marsouin . |
| 3 . | DAUPHIN | Deux - dents. |

LES DAUPHINS¹.

LE DAUPHIN VULGAIRE².

QUEL objet a dû frapper l'imagination plus que le dauphin ? Lorsque l'homme

¹ Jetez les yeux sur l'article de cet ouvrage qui est intitulé, *Nomenclature des cétacées*, et sur le tableau des ordres, des genres et des espèces de ces animaux, qui est à la tête de cette Histoire.

² *Delphinus vulgaris* ; *bec d'oie* ; *simon* ; *camus* ; *delfino*, en Italie ; *tumberello*, par les Italiens ; *delphin*, *meerschwein*, *tummler*, en Allemagne ; *delfin*, en Pologne ; *marsoin*, en Danemarck ; *springen*, en Norvège ; *huyser*, *hofrung*, *leipter*, en Islande ; *dolphin-tuynebaar*, en Hollande ; *dolphin*, *grampus*, *porpeisse*, en Angleterre ; *delphinus delphis*, Linné, édit. de Gmelin ; *le dauphin*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique ; *delphinus corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto*, Artedi, gen. 76, syn. 105 ; *delphis*, Schneider, Petri Artedi Synonymia. græca et latina, emendata, aucta atque illustrata, etc. p. 149 ;

Vulgaire
Marsoin
Deux-dents


parcourt le vaste domaine que son génie a conquis, il trouve le dauphin sur la surface de toutes les mers; il le rencontre et dans les climats heureux des zones tempérées, et sous le ciel brûlant des mers équatoriales, et dans les horribles vallées qui séparent ces énormes montagnes de glace que le temps élève sur la surface de l'Océan polaire comme autant de monu-

Ο * *Δελφίς*, Aristot, lib. 1, cap. 5; lib. 2, cap. 13; lib. 3, cap. 1, 7; lib. 4, cap. 8, 9 et 10; lib. 5, cap. 5; lib. 8, cap. 2, 13; lib. 9, cap. 48; et part. lib. 4, cap. 13; *id.* Athen. lib. 7, p. 282, et lib. 8, p. 353; *Δελφίν*, Ælian. lib. 1, cap. 18; lib. 2, cap. 6; lib. 6, cap. 15; lib. 8, cap. 3; lib. 10, cap. 8; lib. 11, cap. 12; et lib. 12, cap. 6, 45; *Δελφίς*, *Ἴνος*, Oppian, lib. 1, p. 15, 22, 25; et lib. 2; *delphinus*, Plin. lib. 9, cap. 7, 8; lib. 11, cap. 37; et lib. 32, cap. 11; *id.* Wotton. lib. 8, cap. 194, fol. 171, *b*; *id.* Gesner, p. 319; et (germ.) fol. 92, 93, *a*; *id.* Jonston. lib. 5, cap. 2, a 4, p. 218, tab. 43, fig. 2, 3, 4; Thaumal, p. 414; *delphinus prior*, Aldrovand. Cel. cap. 7, p. 701, 703, 704; *delphinus antiquorum*, Raj. p. 12; *id.* Willughby, p. 28, tab. A 1, fig. 1; *delphin*, Solin, Polyhistor, cap. 18; *id.* Ambros. Hexam. lib. 5, cap. 2, 3; *id.* C. Figul. fol. 5, a-b; *delphinus*

RE NATURELLE
ste domaine que son gér
trouve le dauphin sur
es les mers; il le rencon
ats heureux des zones ter
s le ciel brûlant des me
et dans les horribles val
s énormes montagnes
mps élève sur la surface
comme autant de mont

, lib. 1, cap. 5; lib. 2, cap. 1
lib. 4, cap. 8, 9 et 10; lib. 3
ap. 2, 13; lib. 9, cap. 40;
13; *id.* Athen. lib. 7, p. 22
Athen. Aelian. lib. 1, cap. 1
b. 6, cap. 15; lib. 8, cap.
lib. 11, cap. 12; et lib. 1
, *hoc.* Oppian, lib. 1, p. 1
delphinus, Plin. lib. 9, cap.
37; et lib. 32, cap. 11; *id.*
cap. 194, fol. 171, b;
(germ.) fol. 92, 93, a;
ap. 2, a 4, p. 218, tab. 4
nat, p. 414; *delphinus* pri
p. 7, p. 701, 703, 704; *id.*
, Raj. p. 12; *id.* Willeg.
fig. 1; *delphin*, Solin, P.
id. Ambros. Hexam. lib.
Figul. fol. 5, a-b; *delphinus*





1. Tête osseuse de *DAUPHIN* Vulgaire.

2. *Squelette de DAUPHIN Marsouin.*

DES DAUPHINS

funéraires de la Nature qui
doit leger dans

...out il le voit, léger dans
...ide dans sa natation

rapide dans sa natation
bonds, se plaire auto

se plaire auto
par ses évolutions vive

...des calmes prolongés.

...des calmes prolongés.
...solitudes de l'océan.

...l'éclair, s'échapper...

qui fend l'air, reparoitre

in dorso unâ, *dentibus* ac

in dorso una, *dentibus* ac
macuto, Brissou, Regn. anim. p.
Ballou, Agnatil. p.

...inus, Bollon, Aquatil, p. 7
...elet, première partie, liv. 16.

...première partie, liv. 16.

1856; in 1857, 31
Cane. Ex. 1857
P. 1857

[illegible]

1922, Jan. 3. A. 1.

Sci. an. p. 21: 1811
25; ed. (1811), (1811)
Fam. G.

...
 ...
 ...
 ...
 ...

2. R. Case, 1911

Case, John P.
P. M., 1890
1891

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

...C. ...

[illegible]

... Histoire des rois...

... des personnes

DES DAUPHINS. 155

mens funéraires de la Nature qui y expire : par-tout il le voit, léger dans ses mouvemens, rapide dans sa natation, étonnant dans ses bonds, se plaire autour de lui, charmer par ses évolutions vives et folâtres l'ennui des calmes prolongés, animer les immenses solitudes de l'océan, disparoître comme l'éclair, s'échapper comme l'oiseau qui fend l'air, reparoître, s'enfuir,

pinnâ in dorso unâ, dentibus acutis, rostro longo acuto, Brisson, Regn. anim. pag. 369, n. 1; *delphinus*, Bellon, Aquatil, p. 7; *dauphin*, Rondelet, première partie, liv. 16, ch. 5 (édit. de Lyon 1558); *delphinus*, Mus Wormian, p. 288; *id.* Charlet. Exerc. pisc. p. 47; *delphinus*, Rzaczyns. Pol. auct. p. 238; *id.* Klein, Misc. pisc. 2, p. 24, tab. 3, fig. A; *porcus marinus*, Sibbald, Scot. an. p. 23; *delphin*, Anderson, Isl. p. 254; *id.* Ciaz, Groenl. p. 152; Oth. Fabric. Faun. Groenland. p. 4; Mull Zoolog. Dan Prodrum. p. 7, n. 55; *dauphin proprement dit*, R. R. Castel, édition de Bloch; *dauphin*, Valmont-Bomare, Dictionnaire d'histoire naturelle; *delphinus corpore tereti conico elongato, rostro stoloïde*, Commerson, manuscrits adressés à Buffon, qui nous les remit lorsqu'il nous engagea à continuer l'Histoire naturelle, et cités dans l'Histoire des poissons.

DAUPHIN Vulgaire.
DAUPHIN Marsouin

se montrer de nouveau, se jouer avec les flots agités, braver les tempêtes, et ne redouter ni les élémens, ni la distance, ni les tyrans des mers.

Revenu dans ces retraites paisibles que son goût s'est plu à orner, il jouit encore de l'image du dauphin que la main des arts a tracée sur les chefs-d'œuvre qu'elle a créés; il en parcourt la touchante histoire dans les productions immortelles que le génie de la poésie présente à son esprit et à son cœur; et lorsque, dans le silence d'une nuit paisible, dans ces momens de calme et de mélancolie où la méditation et de tendres souvenirs donnent tant de force à tout ce que son âme éprouve, il laisse errer sa pensée de la terre vers le ciel, et qu'il lève les yeux vers la voûte éthérée, il voit encore cette même image du dauphin briller parmi les étoiles.

Cet objet cependant, si propre à séduire l'imagination de l'homme, est en partie l'ouvrage de cette imagination : elle l'a créé pour les arts et pour le firmament. Mais ce n'est pas la terreur qui lui a donné un nouvel être, comme elle a enfanté le

DES DAUPHINS
 terrible dragon, la terreur
 de monstres fantastiques
 enfance, de la tendresse et
 c'est la reconnaissance
 une nouvelle vie. Avec
 que l'embellir, le rendre plus
 diviniser pour des bienfaits,
 toute sa force et dans toute
 influence de cet esprit des Gé
 quels la nature étoit si riante
 et la terre et les airs, et les
 vagues, et les monts couverts
 vallons fleuris, se peuploient
 voluptueux, de plaisirs variés
 indulgentes, d'amours in
 génie d'Odin ou celui d'Os
 conçu au milieu des ne
 contrées polaires; et si le
 Nature appartient à tous
 des poètes n'appartient qu'
 Mais, avant de nous transpo
 ces fortunés, et de rappeller
 dauphin poétique, voyez
 de navigateurs : la fable
 bien doux : mais quels
 vœux de ceux de la vérité

redoutable dragon, la terrible chimère, et tant de monstres fantastiques, l'effroi de l'enfance, de la foiblesse et de la crédulité; c'est la reconnoissance qui lui a donné une nouvelle vie. Aussi n'a-t-elle fait que l'embellir, le rendre plus aimable, le diviniser pour des bienfaits, et montrer dans toute sa force et dans toute sa pureté l'influence de cet esprit des Grecs, pour lesquels la nature étoit si riante, pour lesquels et la terre et les airs, et la mer et les fleuves, et les monts couverts de bois, et les vallons fleuris, se peuploient de jeux voluptueux, de plaisirs variés, de divinités indulgentes, d'amours inspirateurs. Le génie d'Odin ou celui d'Ossian ne l'ont pas conçu au milieu des noirs frimas des contrées polaires; et si le dauphin de la Nature appartient à tous les climats, celui des poètes n'appartient qu'à la Grèce.

Mais, avant de nous transporter sur ces rivages fortunés, et de rappeler les traits de ce dauphin poétique, voyons de près celui des navigateurs : la fable a des charmes bien doux; mais quels attrails sont au-dessus de ceux de la vérité?

Les formes générales du dauphin vulgaire sont plus agréables à la vue que celles de presque tous les autres cétacées : ses proportions sont moins éloignées de celles que nous regardons comme le type de la beauté. Sa tête, par exemple, montre, avec les autres parties de ce cétacée, des rapports de dimension beaucoup plus analogues à ceux qui nous ont charmés dans les animaux que nous croyons les plus favorisés par la Nature. Son ensemble est comme composé de deux cônes alongés presque égaux, et dont les bases sont appliquées l'une contre l'autre. La tête forme l'extrémité du cône antérieur ; aucun enfoncement ne la sépare du corps proprement dit, et ne sert à la faire reconnoître : mais elle se termine par un museau très-distinct du crâne, très-avancé, très-aplati de haut en bas, arrondi dans son contour de manière à présenter l'image d'une portion d'ovale, marqué à son origine par une sorte de pli, et comparé par plusieurs auteurs à un énorme *bec d'oie* ou de *cygne*, dont ils lui ont même donné le nom.

DES DAUPHINS
 Les deux mâchoires composées
 et comme elles sont aussi
 presque aussi avancées l'une
 il est évident que l'ouver-
 ture n'est pas placée au-dess-
 us, comme dans les cachalots
 et les physétères. Cette ou-
 verture a une longueur égale au
 même au huitième de la lon-
 gueur du dauphin. On voit à cha-
 que mâchoire une rangée de dents un-
 guées, pointues, et placées de
 sorte que lorsque la bouche se ferme
 les dents d'en-bas entrent dans les inter-
 valles de celles d'en-haut, qu'elles
 se couvrent dans leurs intervalles ; ce
 qui se fait très-exactement.
 Le nombre de ces dents varie
 avec l'âge ou suivant le
 sexe. Les uns ont compté
 dix-huit à la mâchoire d'en-
 haut et dix-huit à celle d'en-bas. Le
 docteur Linné en a trouvé quarante
 dans la mâchoire d'un individu
 appartenant à l'école vétérinaire
 de Paris. On a écrit qu'un dauphin

Les deux mâchoires composent ce museau; et comme elles sont aussi avancées ou presque aussi avancées l'une que l'autre, il est évident que l'ouverture de la bouche n'est pas placée au-dessous de la tête, comme dans les cachalots, les physales et les physétères. Cette ouverture a d'ailleurs une longueur égale au neuvième ou même au huitième de la longueur totale du dauphin. On voit à chaque mâchoire une rangée de dents un peu renflées, pointues, et placées de manière que lorsque la bouche se ferme, celles d'en-bas entrent dans les interstices qui séparent celles d'en-haut, qu'elles reçoivent dans leurs intervalles; et la gueule est close très-exactement.

Le nombre de ces dents peut varier, suivant l'âge ou suivant le sexe. Des naturalistes n'en ont compté que quarante-deux à la mâchoire d'en-haut, et trente-huit à celle d'en-bas. Le professeur Bonnaterre en a trouvé quarante-sept à chaque mâchoire d'un individu placé dans le cabinet de l'école vétérinaire d'Alfort. Klein a écrit qu'un dauphin observé par

lui en avoit quatre-vingt-seize à la mâchoire supérieure, et quatre-vingt-douze à l'inférieure.

La langue du dauphin, un peu plus mobile que celle de quelques autres cétacés, est charnue, bonne à manger, et, suivant Rondelet, assez agréable au goût. Elle ne présente aucune de ces papilles qu'on a nommées *coniques*, et qu'on trouve sur celle de l'homme et de presque tous les mammifères; mais elle est parsemée, surtout vers le gosier, d'éminences très-petites, percées chacune d'un petit trou. A sa base sont quatre fentes, placées à peu près comme le sont les glandes à calice que l'on voit sur la langue du plus grand nombre de mammifères, ainsi que sur celle de l'homme. Sa pointe est découpée en lanières très-étroites, très-courtes et obtuses *.

Les événements, dont il paroît que Rondelet connoissoit déjà la forme, la valvule in-

* Voyez les excellentes *Leçons d'anatomie comparée* de mon célèbre confrère Cuvier, publiées par l'habile professeur Duméril, tome II, p. 690.

DES DAUPHINS
 et la véritable position
 une seule ouverture
 au-dessus des yeux, et qu
 croissant dont les pointes
 le museau. L'œil n'est
 que la commissure des
 est séparé que par un petit
 lame de la pupille ressembl
 d'un cœur; et si l'on
 intérieur de l'organe de la v
 ppé par l'éclat que répand
 membrane à laquelle on
 nom de *ruyschienne*. Ce fond
 une sorte de couche d'un ja
 comme dans l'ours, le chat
 peut-être devoit-on remarque
 texture particulière qui de
 ruchsienne se trouve et dans
 l'œil, place le plus s
 de la surface de la
 la lumière qui au trav
 par une couche d'eau
 trouble et puis qu
 dans les quadrupèdes, dont
 me, extrêmement délicat
 très-peu lorsqu'ils sou

térieure et la véritable position, se réunissent dans une seule ouverture située à peu près au-dessus des yeux, et qui présente un croissant dont les pointes sont tournées vers le museau. L'œil n'est guère plus élevé que la commissure des lèvres, et n'en est séparé que par un petit intervalle; la forme de la pupille ressemble un peu à celle d'un cœur; et si l'on examine l'intérieur de l'organe de la vue, on est frappé par l'éclat que répand le fond de cette membrane à laquelle on a donné le nom de *ruyschienne*. Ce fond est revêtu d'une sorte de couche d'un jaune doré, comme dans l'ours, le chat et le lion. Peut-être devroit-on remarquer que cette contexture particulière qui dore ainsi la *ruyschienne*, se trouve et dans le dauphin, dont l'œil, placé le plus souvent au-dessous de la surface de la mer, ne reçoit la lumière qu'au travers du voile formé par une couche d'eau salée plus ou moins trouble et plus ou moins épaisse, et dans les quadrupèdes, dont l'organe de la vue, extrêmement délicat, ne s'ouvre que très-peu lorsqu'ils sont exposés à

des rayons lumineux très-nombreux ou très-vifs *.

Le canal auditif, cartilagineux, tortueux et mince, se termine à l'extérieur par un orifice des plus étroits.

Le *rocher*, suspendu par des ligamens, comme dans les autres cétacées, au-dessous d'une voûte formée en grande partie par une extension de l'os occipital, contient un tympan dont la forme est celle d'un entonnoir alongé; un marteau dénué de manche, mais garni d'une apophyse antérieure, longue et arquée; un étrier qui, au lieu de deux branches, présente un cône solide, comprimé et percé d'un très-petit trou; un labyrinthe situé au-dessus de la caisse du tympan; une lame contournée en spirale pour former le *limaçon*, et qu'une fente très-étroite et garnie d'une membrane sépare, dans toute sa longueur, en deux parties dont la plus voisine de l'axe est trois fois plus large que l'autre; un petit canal, dont la

* Consultez ce que nous avons écrit au sujet de la vue de la baleine franche dans l'article de ce cétacée.

DES DAUPHINS
est ronde, dont les parois
qui suit la courbure sp
seuse attacher à l'axe du
gmente de diamètre à m
des lames diminue, et a
un canal analogue dans
et enfin, l'origine de d
noms, nommés improprie
et qui, de même que d
ables que l'on voit dan
amifères, font communiqu
nthe de l'oreille avec l'in
me, indépendamment des co
cels passent les nerfs.
Lorsqu'on a jeté les yeux
ails de l'oreille du dauphin
être surpris de la finesse de
omme les animaux doivent
aimer à exercer leurs sen
sions en sont plus propres à
pressions vives ou multiples
doit se plaire et se plaire
tre différens corps sonore
des instrumens de mus
Leçons d'anatomie comparée
tome II, p. 476.

coupe est ronde, dont les parois sont très-minces, qui suit la courbure spirale de la lame osseuse attachée à l'axe du limaçon, qui augmente de diamètre à mesure que celui des lames diminue, et auquel on trouve un canal analogue dans les ruminans *, et enfin, l'origine de deux larges conduits, nommés improprement *aqueducs*, et qui, de même que des canaux semblables que l'on voit dans tous les mammifères, font communiquer le labyrinthe de l'oreille avec l'intérieur du crâne, indépendamment des conduits par lesquels passent les nerfs.

Lorsqu'on a jeté les yeux sur tous les détails de l'oreille du dauphin, pourroit-on être surpris de la finesse de son ouïe ? et comme les animaux doivent d'autant plus aimer à exercer leurs sens, que les organes en sont plus propres à donner des impressions vives ou multipliées, le dauphin doit se plaire et se plaît en effet à entendre différens corps sonores. Les tons variés des instrumens de musique ne sont

* *Leçons d'anatomie comparée du citoyen Cuvier, tome II, p. 476.*

pas même les seuls qui attirent son attention ; on diroit qu'il éprouve aussi quelque plaisir à écouter les sons régulièrement périodiques , quoique monotones et quelquefois même très-désagréables à l'oreille délicate d'un musicien habile , que produit le jeu des pompes et d'autres machines hydrauliques. Un bruit violent et soudain l'effraie cependant. Aristote nous apprend que de son temps les pêcheurs de dauphins entouroient dans leurs barques une troupe de ces cétacées , et produisoient tout d'un coup un grand bruit , qui , rendu plus insupportable pour l'oreille de ces animaux par l'intermédiaire de l'eau salée qui le transmettoit et qui étoit bien plus dense que l'air , leur inspiroit une frayeur si forte , qu'ils se précipitoient vers le rivage et s'échouoient sur la grève , victimes de leur surprise , de leur étourdissement et de leur terreur imprévue et subite.

Cette organisation de l'oreille des dauphins fait aussi qu'ils entendent de loin les sons que peuvent proférer les individus de leur espèce. A la vérité , on a comparé

DES DAUPHINS
croix à une sorte de gl
mais ce mugissement
reflexions qu'il reçoit de
océan et de la surface m
se propage facilement , co
more. par cette immense
vaquens , et doit , ainsi q
observe une nouvelle m
rique , dont au moins la
seurs se transmettent à l'
le dauphin.

D'ailleurs les poumons , d'o
le producteur des sons qu
fait entendre , offrent un

boîte osseuse dans laquell
re les évents , l'orbite de
re plus reculée et un peu
re orbite , au milieu de l
re orbite suspendue , et
vement à la longueur de
rène est très-convexe

les différentes parties de l'ap
articule avec cette bel
valent des dimensions tel
rement dit n'en forme

leur voix à une sorte de gémissement sourd : mais ce mugissement se fortifie par les réflexions qu'il reçoit des rivages de l'océan et de la surface même de la mer, se propage facilement, comme tout effet sonore, par cette immense masse de fluide aquenx, et doit, ainsi qu'Aristote l'avoit observé, une nouvelle intensité à ce même liquide, dont au moins les couches supérieures le transmettent à l'organe de l'ouïe du dauphin.

D'ailleurs les poumons, d'où sort le fluide producteur des sons que le dauphin fait entendre, offrent un grand volume.

La boîte osseuse dans laquelle sont renfermés les événements, l'orbite de l'œil et la cavité plus reculée et un peu plus élevée que cette orbite, au milieu de laquelle on trouve l'oreille suspendue, est très-petite relativement à la longueur du dauphin. Le crâne est très-convexe.

Les différentes parties de l'épine dorsale qui s'articule avec cette boîte osseuse, présentent des dimensions telles, que le dos proprement dit n'en forme que le cin-

quième ou à peu près, et que le cou n'en compose pas le trentième.

Ce cou est donc extrêmement court. Il comprend cependant sept vertèbres, comme celui des autres mammifères; mais de ces sept vertèbres, la seconde ou l'*axis* est très-mince, et très-souvent les cinq dernières n'ont pas un millimètre d'épaisseur.

Une si grande brièveté dans le cou expliqueroit seule pourquoi le dauphin ne peut pas imprimer à sa tête des mouvemens bien sensibles, indépendans de ceux du corps; et ce qui ajoute à cette immobilité relative de la tête, c'est que la seconde vertèbre du cou est soudée avec la première ou l'*atlas*.

Les vertèbres dorsales proprement dites sont au nombre de treize, comme dans plusieurs autres mammifères, et notamment dans le lion, le tigre, le chat, le chien, le renard, l'ours maritime, un grand nombre de rongeurs, le cerf, l'antilope, la chèvre, la brebis et le bœuf.

Les autres vertèbres, qui représentent les lombaires, les sacrées et les coccy-

DES DAUPHINS
 ou vertèbres de la queue
 cinairement au nombre de
 le professeur Bonnaterre
 soixante-trois dans
 dauphin qui faisait partie
 d'Alfort. Aucun mammifère
 à la grande tribu des cétacés
 présente un aussi grand nombre
 de vertèbres dans lesquels on a
 plus de ces vertèbres lombaires
 caudales, sont le grand fou
 néanmoins n'en a que quarante
 chatagiu, qui n'en a que cinquante
 c'est un grand rapport que
 les cétacés avec les poissons
 partagent le séjour et la man
 nœuvre.
 Les apophyses supérieures
 dorsales sont d'autant plus br
 at plus éloignées du cou; c
 vertèbres lombaires, sacrées
 au contraire, d'autant
 on les trouve plus près de
 chaque, dont les trois de
 sont entièrement des
 apophyses supérieures: mais

giennes ou vertèbres de la queue, sont ordinairement au nombre de cinquante-trois : le professeur Bonnaterre en a compté cependant soixante-trois dans un squelette de dauphin qui faisoit partie de la collection d'Alfort. Aucun mammifère étranger à la grande tribu des cétacées n'en présente un aussi grand nombre : les quadrupèdes dans lesquels on a reconnu le plus de ces vertèbres lombaires, sacrées et caudales, sont le grand fourmilier, qui néanmoins n'en a que quarante-six, et le phatagin, qui n'en a que cinquante-deux ; et c'est un grand rapport que présentent les cétacées avec les poissons, dont ils partagent le séjour et la manière de se mouvoir.

Les apophyses supérieures des vertèbres dorsales sont d'autant plus hautes, qu'elles sont plus éloignées du cou ; et celles des vertèbres lombaires, sacrées et caudales, sont, au contraire, d'autant plus basses, qu'on les trouve plus près de l'extrémité de la queue, dont les trois dernières vertèbres sont entièrement dénuées de ces apophyses supérieures : mais les apophyses

des vertèbres qui représentent les lombaires, sont les plus élevées, parce qu'elles servent de point d'appui à d'énormes muscles qui s'y attachent, et qui donnent le mouvement à la queue.

Remarquons encore que les douze vertèbres caudales qui précèdent les trois dernières, ont non seulement des apophyses supérieures, mais des apophyses inférieures, auxquelles s'attachent plusieurs des muscles qui meuvent la nageoire de la queue, et lesquelles ajoutent par conséquent à la force et à la rapidité des mouvemens de cette rame puissante.

Les vertèbres dorsales soutiennent les côtes, dont le nombre est égal de chaque côté à celui de ces vertèbres, et par conséquent de treize.

Le sternum, auquel aboutissent les côtes *sterno-vertébrales*, improprement appelées *vraies côtes*, est composé de plusieurs pièces articulées ensemble, et se réunit avec les extrémités des côtes par le moyen de petits os particuliers, très-bien observés par le professeur Bonnaterre.

A une distance assez grande du sternum,

DES DAUPHINS
 chaque côte de l'anus, on
 les chairs un os peu étendu
 se, qui, avec son anneau
 tels os du bassin qui ont le
 care. C'est un faible trait de
 les mammifères qui ne sont
 , comme les cétacés, d'
 érieures; et ces deux peti
 res ont quelque rapport
 tion, avec ces petits os
 sons, et qui soutiennent, a
 l'anus, les nageoires inféri
 eurs abdominaux.
 près de ce même sternum,
 diaphragme.
 le muscle, qui sépare la po
 ste, n'étant pas tout-à-fait
 un peu incliné en arrière
 position la cavité de la po
 de la colonne vertébrale
 de place aux poumons vo
 nous avons parlé. Organ
 être très-fort, et étendu
 de l'abdomen aux pectoraux
 de force, parce que les
 fibres sont tendueuses,

et de chaque côté de l'anus, on découvre dans les chairs un os peu étendu, plat et mince, qui, avec son analogue, forme les seuls os du bassin qu'ait le dauphin vulgaire. C'est un foible trait de parenté avec les mammifères qui ne sont pas dénués, comme les cétacées, d'extrémités postérieures; et ces deux petites lames osseuses ont quelque rapport, par leur insertion, avec ces petits os nommés *ailerons*, et qui soutiennent, au-devant de l'anus, les nageoires inférieures des poissons abdominaux.

Auprès de ce même sternum, on trouve le *diaphragme*.

Ce muscle, qui sépare la poitrine du ventre, n'étant pas tout-à-fait vertical, mais un peu incliné en arrière, agrandit par sa position la cavité de la poitrine, du côté de la colonne vertébrale, et laisse plus de place aux poumons volumineux dont nous avons parlé. Organisé de manière à être très-fort, et étant attaché aux muscles abdominaux, qui ont aussi beaucoup de force, parce que plusieurs de leurs fibres sont tendineuses, il facilite

les mouvemens par lesquels le dauphin inspire l'air de l'atmosphère, et l'aide à vaincre la résistance qu'oppose à la dilatation de la poitrine et des poumons l'eau de la mer, bien plus dense que le fluide atmosphérique dans lequel sont uniquement plongés la plupart des mammifères.

Au-delà du diaphragme est un foie volumineux, comme dans presque tous les habitans des eaux.

Les reins sont composés, comme ceux de presque tous les cétacées, d'un très-grand nombre de petites glandes de diverse figure, que Rondelet a comparées aux grains de raisin qui composent une grappe.

La chair est dure, et le plus souvent exhale une odeur désagréable et forte. La graisse qui la recouvre contribue à donner de la mollesse à la peau, qui cependant est épaisse, mais dont la surface est luisante et très-unie.

La pectorale de chaque côté est ovale, placée très-bas, et séparée de l'œil par un espace à peu près égal à celui qui est entre l'organe de la vue et le bout du museau.

DES DAUPHINS
 Les os de cette nageoire
 ou dire, de ce bras, s'articu-
 lation dont le bord s-
 et fort grand. L'épine
 longitudinale de cet os de
 minée, au-dessous de l'ang-
 une lame saillante, qui s-
 d'acromion.
 Le muscle releveur de cette
 attache à l'apophyse trans-
 première vertèbre, et s'épan-
 don sur toute la surface e-
 même omoplate. Celui
 a grand dentelé ou scapula-
 andrupèdes, et dont l'action
 ou à maintenir l'épaule
 ée par des *digitations* aux
 ou, comme dans les animaux
 ent de leurs bras pour man-
 le dauphin manque, de m-
 mivores et plusieurs autres
 muscle nommé *pectoral*
 antérieur, ou *pectoral*
 ente à la place d'un muscle
 action, s'insère sur le stern-
 ramité antérieure de ce pla-

Les os de cette nageoire , ou , pour mieux dire , de ce bras , s'articulent avec une omoplate dont le bord spinal est arrondi et fort grand. L'épine ou éminence longitudinale de cet os de l'épaule est continuée , au-dessus de l'angle huméral , par une lame saillante , qui semble tenir lieu d'*acromion*.

Le muscle releveur de cette omoplate s'attache à l'apophyse transverse de la première vertèbre , et s'épanouit par son tendon sur toute la surface extérieure de cette même omoplate. Celui qui répond au *grand dentelé* ou *scapulo-costien* des quadrupèdes , et dont l'action tend à mouvoir ou à maintenir l'épaule , n'est pas fixé par des *digitations* aux vertèbres du cou , comme dans les animaux qui se servent de leurs bras pour marcher.

Le dauphin manque , de même que les carnivores et plusieurs animaux à sabots , du muscle nommé *petit pectoral* , ou *dentelé antérieur* , ou *costocoracoïdien* ; mais il présente à la place un muscle qui , par une *digitation* , s'insère sur le sternum , vers l'extrémité antérieure de ce plastron osseux.

Le muscle *trapèze*, ou *cuculaire*, ou *dorso-susacromien*, qui s'attache à l'arcade occipitale, ainsi qu'à l'apophyse supérieure de toutes les vertèbres du cou et du dos, couvre toute l'omoplate, mais est très-mince, pendant que le *sterno-mastoïdien* est très-épais, très-gros, et accompagné d'un second muscle, qui, de l'apophyse mastoïde, va s'insérer sous la tête de l'humérus.

En tout, les muscles paroissent conformés, proportionnés et attachés de manière à donner à l'épaule de la solidité, ainsi que cela convient à un animal nageur. Par cette organisation, les bras, ou nageoires, ou rames latérales du dauphin, ont un point d'appui plus fixe, et agissent sur l'eau avec plus d'avantage.

Mais si, parmi les muscles qui meuvent l'*humérus*, ou le bras proprement dit, le *grand dorsal* ou *lombo-humérien* des quadrupèdes est remplacé, dans le dauphin, par un petit muscle qui s'attache aux côtes par des digitations, et qui est recouvert par la portion dorsale de celui qu'on appelle *pannicule charnu* ou *cutano-humé-*

DES DAUPHINS
 Les muscles sur-épi- (scapulo-
 scapulaire), le sous-épi- (scapulo-
 axillaire), le grand (scapulo-
 huméral), et le petit (scapulo-
 huméral) et comme obliques.
 D'ailleurs, cet humérus, les
 bras qui sont très-comp
 carpe dont l'aplatissement
 mod, les os du métacarpe tr
 soudés ensemble, les deux
 aplatis du ponce et du de
 huit phalanges semblables
 agt, les six du troisième et
 quatrième, paroissent unis d
 former qu'un seul tout, don
 presque immobiles les un
 ant aux autres.
 Cependant les muscles qui
 en mouvement, ont une
 tension et une position t
 croire qu'il compose peut
 rapidité, et par conséque
 Mais l'espèce d'indextibilité
 se, en la rendant un très-b
 ration, n'y laisse qu'un
 parfait.

rien, les muscles *sur-épineux* (sur-scapulo-trochitérien), le *sous-épineux* (sous-scapulo-trochitérien), le *grand-rond* (scapulo-humérien), et le *petit-rond*, sont peu distincts et comme oblitérés.

D'ailleurs, cet humérus, les deux os de l'avant-bras qui sont très-comprimés, ceux du carpe dont l'aplatissement est très-grand, les os du métacarpe très-déprimés et soudés ensemble, les deux phalanges très-aplaties du pouce et du dernier doigt, les huit phalanges semblables du second doigt, les six du troisième et les trois du quatrième, paroissent unis de manière à ne former qu'un seul tout, dont les parties sont presque immobiles les unes relativement aux autres.

Cependant les muscles qui mettent ce tout en mouvement, ont une forme, des dimensions et une position telles, que la nageoire qu'il compose peut frapper l'eau avec rapidité, et par conséquent avec force.

Mais l'espèce d'inflexibilité de la pectorale, en la rendant un très-bon organe de natation, n'y laisse qu'un toucher bien imparfait.

Le dauphin n'a aucun organe qu'il puisse appliquer aux objets extérieurs, de manière à les embrasser, les palper, les peser, sentir leur poids, leur dureté, les inégalités de leur surface, recevoir enfin des impressions très-distinctes de leur figure et de leurs diverses qualités.

Il peut cependant, dans certaines circonstances, éprouver une partie de ces sensations, en plaçant l'objet qu'il veut toucher entre son corps et la pectorale, en le soutenant sous son bras. D'ailleurs, toute sa surface est couverte d'une peau épaisse, à la vérité, mais molle, et qui, cédant aux impressions des objets, peut transmettre ces impressions aux organes intérieurs de l'animal. Sa queue très-flexible peut s'appliquer à une grande partie de la surface de plusieurs de ces objets. On pourroit donc supposer dans le dauphin un toucher assez étendu pour qu'on ne fût pas forcé, par la considération de ce sens, à refuser à ce cétacée l'intelligence que plusieurs auteurs anciens et modernes lui ont attribuée.

D'ailleurs, le rapport du poids du cer-

DES DAUPHINS
 au à celui du corps est de
 quelques dauphins, comme de
 ridus de l'espèce humaine
 les grenous, dans quelque
 rant que dans le castor il
 is de 1 à 290 et, dans l'éléph
 10 !

De plus, les célèbres ana-
 physiologistes, M. Sæmmerin
 et fait voir qu'en général,
 ailleurs, plus le diamètre
 mesuré dans sa plus grande la-
 rgeur sur celui de la moelle
 arée à sa base, et plus on d
 la prééminence dans l'organ
 non sur celui des sens extéri
 qui est la même chose, attri-
 bul une intelligence relevée
 tière du cerveau est à celui
 allongée dans l'homme, com-
 é, dans la guenon humaine
 es, comme 182 est à 43 ; d
 comme 182 est à 69, et dans
 comme 152 est à 143.

Leçons d'anatomie comparée de
 Ibid.

veau à celui du corps est de 1 à 25 dans quelques dauphins, comme dans plusieurs individus de l'espèce humaine, dans quelques guenons, dans quelques sapajous, pendant que dans le castor il est quelquefois de 1 à 290 et, dans l'éléphant, de 1 à 500 ¹.

De plus, les célèbres anatomistes et physiologistes, M. Sæmmering et M. Ébel, ont fait voir qu'en général, et tout égal d'ailleurs, plus le diamètre du cerveau, mesuré dans sa plus grande largeur, l'emporte sur celui de la moelle allongée, mesurée à sa base, et plus on doit supposer de prééminence dans l'organe de la réflexion sur celui des sens extérieurs, ou, ce qui est la même chose, attribuer à l'animal une intelligence relevée. Or le diamètre du cerveau est à celui de la moelle allongée dans l'homme, comme 182 est à 26; dans la guenon nommée *bonnet chinois*, comme 182 est à 43; dans le chien, comme 182 est à 69, et dans le dauphin, comme 182 est à 14 ².

¹ *Leçons d'anatomie comparée du citoyen Cuvier.*

² *Ibid.*

Ajoutons que le cerveau du dauphin présente des circonvolutions nombreuses, et presque aussi profondes que celles du cerveau de l'homme¹; et pour achever de donner une idée suffisante de cet organe, disons qu'il a des hémisphères fort épais; qu'il couvre le cervelet; qu'il est arrondi de tous les côtés, et presque deux fois plus large que long; que les éminences ou tubercules nommés *testes* sont trois fois plus volumineux que ceux auxquels on a donné le nom de *nates*, et que l'on voit presque toujours plus petits que les *testes* dans les animaux qui vivent de proie²; et enfin qu'il ressemble au cerveau de l'homme, plus que celui de la plupart des quadrupèdes.

Mais les dimensions et la forme du cerveau du dauphin ne doivent pas seulement rendre plus vraisemblables quelques-unes des conjectures que l'on a formées au sujet de l'intelligence de ce cétacée; elles paroissent prouver aussi une partie de celles auxquelles on s'est livré sur la

¹ *Leçons d'anatomie comparée du citoyen Cuvier.*
² *Ibid.*

DES DAUPHINS
 l'existence de cet animal. On a
 été, confirmer ces idées
 par la force de l'odorat du
 mammifères les plus sen-
 sibles: le chien, pour
 en effet d'un odorat des p-
 arer: et malgré la nature
 particulière du siège de
 les cétacées¹, on s'est d-
 ristote que le dauphin c-
 mplement et de très-loin l-
 des corps odorans². Sa ch-
 odeur assez sensible, com-
 crocodile, de plusieurs autr-
 des oripares, et de plusieurs
 des eaux ou des rivages,
 est très-fin; et cependant te-
 forte ou étrangère à celles
 être accoutumée, agit s-
 se neris, qu'il en est l-
 ment et même quelque fois
 commodé: et Plin rapporte
 d'Afrique ayant essai-
 mer un dauphin qui ven-
 de la même espèce.
 Hist. anim. IV, c.

sensibilité de cet animal. On peut, d'un autre côté, confirmer ces mêmes conjectures par la force de l'odorat du dauphin. Les mammifères les plus sensibles, et particulièrement le chien, jouissent toujours en effet d'un odorat des plus faciles à ébranler; et malgré la nature et la position particulière du siège de l'odorat dans les cétacées¹, on savoit dès le temps d'Aristote que le dauphin distinguoit promptement et de très-loin les impressions des corps odorans². Sa chair répand une odeur assez sensible, comme celle du crocodile, de plusieurs autres quadrupèdes ovipares, et de plusieurs autres habitans des eaux ou des rivages, dont l'odorat est très-fin; et cependant toute odeur trop forte ou étrangère à celles auxquelles il peut être accoutumé, agit si vivement sur ses nerfs, qu'il en est bientôt fatigué, tourmenté et même quelquefois fortement incommodé; et Pline rapporte qu'un proconsul d'Afrique ayant essayé de faire parfumer un dauphin qui venoit souvent

¹ Article de la baleine franche.

² Aristot. *Hist. anim.* IV, 8.

près du rivage et s'approchoit familièrement des marins, ce cétacée fut pendant quelque temps comme assoupi et privé de ses sens, s'éloigna promptement ensuite, et ne reparut qu'au bout de plusieurs jours *.

Faisons encore observer que la sensibilité d'un animal s'accroît par le nombre des sensations qu'il reçoit, et que ce nombre est, tout égal d'ailleurs, d'autant plus grand que l'animal change plus souvent de place, et reçoit par conséquent les impressions d'un nombre plus considérable d'objets étrangers. Or le dauphin nage très-fréquemment et avec beaucoup de rapidité.

L'instrument qui lui donne cette grande vitesse, se compose de sa queue et de la nageoire qui la termine. Cette nageoire est divisée en deux lobes, dont chacun n'est que peu échancré, et dont la longueur est telle, que la largeur de cette caudale égale ordinairement deux neuvièmes de la longueur totale du cétacée.

* Pline, *Histoire du monde*, liv. IX, chap. 8.

DES DAUPHINS
nageoire et la queue
ont été mues avec d'autant
que les muscles pouvaient
leurs mouvements
à de hautes apophyses
ombraies; et l'on avoit un
leur force prodigieuse, qu
delet, un proverbe comp
se tourmentent pour faire
possible, à ceux qui veul
de par la queue.
est en agitant cette rame r
dauphin cingle avec tant de co
marins l'ont nommé la
Mon savant et éloquent c
de Saint-Pierre, memb
catalan, ci, dans la r
à l'île de France (p. 32)
dauphin caracolier autour
est que le bâtiment lui
cette par heure; et Plin
dauphin a été plus vite q
un trait lancé par u
sante.
adonale de ce cétacée n
esse; mais elle peut l'a

Cette nageoire et la queue elle-même peuvent être mues avec d'autant plus de vigueur, que les muscles puissans qui leur impriment leurs mouvemens variés, s'attachent à de hautes apophyses des vertèbres lombaires ; et l'on avoit une si grande idée de leur force prodigieuse, que, suivant Rondelet, un proverbe comparoit ceux qui se tourmentent pour faire une chose impossible, à ceux qui *veulent lier un dauphin par la queue*.

C'est en agitant cette rame rapide que le dauphin cingle avec tant de célérité, que les marins l'ont nommé *la flèche de la mer*. Mon savant et éloquent confrère, le citoyen de Saint-Pierre, membre de l'Institut national, dit, dans la relation de son voyage à l'île de France (p. 52), qu'il vit un dauphin caracoler autour du vaisseau, pendant que le bâtiment faisoit un myriamètre par heure ; et Pline a écrit que le dauphin alloit plus vite qu'un oiseau et qu'un trait lancé par une machine puissante.

La dorsale de ce cétacée n'ajoute pas à sa vitesse ; mais elle peut l'aider à diriger

ses mouvemens ¹. La hauteur de cette nageoire, mesurée le long de sa courbure, est communément d'un sixième de la longueur totale du dauphin, et sa longueur d'un neuvième. Elle présente une échancrure à son bord postérieur, et une inflexion en arrière à son sommet.

Elle est située au-dessus des seize vertèbres qui viennent immédiatement après les vertèbres dorsales; et l'on trouve dans sa base une rangée longitudinale de petits os alongés, plus gros par le bas que par le haut, un peu courbés en arrière, cachés dans les muscles, et dont chacun, répondant à une vertèbre sans y être attaché, représente un de ces *osselets* ou ailerons auxquels nous avons vu que tenoient les rayons des nageoires des poissons ².

Mais il ne suffit pas de faire observer la célérité de la natation du dauphin, remarquons encore la fréquence de ses

¹ Que l'on veuille bien rappeler ce que nous avons dit dans l'article de la *baleine franche*, au sujet de la natation de ce cétacée.

² *Histoire naturelle des poissons.* — Discours sur la nature de ces animaux.

DES DAUPHINS
ous. Elles sont séparées
si courts, qu'on peu
est absolument in
différentes impulsions qu'il
accèdent avec tant de rapid
ont une si grande accélé
rement, que, d'après Arist
delet, et d'autres auteurs,
quelques fois assez haut au-de
face de la mer pour sauter
mâts des petits bâtimens. Ar
me de la manière dont il
renforce leur corps, bandent
leur queue comme un arc
puisant, et, la détend
entre les couches d'eau infér
romptitude de l'éclair. Je
quelque sorte comme la flèche
nous présentent un emploi
des effets semblables à ceux
offerts les saumons et d'aut
franchissent, en remuant
des dignes très élev
et par un mécanisme ve
Histoire naturelle des poisson
saumon.
de la II.

évolutions. Elles sont séparées par des intervalles si courts, qu'on penseroit que le repos lui est absolument inconnu; et les différentes impulsions qu'il se donne, se succèdent avec tant de rapidité et produisent une si grande accélération de mouvement, que, d'après Aristote, Plin, Rondelet, et d'autres auteurs, il s'élance quelquefois assez haut au-dessus de la surface de la mer pour sauter par-dessus les mâts des petits bâtimens. Aristote parle même de la manière dont ils courbent avec force leur corps, bandent, pour ainsi dire, leur queue comme un arc très-grand et très-puissant, et, la détendant ensuite contre les couches d'eau inférieures avec la promptitude de l'éclair, jaillissent en quelque sorte comme la flèche de cet arc, et nous présentent un emploi de moyens et des effets semblables à ceux que nous ont offerts les saumons et d'autres poissons qui franchissent, en remontant dans les fleuves, des digues très-élevées *.

C'est par un mécanisme semblable que

* *Histoire naturelle des poissons.* — Histoire du salmone saumon.

le dauphin se précipite sur le rivage, lorsque, poursuivant une proie qui lui échappe, il se livre à des élans trop impétueux qui l'emportent au-delà du but, ou lorsque, tourmenté par des insectes * qui pénètrent dans les replis de sa peau et s'y attachent aux endroits les plus sensibles, il devient furieux, comme le lion sur lequel s'acharne la mouche du désert, et, aveuglé par sa propre rage, se tourne, se retourne, bondit et se précipite au hasard.

Lorsqu'il s'est jeté sur le rivage à une trop grande distance de l'eau pour que ses efforts puissent l'y ramener, il meurt au bout d'un temps plus ou moins long, comme les autres cétacées repoussés de la mer, et lancés sur la côte par la tempête ou par toute autre puissance. L'impossibilité de pourvoir à leur nourriture, les contusions et les blessures produites par la force du choc qu'ils éprouvent en tombant violemment sur le rivage, un dessèchement subit dans plusieurs de leurs organes, et plusieurs autres causes, con-

* Rondelet, article du *dauphin*.

DES DAUPHINS
 ent alors à terminer leur vie
 but pas croire, avec les anc
 es, que l'altération de leur
 orifice se dessèche, se r
 leur donne seule la m
 peuvent, lorsqu'ils se
 respirer très-librement
 de leur gueule.
 le dauphin est d'autant
 bonds et dans ses circ
 son plus grand diamètre
 qu'il est ou à peu près de
 ale, et n'en est très-sou
 même pendant la jeunesse
 la reste, cette longueur tot
 x trois mètres et un tiers.
 Vers le milieu de cette long
 ombilic et l'anus, est pla
 amale, qui est aplatie, et d
 croit ordinairement à l'ext
 extrémité du gland. Il par
 il s'accouple avec sa fem
 ent dans une position p
 ne de la verticale, et
 autre.
 La durée de la gestation es

courent alors à terminer leur vie : mais il ne faut pas croire, avec les anciens naturalistes, que l'altération de leurs événements, dont l'orifice se dessèche, se resserre et se ferme, leur donne seule la mort, puisqu'ils peuvent, lorsqu'ils sont hors de l'eau, respirer très-librement par l'ouverture de leur gueule.

Le dauphin est d'autant moins gêné dans ses bonds et dans ses circonvolutions, que son plus grand diamètre n'est que le cinquième ou à peu près de sa longueur totale, et n'en est très-souvent que le sixième pendant la jeunesse de l'animal.

Au reste, cette longueur totale n'excède guère trois mètres et un tiers.

Vers le milieu de cette longueur, entre le nombril et l'anus, est placée la verge du mâle, qui est aplatie, et dont on n'aperçoit ordinairement à l'extérieur que l'extrémité du gland. Il paroît que lorsqu'il s'accouple avec sa femelle, ils se tiennent dans une position plus ou moins voisine de la verticale, et tournés l'un vers l'autre.

La durée de la gestation est de dix mois,

suivant Aristote : le plus souvent la femelle met bas pendant l'été ; ce qui prouve que l'accouplement a lieu au commencement de l'automne, lorsque les dauphins ont reçu toute l'influence de la saison vivifiante.

La femelle ne donne le jour qu'à un ou deux petits ; elle les allaite avec soin, les porte sous ses bras pendant qu'ils sont encore languissans ou foibles, les exerce à nager, joue avec eux, les défend avec courage, ne s'en sépare pas même lorsqu'ils n'ont plus besoin de son secours, se plaît à leur côté, les accompagne par affection, et les suit avec constance, quoique déjà leur développement soit très-avancé.

Leur croissance est prompte : à dix ans, ils ont souvent atteint à toute leur longueur. Il ne faut pas croire cependant que trente ans soient le terme de leur vie, comme plusieurs auteurs l'ont répété d'après Aristote. Si l'on rappelle ce que nous avons dit de la longueur de la vie de la baleine franche, on pensera facilement avec d'autres auteurs que le dauphin doit vivre

DES DAUPHINS
long-temps, et vraisem-
blablement d'un siècle.
Mais ce n'est pas seulement
les dauphins auxquels elle
s'applique, qui paroissent réunis par
une affection mutuelle et
qui passe, dit-on, la plus grande
vie auprès de sa femelle
rien constant et le dévouement
la même toujours présente
dauphins en général étoient
un sentiment assez vif auprès
compagnons. On raconte, qu'un
dauphin ayant été pris
dans la Carie, un grand
nombre de la même espèce s'as-
semblèrent, et ne regagnèrent le
port, et ne regagnèrent le
port lorsqu'on eut délivré le
dauphin ravi.
Lorsque les dauphins nagent
en nombre, ils présentent
une ordonnance : ils forment des
colonnes ; ils s'avancent quelque-
fois, comme disposés en ordre
et si quelqu'un d'eux s'écarteroit
de sa place par sa force ou par sa

très-long-temps, et vraisemblablement plus d'un siècle.

Mais ce n'est pas seulement la mère et les dauphins auxquels elle a donné le jour, qui paroissent réunis par les liens d'une affection mutuelle et durable : le mâle passe, dit-on, la plus grande partie de sa vie auprès de sa femelle ; il en est le gardien constant et le défenseur fidèle. On a même toujours pensé que tous les dauphins en général étoient retenus par un sentiment assez vif auprès de leurs compagnons. On raconte, dit Aristote, qu'un dauphin ayant été pris sur un rivage de la Carie, un grand nombre de cétacées de la même espèce s'approchèrent du port, et ne regagnèrent la pleine mer que lorsqu'on eut délivré le captif qu'on leur avoit ravi.

Lorsque les dauphins nagent en troupe nombreuse, ils présentent souvent une sorte d'ordre : ils forment des rangs réguliers ; ils s'avancent quelquefois sur une ligne, comme disposés en ordre de bataille ; et si quelqu'un d'eux l'emporte sur les autres par sa force ou par son audace, il

précède ses compagnons, parce qu'il nage avec moins de précaution et plus de vitesse; il paroît comme leur chef ou leur conducteur, et fréquemment il en reçoit le nom des pêcheurs ou des autres marins.

Mais les animaux de leur espèce ne sont pas les seuls êtres sensibles pour lesquels ils paroissent concevoir de l'affection; ils se familiarisent du moins avec l'homme. Pline a écrit qu'en Barbarie, auprès de la ville de *Hippo Dyarrhite*, un dauphin s'avançoit sans crainte vers le rivage, venoit recevoir sa nourriture de la main de celui qui vouloit la lui donner, s'approchoit de ceux qui se baignoient, se livroit autour d'eux à divers mouvemens d'une gaieté très-vive, souffroit qu'ils montassent sur son dos, se laissoit même diriger avec docilité, et obéissoit avec autant de célérité que de précision *. Quelque exagération qu'il y ait dans ces faits, et quand même on ne devroit supposer, dans le penchant qui entraîne souvent les dauphins autour des vaisseaux, que le désir d'appaiser avec plus de facilité une faim

* Pline, liv. IX, chap. 48.

DES DAUPHINS
quelquefois très-pressante, on
carqu'ils ne se rassemblent
mens, et qu'avec tous les
ance et d'une sorte de
se agitent, se courbent,
scent au-dessus de l'eau,
mbent, bondissent et s'
teau pour pirouetter, tou
et s'élever encore. Cette su
not cette perpétuité de
nt de la bonne proportio
acles et de l'activité de le
eux.

Je pardons jamais de vue
rité. Lorsque les animaux
retenus, comme l'homme
les morales, ne sont pas
crainte, ils font tout ce qu
et ils agissent ainsi
ils peuvent agir. Aucun
te dans la Nature. Toute
adent sans cesse à produir
s'étendue tous les états qu
se naître. Cette sorte d'
se confond avec l'attra
est la base du princip

quelquefois très-pressante, on ne peut pas douter qu'ils ne se rassemblent autour des bâtimens, et qu'avec tous les signes de la confiance et d'une sorte de satisfaction, ils ne s'agitent, se courbent, se replient, s'élancent au-dessus de l'eau, pirouettent, retombent, bondissent et s'élancent de nouveau pour pirouetter, tomber, bondir et s'élever encore. Cette succession ou plutôt cette perpétuité de mouvemens vient de la bonne proportion de leurs muscles et de l'activité de leur système nerveux.

Ne perdons jamais de vue une grande vérité. Lorsque les animaux, qui ne sont pas retenus, comme l'homme, par des idées morales, ne sont pas arrêtés par la crainte, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, et ils agissent aussi long-temps qu'ils peuvent agir. Aucune force n'est inerte dans la Nature. Toutes les causes y tendent sans cesse à produire dans toute leur étendue tous les effets qu'elles peuvent faire naître. Cette sorte d'effort perpétuel, qui se confond avec l'attraction universelle, est la base du principe suivant. Un

E NATURELLE
ignons, parce qu'il nage
précaution et plus de vi-
omme leur chef ou leur
équemment il en reçoit
erson des autres marins
ux de leur espèce ne sont
s sensibles pour lesquels
cevoir de l'affection; ils
du moins avec l'homme
n Barbarie, auprès de la
Dyarrhite, un dauphin
crainte vers le rivage, ve-
nourriture de la main de
la lui donner, s'appro-
se baignoient, se livroit
ivers mouvemens d'une
souffroit qu'ils montas-
se laissoit même diriger
obéissoit avec autant de
écision *. Quelque exa-
t dans ces faits, et quand
roit supposer, dans le
raîne souvent les dau-
vaisseaux, que le désir
us de facilité une faim
chap. 48.

effet est toujours le plus grand qui puisse dépendre de sa cause, ou, ce qui est la même chose, la cause d'un phénomène est toujours la plus foible possible; et cette expression n'est que la traduction de celle par laquelle notre illustre collègue et ami Lagrange a fait connoître son admirable principe de la plus petite action.

Au reste, ces mouvemens si souvent renouvelés que présentent les dauphins, ces bonds, ces sauts, ces circonvolutions, ces manœuvres, ces signes de force, de légèreté et de l'adresse que la répétition des mêmes actes donne nécessairement, forment une sorte de spectacle d'autant plus agréable pour des navigateurs fatigués depuis long-temps de l'immense solitude et de la triste uniformité des mers, que la couleur des dauphins vulgaires est agréable à la vue. Cette couleur est ordinairement bleuâtre ou noirâtre, tant que l'animal est en vie et dans l'eau; mais elle est souvent relevée par la blancheur du ventre et celle de la poitrine.

Achevons cependant de montrer toutes les nuances que l'on a cru remarquer dans

DES DAUPHINS
 actions de ces animaux
 prétendu que la famille
 étoit plus grande avec
 l'homme avancé en âge
 et Flavius Albus ont
 chroniques, suivant Pl
 phin qui avoit pénétré
 recevoit tous les jours
 lui donnoit un jeune en
 roit à sa voix, qu'il le
 dos, et que l'enfant ayant
 phin, qui ne revit plus son
 avoit bientôt de chagrin. La
 main ajoute des faits sem
 sous Alexandre de Mac
 montés par Égésidème et
 mète. Les anciens enfin n
 se à supposer dans les da
 seunes gens, avec lesquels i
 se plus facilement qu'avec
 s, une sensibilité, une
 constance presque sembla
 ble chien nous donne des
 mœurs.
 les cétacées, que l'on a
 et comme susceptibles d

les affections de ces animaux. Les anciens ont prétendu que la familiarité de ces cétacées étoit plus grande avec les enfans qu'avec l'homme avancé en âge. Mécénas-Fabius et Flavius-Alfius ont écrit dans leurs chroniques, suivant Pline, qu'un dauphin qui avoit pénétré dans le lac Lucrin, recevoit tous les jours du pain que lui donnoit un jeune enfant, qu'il accouroit à sa voix, qu'il le portoit sur son dos, et que l'enfant ayant péri, le dauphin, qui ne revit plus son jeune ami, mourut bientôt de chagrin. Le naturaliste romain ajoute des faits semblables arrivés sous Alexandre de Macédoine, ou racontés par Égésidème et par Théophraste. Les anciens enfin n'ont pas balancé à supposer dans les dauphins pour les jeunes gens, avec lesquels ils pouvoient jouer plus facilement qu'avec des hommes faits, une sensibilité, une affection et une constance presque semblables à celles dont le chien nous donne des exemples si touchans.

Ces cétacées, que l'on a voulu représenter comme susceptibles d'un attachement

ment si vif et si durable, sont néanmoins des animaux carnassiers. Mais n'oublions pas que le chien, ce compagnon de l'homme, si tendre, si fidèle et si dévoué, est aussi un animal de proie; et qu'entre le loup féroce et le doux épagneul, il n'y a d'autre différence que les effets de l'art et de la domesticité.

Les dauphins se nourrissent donc de substances animales : ils recherchent particulièrement les poissons; ils préfèrent les morues, les églefins, les persèques, les pleuronectes; ils poursuivent les troupes nombreuses de muges jusqu'auprès des filets des pêcheurs; et, à cause de cette sorte de familiarité hardie, ils ont été considérés comme les auxiliaires de ces marins, dont ils ne vouloient cependant qu'enlever ou partager la proie.

Plin et quelques autres auteurs anciens ont cru que les dauphins ne pouvoient rien saisir avec leur gueule, qu'en se retournant et se renversant presque sur leur dos; mais ils n'ont eu cette opinion, que parce qu'ils ont souvent confondu ces cétaquées avec des squales, des acipensères, ou quelques autres grands poissons.

DES DAUPHINS
 Les dauphins peuvent chercher
 leur est nécessaire, p
 que plusieurs autres ha
 aucun climat ne leur est
 des arts non seulement da
 que septentrional, ma
 le grand Océan équinox
 de la Chine, près des
 que méridionale, dans
 l'Afrique, dans
 les méditerranées, dans
 tement qui arrose et l'
 et l'Europe.

est des saisons où ils paroissent
 la pleine mer au voisinage
 remarqué * qu'ordinairement
 vent contre le vent; et cette
 étoit bien constatée, m
 le pas du besoin et du
 animaux d'être avertis plu
 émanations odorantes
 que à l'organe de leur o
 race des objets qu'ils re
 recherchent ?

* De Perrey, Histoire d
 Mammifères, tome I, p. 97 c.

Les dauphins peuvent chercher la nourriture qui leur est nécessaire, plus facilement que plusieurs autres habitans des mers : aucun climat ne leur est contraire.

On les a vus non seulement dans l'Océan atlantique septentrional, mais encore dans le grand Océan équinoxial, auprès des côtes de la Chine, près des rivages de l'Amérique méridionale, dans les mers qui baignent l'Afrique, dans toutes les grandes méditerranées, dans celle particulièrement qui arrose et l'Afrique et l'Asie et l'Europe.

Il est des saisons où ils paroissent préférer la pleine mer au voisinage des côtes. On a remarqué * qu'ordinairement ils vo-
guoient contre le vent ; et cette habitude, si elle étoit bien constatée, ne proviendrait-elle pas du besoin et du desir qu'ont ces animaux d'être avertis plus facilement, par les émanations odorantes que le vent apporte à l'organe de leur odorat, de la présence des objets qu'ils redoutent ou qu'ils recherchent ?

* Dom Pernetty, *Histoire d'un voyage aux îles Malouines*, tome I, p. 97 et suiv.

On a dit qu'ils bondissoient sur la surface de la mer avec plus de force, de fréquence et d'agilité, lorsque la tempête menaçoit, et même lorsque le vent devoit succéder au calme *. Plus on fera de progrès dans la physique, et plus on s'apercevra que l'électricité de l'air est une des plus grandes causes de tous les changemens que l'atmosphère éprouve. Or tout ce que nous avons déjà dit de l'organisation et des habitudes des dauphins, doit nous faire présumer qu'ils doivent être très-sensibles aux variations de l'électricité atmosphérique.

Nous voyons dans Oppien et dans Élien, que les anciens habitans de Byzance et de la Thrace poursuivoient les dauphins avec des tridents attachés à de longues cordes, comme les harpons dont on est armé maintenant pour la pêche des baleines franches et de ces mêmes dauphins. Il est des parages où ces derniers cétacées sont assez nombreux pour qu'une grande quantité d'huile soit le produit des recherches

* Voyez le *Voyage à l'île de France*, de mon célèbre confrère le citoyen de Saint-Pierre.

DES DAUPHINS
 ces contre ces animaux. Il
 falloit compter parmi ces
 rivages de la Côte
 dauphins n'ayant pas le
 respirer, et ne pouvant m
 de dans l'air, il n'est pas
 puisse les conserver très
 de l'eau, sans leur faire pe
 les cétacées ayant pu être
 rès, et ayant toujours ex
 du vulgaire, l'attention de
 tion de l'observateur, on
 ment toutes leurs propr
 tributs, tous leurs traits
 c'est pourquoi plusieurs
 avoient devoir compter dans
 décisions, des variétés pl
 étantes. On a distingué le
 brun livide *; ceux qu
 être, avec les côtes et le
 et le noir hétéro
 leur est d'un gris pl
 et enfin ceux dont tou
 Ses manuscrites de Comm
 éen, qui dans le temps a br
 comiquer.

dirigées contre ces animaux. On a écrit qu'il falloit compter parmi ces parages, les environs des rivages de la Cochinchine.

Les dauphins n'ayant pas besoin d'eau pour respirer, et ne pouvant même respirer que dans l'air, il n'est pas surprenant qu'on puisse les conserver très-long-temps hors de l'eau, sans leur faire perdre la vie.

Ces cétacées ayant pu être facilement observés, et ayant toujours excité la curiosité du vulgaire, l'intérêt des marins, l'attention de l'observateur, on a remarqué facilement toutes leurs propriétés, tous leurs attributs, tous leurs traits distinctifs; et voilà pourquoi plusieurs naturalistes ont cru devoir compter dans l'espèce que nous décrivons, des variétés plus ou moins constantes. On a distingué les dauphins d'un brun livide *; ceux qui ont le dos noirâtre, avec les côtés et le ventre d'un gris de perle moucheté de noir; ceux dont la couleur est d'un gris plus ou moins foncé; et enfin ceux dont toute la surface

* Notes manuscrites de Commerson, remises à Buffon, qui dans le temps a bien voulu me les communiquer.

est d'un blanc éclatant comme celui de la neige.

Mais nous venons de voir le dauphin de la Nature; voyons celui des poètes. Suspendons un moment l'histoire de la puissance qui crée, et jetons les yeux sur les arts qui embellissent.

Nous voici dans l'empire de l'imagination; la raison éclairée, qu'elle charme, mais qu'elle n'aveugle ni ne séduit, saura distinguer dans le tableau que nous allons essayer de présenter, la vérité parée des voiles brillans de la fable.

Les anciens habitans des rives fortunées de la Grèce connoissoient bien le dauphin: mais la vivacité de leur génie poétique ne leur a pas permis de le peindre tel qu'il est; leur morale religieuse a eu besoin de le métamorphoser et d'en faire un de ses types. Et d'ailleurs, la conception d'objets chimériques leur étoit aussi nécessaire que le mouvement l'est au dauphin. L'esprit, comme le corps, use de toutes ses forces, lorsqu'aucun obstacle ne l'arrête; et les imaginations ardentes n'ont pas besoin des sentimens profonds

DES DAUPHINS
 idées lugubres que l'ai-
 horrible, pour inventer
 épiques, pour produire de
 zels, pour enfanter des dieux
 ciel à ses orages; le rivage
 sa mélancolie. Les charmes
 ceux de l'Attique et du Parnasse
 et point inspire cette terreur
 noirs pressentimens, ces tén-
 qui ont élevé le trône d'Or-
 thologie au milieu de palais
 le fantômes vaporeux, a
 montaires menaçans, de
 aux et des froides forêts de la
 Asie ou de l'héroïque
 la vallée de Tempé, les
 de l'Hymète, les rives d'
 bois mystérieux de Delphes
 Cyclades, ont eu
 des Grecs par tout ce qu'
 offrir de contrastes pitto-
 pages romantiques, de t-
 reux, de scènes gracieuses
 rochers, de retraites fortifi-
 attendrissantes, d'obscu-
 res, funèbres même, et

ni des idées lugubres que fait naître un climat horrible, pour inventer des causes fantastiques, pour produire des êtres surnaturels, pour enfanter des dieux. Le plus beau ciel a ses orages; le rivage le plus riant a sa mélancolie. Les champs thessaliens, ceux de l'Attique et du Péloponnèse, n'ont point inspiré cette terreur sacrée, ces noirs pressentimens, ces tristes souvenirs qui ont élevé le trône d'une sombre mythologie au milieu de palais de nuages et de fantômes vaporeux, au-dessus des promontoires menaçans, des lacs brumeux et des froides forêts de la valeureuse Calédonie ou de l'héroïque Hibernie : mais la vallée de Tempé, les pentes fleuries de l'Hymète, les rives de l'Eurotas, les bois mystérieux de Delphes, et les heureuses Cyclades, ont ému la sensibilité des Grecs par tout ce que la Nature peut offrir de contrastes pittoresques, de paysages romantiques, de tableaux majestueux, de scènes gracieuses, de monts verdoyans, de retraites fortunées, d'images attendrissantes, d'objets touchans, tristes, funèbres même, et cependant

remplis de douceur et de charme. Les bosquets de l'Arcadie ombrageoient des tombeaux; et les tombeaux étoient cachés sous des tiges de roses.

La mythologie grecque, variée et immense comme la belle Nature dont elle a reçu le jour, a dû soumettre tous les êtres à sa puissance.

Auroit-elle pu dès-lors ne pas étendre son influence magique jusque sur le dauphin? Mais si elle a changé ses qualités, elle n'a pas altéré ses formes. Ce n'est pas la mythologie qui a dénaturé ses traits; ils ont été métamorphosés par l'art de la sculpture encore dans son enfance, bientôt après la fin de ces temps faineux auxquels la Grèce a donné le nom d'*héroïques*. J'adopte à cet égard l'opinion de mon illustre confrère Visconti, de l'Institut national; et voici ce que pense à ce sujet ce savant interprète de l'antiquité *.

On adoroit Apollon à Delphes, non seulement sous le nom de *Delphique* et de *Pythien*, mais encore sous celui de *Delphinien* (*Delphinios*). On racontoit, pour

* Lettre du citoyen Visconti à Lacepède.

DES DAUPHINS
la raison de ce titre, qu'il
montré sous la forme d'un
Crétois qu'il avoit obligé
le rivage de Delphes, et qu
l'oracle le plus révéré
des Grecs. Cette fable
d'autre origine que la re
com de Delphes avec celui
); mais elle est de la
conté, et on en lit les
me à l'honneur d'Apollon
due à Homère. Le citoyen
nde comme certain que l'
s adoré à Delphes avoit d
es symboles. Des figures
roient orner son temple; et
orations de ce sanctuaire
siècles les plus reculés, et
l'empreinte de l'enfance
figures inexactes, l'un par
et si peu semblables
et cependant consacrées
par la sainteté de l'oracle
s qui sont venus à l'e
s sure avoit déjà fait d
pas osé corriger ces la

rendre raison de ce titre, que le dieu s'étoit montré sous la forme d'un dauphin aux Crétois qu'il avoit obligés d'aborder sur le rivage de Delphes, et qui y avoient fondé l'oracle le plus révééré du monde connu des Grecs. Cette fable n'a eu peut-être d'autre origine que la ressemblance du nom de Delphes avec celui du dauphin (*delphin*); mais elle est de la plus haute antiquité, et on en lit les détails dans l'hymne à l'honneur d'Apollon, que l'on attribue à Homère. Le citoyen Visconti regarde comme certain que l'*Apollon delphinius* adoré à Delphes avoit des dauphins pour symboles. Des figures de dauphins devoient orner son temple; et comme les décorations de ce sanctuaire remontoient aux siècles les plus reculés, elles devoient porter l'empreinte de l'enfance de l'art. Ces figures inexactes, imparfaites, grossières, et si peu semblables à la nature, ont été cependant consacrées par le temps et par la sainteté de l'oracle. Les artistes habiles qui sont venus à l'époque où la sculpture avoit déjà fait des progrès, n'ont pas osé corriger ces figures d'après

des modèles vivans ; ils se sont contentés d'en embellir le caractère, d'en agrandir les traits, d'en adoucir les contours. La forme bizarre des dauphins *delphiques* a passé sur les monumens des anciens, s'est perpétuée sur les productions des peuples modernes ; et si aucun des auteurs qui ont décrit le temple de Delphes, n'a parlé de ces dauphins sculptés par le ciseau des plus anciens artistes grecs, c'est que ce temple d'Apollon a été pillé plusieurs fois, et que, du temps de Pausanias, il ne restoit aucun des anciens ornemens du sanctuaire.

Les peintres et les sculpteurs modernes ont donc représenté le dauphin, comme les artistes grecs du temps d'Homère, avec la queue relevée, la tête très-grosse, la gueule très-grande, etc. Mais sous quelques traits qu'il ait été vu, les historiens l'ont célébré, les poètes l'ont chanté, les peuples l'ont consacré à la divinité qu'ils adoroient. On l'a respecté comme cher, non seulement à Apollon et à Bacchus, mais encore à Neptune, qu'il avoit aidé, suivant une tradition religieuse rapportée par Oppien, à découvrir son Amphitrite

DES DAUPHINS
que, voulant conserver sa
étoit enfuie jusque dans
même Oppien l'a nommé le
sacré maria, et le titre de
sacré) lui a été don

répété avec sensibilité
salutaire par un dau
fait naufrage près de
lie. On a honoré le dauph
bienfaiteur de l'homme. O
une allégorie touchan
convenir consolateur po
heureux, l'aventure d'
macé de la mort par les fero
navire sur lequel il étoit
épita dans la mer, fut acc
dauphin que le doux son de
ré, et fut porté jusqu'au
cet animal attentif, sens
uant.

l'a nommé barbares et
roes et les autres peup
et la mort au dauphin
jours en mouvement
et les habitans de l'occe

lorsque, voulant conserver sa virginité, elle s'étoit enfuie jusque dans l'Atlantide. Ce même Oppien l'a nommé le *ministre du Jupiter marin* ; et le titre de *hieros ichthys* (poisson sacré) lui a été donné dans la Grèce.

On a répété avec sensibilité l'histoire de Phalante sauvé par un dauphin, après avoir fait naufrage près des côtes de l'Italie. On a honoré le dauphin, comme un bienfaiteur de l'homme. On a conservé comme une allégorie touchante, comme un souvenir consolateur pour le génie malheureux, l'aventure d'Arion, qui, menacé de la mort par les féroces matelots du navire sur lequel il étoit monté, se précipita dans la mer, fut accueilli par un dauphin que le doux son de sa lyre avoit attiré, et fut porté jusqu'au port voisin par cet animal attentif, sensible et reconnaissant.

On a nommé barbares et cruels, les Thraces et les autres peuples qui donnoient la mort au dauphin.

Toujours en mouvement, il a paru parmi les habitans de l'océan, non seule-

ment le plus rapide, mais le plus ennemi du repos; on l'a cru l'emblème du génie qui crée, développe et conserve, parce que son activité soumet le temps, comme son immensité domine sur l'espace; on l'a proclamé *le roi de la mer*.

L'attention se portant de plus en plus vers lui, il a partagé avec le cygne * l'honneur d'avoir suggéré la forme des premiers navires, par les proportions déliées de son corps si propre à fendre l'eau, et par la position ainsi que par la figure de ses rames si célères et si puissantes.

Son intelligence et sa sensibilité devant chaque jour l'objet d'une admiration plus vive, on a voulu leur attribuer une origine merveilleuse : les dauphins ont été des hommes punis par la vengeance céleste, déchus de leur premier état, mais conservant des traits de leur première essence. Bientôt on a rappelé avec plus de force qu'Apollon avoit pris la figure d'un dauphin pour conduire vers les rives de Delphes sa colonie chérie. Neptune, disoit-on, s'étoit changé en dauphin pour

* Voyez l'article du cygne par Buffon.

DES DAUPHINS
 er Melantho, comme Jupiter
 morphosé en taureau pour
 pe. On se représentoit
 vive, mais animée par l'air
 ant la surface paisible des m
 s, sur le dos du dauphin d
 soumis à ses charmes.
 doré à Sunium, sous la fo
 ainsi cher à son amante. L
 de plus que consacré : il a ét
 lace a été marquée au rang
 au vu le dauphin céleste bri
 constellations.
 Les opinions pures ou altérées
 avec plus ou moins de force
 rentes contrées dont les fle
 leurs eaux vers le grand b
 iterranée, est-il surprenan
 sphin ait été pour tant de
 rose de la mer; qu'on ait
 ar un dauphin dans une
 dans l'autre, pour mon
 se étend sur la terre et
 le dauphin entortillé au
 statin qui la liberté du
 place autour d'un tré

enlever Mélantho, comme Jupiter s'étoit métamorphosé en taureau pour enlever Europe. On se représentoit la beauté craintive, mais animée par l'amour, parcourant la surface paisible des mers obéissantes, sur le dos du dauphin dieu qu'elle avoit soumis à ses charmes. Neptune a été adoré à Sunium, sous la forme de ce dauphin si cher à son amante. Le dauphin a été plus que consacré : il a été divinisé. Sa place a été marquée au rang des dieux ; et on a vu le dauphin céleste briller parmi les constellations.

Ces opinions pures ou altérées ayant régné avec plus ou moins de force dans les différentes contrées dont les fleuves roulent leurs eaux vers le grand bassin de la Méditerranée, est-il surprenant que le dauphin ait été pour tant de peuples le symbole de la mer ; qu'on ait représenté l'Amour un dauphin dans une main et des fleurs dans l'autre, pour montrer que son empire s'étend sur la terre et sur l'onde ; que le dauphin entortillé autour d'un trident ait indiqué la liberté du commerce ; que, placé autour d'un trépied, il ait

désigné le collège de quinze prêtres qui desservoit à Rome le temple d'Apollon; que, caressé par Neptune, il ait été le signe de la tranquillité des flots, et du salut des navigateurs; que disposé autour d'une ancre, ou mis au-dessus d'un bœuf à face humaine, il ait été le signe hiéroglyphique de ce mélange de vitesse et de lenteur dans lequel on a fait consister la prudence, et qu'il ait exprimé cette maxime favorite d'Auguste, *Hâte-toi lentement*, que cet empereur employoit comme devise, même dans ses lettres familières; que les chefs des Gaulois aient eu le dauphin pour emblème; que son nom ait été donné à un grand pays et à des dignités éminentes; qu'on le voie sur les antiques médailles de Tarente, sur celles de Pæstum dont plusieurs le montrent avec un enfant ailé ou non ailé sur le dos, sur les médailles de Corinthe qui donnent à sa tête ses véritables traits *, et sur

* Je m'en suis assuré, en examinant, avec feu mon respectable ami l'illustre auteur du *Voyage d'Anacharsis*, la précieuse collection des médailles qui appartiennent à la nation françoise.

DES DAUPHINS
 d'Egium en Achaïe, d'
 de Byzantium, de
 de Lipari, de Sy
 de Vêlia, de Cartage
 d'Alexandre, de Néron, de
 d'Espasien, de Tite; que
 d'asse, son anneau et son
 ait offert l'image; qu'on a
 dans les cirques; et
 sacré à la beauté céleste,
 aux pieds de cette Vénus
 on admire dans le musée

ge de quinze prêtres qui
le temple d'Apollon;
Neptune, il ait été le
quillité des flots, et du
urs; que disposé autour
mis au-dessus d'un bœuf
il ait été le signe hiéro-
mélange de vitesse et de
uel on a fait consister la
il ait exprimé cette ma-
Auguste, *Hâte-toi lente-*
preur employoit comme
ans ses lettres familières;
Gaulois aient eu le dau-
me; que son nom ait été
d pays et à des dignités
le voie sur les antiques
ente, sur celles de Pæstum
e montrent avec un en-
n ailé sur le dos, sur
Corinthe qui donnent
ritables traits *, et sur
ssuré, en examinant, avec fen
i l'illustre auteur du *Voyage*
précieuse collection des mé-
nnent à la nation françoise.

celles d'Ægium en Achaïe, d'Eubée, de Nisyros, de Byzantium, de Brindes, de Larinum, de Lipari, de Syracuse, de Théra, de Vélia, de Cartéjà en Espagne, d'Alexandre, de Néron, de Vitellius, de Vespasien, de Tite; que le bouclier d'Ulysse, son anneau et son épée, en aient offert l'image; qu'on ait élevé sa figure dans les cirques; et qu'on l'ait consacré à la beauté céleste, en le mettant aux pieds de cette Vénus si parfaite, que l'on admire dans le musée Napoléon?

LE DAUPHIN MARSOUIN *.

LE marsouin ressemble beaucoup au dauphin vulgaire; il présente presque les mêmes traits; il est doué des mêmes qualités; il offre les mêmes attributs; il éprouve

* *Delphinus phocæna*; marsouin franc; maris sus; tursio; marsopa, en Espagne; porpus, porpesse ou porpoisse, en Angleterre; bruinvisch, tonyn, zee-vark, en Hollande; meerschvaim, braunfisch, en Allemagne, swinia-morska, en Pologne; morskaja-swinja, en Russie; marswin, trumblare, en Suède; marswin, tunler, en Danemarck; nise, en Norvège; nisa, en Groenland; brunskop, hundfiskur, en Islande; *delphinus phocæna*, Linné, édition de Gmelin; dauphin marsouin, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; marsouin, ménagerie du musée d'histoire naturelle (Cuvier); Faun. Suecic. 51; *delphinus corpore ferè coniformi, dorso lato, rostro subacuto*, Arledi, gen. 74, syn. 104; *parvus delphinus, vel delphin Septentrionalium aut Orientalium*, Schoneveld, p. 77; ἰ φώκαινα, Aristot. lib. 6, cap. 12, et lib. 8, cap. 13;

DES DAUPHIN
mêmes affections: et cependant
sance dans leur fortune! I
divinisé, et le marsouin p
cercue de la mer. Mais le
son nom de marins et d
iers: le dauphin a dû sa
poétique de la Grèce si
Muses, qui seules accorde

marin tursio, Bellon, Aqual. p.
u, liv. 16, chap. 6, édit. de
ena, Wotton, lib. 8, cap. 194
haston, lib. 5, cap. 2, a; 5, p.
Willoughby, Pisc. p. 31, tab.
la, Pisc. p. 13; *phocæna sive* t
p. 83; et (Linné) lib. 7, p.
cuvier. Pisc. p. 719, fig. p. 72
ena, pinnâ in dorso undâ, de
phocæna, Brisson, Regn.
marsouin (*delphinus phocæ*
aire des poissons, p. 92, K.
p. 25, tab. 2 A, B, C.
Zool. Scot. 3, p. 23; Ray, p.
schweim, etc. etc. etc. etc.
Linné, p. 244; etc. etc.
p. 60; etc. etc. etc. etc.
p. 207, etc. etc.
Grosvenor, p. 45.

semble beaucoup au
; il présente presque les
st doué des mêmes qua-
mes attributs; il éprouve

ena; marsouin franc; maris
pa, en Espagne; porpus,
, en Angleterre; bruinisch,
Hollande; meerschwein,
magne, swinia-morska, en
vinja, en Russie; marswin,
; marswin, tumler, en Da-
orvège; nisa, en Groenland;
ur, en Islande; delphinus
dition de Gmelin; dauphin
re, planches de l'Encyclo-
marsouin, ménagerie du mu-
elle (Cuvier); Faun. Suecic.
e frère coniformi, dorso lato,
tedi, gen. 74, syn. 104;
delphin Septentrionalium
loneveld, p. 77; n φάσσα.
12, et lib. 8, cap. 13;

les mêmes affections: et cependant, quelle différence dans leur fortune! le dauphin a été divinisé, et le marsouin porte le nom de *pourceau de la mer*. Mais le marsouin a reçu son nom de marins et de pêcheurs grossiers: le dauphin a dû sa destinée au génie poétique de la Grèce si spirituelle; et les Muses, qui seules accordent la gloire

marsouin tursio, Bellon, Aquat. p. 16; *id.* Rondelet, liv. 16, chap. 6, édit. de Lyon, 1558; *phocæna*, Wotton, lib. 8, cap. 194, fol. 172, a; *id.* Jonston, lib. 5, cap. 2, a; 5, p. 220, tab. 41; *id.* Willughby, Pisc. p. 31, tab. A. 1, fig. 2; *id.* Raj. Pisc. p. 13; *phocæna sive tursio*, Gesner, Aquat. p. 837; et (*germ.*) fol. 96, b; *phocæna*, Aldrovand. Pisc. p. 719, fig. p. 720; *delphinus phocæna*, *pinnâ in dorso unâ, dentibus acutis, rostro brevi obtuso*, Brisson, Regn. anim. p. 371, n. 2; *marsouin* (*delphinus phocæna*), Bloch, Histoire des poissons, pl. 92; Klein, Misc. pisc. 1, p. 24, et 2, p. 26, tab. 2 A, B, 3 B; *phocæna*, Sibbald. Scot. an. p. 23; Rzacz. Pol. Auct. p. 245; *meerschwein*, oder *tunin*. Mart. Spitzb. p. 92; *id.* Anderson. Island. p. 253; *id.* Crantz, Groenland, p. 151; *niser*, ou *le marsouin*, Eggede, Groenland, p. 60; *delphin*, oder *nisen*, Gunner, Act. Nidros, 2, p. 237, tab. 4; Oth. Fabric. Faun. Groenland, p. 46.

à l'homme, donnent seules de l'éclat aux autres ouvrages de la Nature.

L'ensemble formé par le corps et la queue du marsouin représente un cône très-alongé. Ce cône n'est cependant pas assez régulier pour que le dos ne soit pas large et légèrement aplati. Vers les deux tiers de la longueur du dos, s'élève une nageoire assez peu échancrée par-derrière, et assez peu courbée dans le haut, pour paroître de loin former un triangle rectangle. La tête un peu renflée au-dessus des yeux ressemble d'ailleurs à un cône très-court, à sommet obtus, et dont la base seroit opposée à celle du cône alongé que forment le corps et la queue.

Les deux mâchoires, presque aussi avancées l'une que l'autre, sont dénuées de lèvres proprement dites, et garnies chacune de dents petites, un peu aplaties, tranchantes, et dont le nombre varie depuis quarante jusqu'à cinquante.

La langue, presque semblable à celle du dauphin vulgaire, est molle, large, plate, et comme dentelée sur ses bords.

La pyramide du larynx est formée par

DES DAUPHINS
dote et par les cartilages
qui sont joints ensemble
qu'il ne reste qu'une petite
vers le haut.

très-habiles anatomistes
cette conformation, que l'on
devoit faire entendre qu'il
mouvement ou de bruissement
pendant, en réfléchissant sur
essentiels du son, sur les
qui peuvent le produire
vers instrumens sonores que
ou que la Nature a formés
rois, ainsi que je cherche
dans un ouvrage différent
de l'appareil le plus simple
le moins sonore peut fa
rables sons, très-faciles
bruissement, du frémisse
ou proprement dit, et ent
ables à ceux que l'homme pr
re, que l'on rappelle
dit dans les articles
ache, de la jubarte, du
céphale, et qu'on le rap
d'Aristote et plusieurs au

l'épiglotte et par les cartilages arythénoïdes, qui sont joints ensemble de manière qu'il ne reste qu'une petite ouverture située vers le haut.

De très-habiles anatomistes ont conclu de cette conformation, que le marsouin ne pouvoit faire entendre qu'une sorte de frémissement ou de bruissement sourd. Cependant, en réfléchissant sur les qualités essentielles du son, sur les différentes causes qui peuvent le produire, sur les divers instrumens sonores que l'on a imaginés ou que la Nature a formés, on verra, je crois, ainsi que je chercherai à le montrer dans un ouvrage différent de celui-ci, que l'appareil le plus simple et en apparence le moins sonore peut faire naître de véritables sons, très-faciles à distinguer du bruissement, du frémissement, ou du bruit proprement dit, et entièrement semblables à ceux que l'homme profère. D'ailleurs, que l'on rappelle ce que nous avons dit dans les articles de la baleine franche, de la jubarte, du cachalot macrocéphale, et qu'on le rapproche de ce qu'Aristote et plusieurs autres auteurs

ont écrit d'une espèce de gémissement que le marsouin fait entendre.

L'orifice des événements est placé au-dessus de l'espace qui sépare l'œil de l'ouverture de la bouche. Il représente un croissant; et sa concavité est tournée vers le museau.

Les yeux sont petits, et situés à la même hauteur que les lèvres. Une humeur muqueuse enduit la surface intérieure des paupières, qui sont très-peu mobiles. L'iris est jaunâtre, et la prunelle paroît souvent triangulaire.

Au-delà de l'œil, très-près de cet organe et à la même hauteur, est l'orifice presque imperceptible du canal auditif.

La nageoire pectorale répond au milieu de l'espace qui sépare l'œil de la dorsale : mais ce bras est situé très-bas; ce qui rabaisse le centre d'action et le centre de gravité du marsouin, et donne à ce cétacée la faculté de se maintenir, en nageant, dans la position la plus convenable.

Un peu au-delà de la fossette ombilicale, on découvre une fente longitudinale, par laquelle sort la verge du mâle, qui, cylindrique près de sa racine, se

DES PARTIES
... Les testicules
... est relié
... Le ma
... vésicule séminale, mais
... d'un très-grand volume. La
... s'attachent
... Le vagin de la fe
... transversalement.
... est presque aussi él
... sexuelles que de la caud
... lobes sont échancrés,
... laquelle part une petite
... male, qui s'étend le long
... près de la dorsale.
... bien très-foncé ou un no
... sur la partie supérieure
... et une teinte blanchâ
... inférieure.
... épiderme très-doux au
... se détache facilement
... très-lisse, recouvert d'un
... d'une graisse très
... premier estomac, auquel
... qui a des plus long
... ands, est ovale, très-g

conde ensuite, devient conique, et se termine en pointe. Les testicules sont cachés; le canal déférent est replié avant d'entrer dans l'urètre. Le marsouin n'a pas de vésicule séminale, mais une prostate d'un très-grand volume. Les muscles des corps caverneux s'attachent aux petits os du bassin. Le vagin de la femelle est ridé transversalement.

L'anus est presque aussi éloigné des parties sexuelles que de la caudale, dont les deux lobes sont échancrés, et du milieu de laquelle part une petite saillie longitudinale, qui s'étend le long du dos, jusqu'auprès de la dorsale.

Un bleu très-foncé ou un noir luisant règne sur la partie supérieure du marsouin, et une teinte blanchâtre sur sa partie inférieure.

Un épiderme très-doux au toucher, mais qui se détache facilement, et une peau très-lisse, recouvrent une couche assez épaisse d'une graisse très-blanche.

Le premier estomac, auquel conduit l'œsophage qui a des plis longitudinaux très-profonds, est ovale, très-grand, très-

ridé en dedans, et revêtu à l'intérieur d'une membrane veloutée très-épaisse. Le pylore de cet estomac est garni de rides très-saillantes et fortes, qui ne peuvent laisser passer que des corps très-peu volumineux, interdisent aux alimens tout retour vers l'œsophage, et par conséquent empêchent toute véritable rumination.

Un petit sac, ou, si l'on veut, un second estomac conduit dans un troisième, qui est rond, et presque aussi grand que le premier. Les parois de ce troisième estomac sont très-épaisses, composées d'une sorte de pulpe assez homogène, et d'une membrane veloutée, lisse et fine; et les rides longitudinales qu'elles présentent, se ramifient, pour ainsi dire, en rides obliques.

Un nouveau sac très-petit conduit à un quatrième estomac membraneux, criblé de pores, conformé comme un tuyau, et contourné en deux sens opposés. Le cinquième, ridé et arrondi, aboutit à un canal intestinal, qui, plissé longitudinalement et très-profondément, n'offre pas de cœcum, va, en diminuant de diamètre,

DES DAUPHINS
qui à l'anus, est très-minime
crifice, et peut avoir, sur
longueur égale à douze
du cétacée.

Les reins ne présentent pas
sont partagés en plusieurs
le foie n'en a que deux, et
est très-peu divisés : il n'y
a point de fiel.

Le canal hépatique aboutit
à l'estomac; et c'est dans cette
se rend le canal pancréatique.
On compte jusqu'à sept
volume, dont la plus grande
est d'une châtaigne, et la
plus petite d'un pois.

Le cerveau est très-grand
Le volume total de l'animal
est les singes et quelques
mammifères, il ressemble à celui
que le cerveau d'aucun
mammifère a par sa largeur, et

On a consulté le savant et
digne par mon confrère
dans la Ménagerie de
naturelle.

jusqu'à l'anus, est très-mince auprès de cet orifice, et peut avoir, suivant Major, une longueur égale à douze fois la longueur du cétacée *.

Les reins ne présentent pas de bassinet, et sont partagés en plusieurs lobes.

Le foie n'en a que deux ; ces deux lobes sont très-peu divisés : il n'y a pas de vésicule du fiel.

Le canal hépatique aboutit au dernier estomac ; et c'est dans cette même cavité que se rend le canal pancréatique.

On compte jusqu'à sept rates inégales en volume, dont la plus grande a la grosseur d'une châtaigne, et la plus petite celle d'un pois.

Le cerveau est très-grand à proportion du volume total de l'animal ; et si l'on excepte les singes et quelques autres quadrumanes, il ressemble à celui de l'homme, plus que le cerveau d'aucun quadrupède, notamment par sa largeur, sa convexité,

* On doit consulter le savant et intéressant article publié par mon confrère Cuvier, sur le marsouin, dans la *Ménagerie du Muséum d'histoire naturelle*.

le nombre de ses circonvolutions, leur profondeur, et sa saillie au-dessus du cervelet.

Les vertèbres du cou sont au nombre de sept, et les dorsales de treize. Mais le nombre des vertèbres lombaires, sacrées et coccygiennes, paroît varier : ordinairement cependant il est de quarante-cinq ou quarante-six ; ces trois sortes de vertèbres occupent alors trente-septcinquantièmes de la longueur totale de la colonne vertébrale ; et les vertèbres du cou n'en occupent pas deux.

Au reste, les apophyses transversales des vertèbres lombaires sont très-grandes ; ce qui sert à expliquer la force que le marsouin a dans sa queue.

Ce cétacée a de chaque côté treize côtes, dont six seulement aboutissent au sternum, qui est un peu recourbé et comme divisé en deux branches.

Mais considérons de nouveau l'ensemble du marsouin.

Nous verrons que sa longueur totale peut aller jusqu'à plus de trois mètres, et son poids à plus de dix myriagrammes.

DES DAUPHINS
la distance qui sépare l'
de l'extrémité du m
craiment égale aux
mes de la longueur de l
gueur de la nageoire post
distance ; et la largeur de
la queue atteint presque le
gueur totale du cétacée.
ette grande largeur de la
étendue de la rame pri
ronin, ne contribuent pas
se étonnante que les navi
urquée dans la natation
a, et à cette vivacité de m
meune fatigue ne paroît
que l'œil a de la peine à su
a marsouin, devant lequ
rent, pour ainsi dire, av
né, paroît se plaire à sur
des courans et la vitesse
les grandes marées pouss
ou ramènent vers la liti
esque la tempête l'entraîne
parcourt la surface de
seulement parce que la
aque, qui, pendant les or

La distance qui sépare l'orifice des évents, de l'extrémité du museau, est ordinairement égale aux trois vingt-sixièmes de la longueur de l'animal; la longueur de la nageoire pectorale égale cette distance; et la largeur de la nageoire de la queue atteint presque le quart de la longueur totale du cétacée.

Cette grande largeur de la caudale, cette étendue de la rame principale du marsouin, ne contribuent pas peu à cette vitesse étonnante que les navigateurs ont remarquée dans la natation de ce dauphin, et à cette vivacité de mouvemens, qu'aucune fatigue ne paroît suspendre, et que l'œil a de la peine à suivre.

Le marsouin, devant lequel les flots s'ouvrent, pour ainsi dire, avec tant de docilité, paroît se plaire à surmonter l'action des courans et la violence des vagues que les grandes marées poussent vers les côtes ou ramènent vers la haute mer.

Lorsque la tempête bouleverse l'océan, il en parcourt la surface avec facilité, non seulement parce que la puissance électrique, qui, pendant les orages, règne

sur la mer comme dans l'atmosphère, le maîtrise, l'anime, l'agite, mais encore parce que la force de ses muscles peut aisément contre-balancer la résistance des ondes soulevées.

Il joue avec la mer furieuse. Pourroit-on être étonné qu'il s'ébatte sur l'océan paisible, et qu'il se livre pendant le calme à tant de bonds, d'évolutions et de manœuvres ?

Ces mouvemens, ces jeux, ces élans, sont d'autant plus variés, que l'imitation, cette force qui a tant d'empire sur les êtres sensibles, les multiplie et les modifie.

Les marsouins en effet vont presque toujours en troupes. Ils se rassemblent sur-tout dans le temps de leurs amours : il n'est pas rare alors de voir un grand nombre de mâles poursuivre la même femelle ; et ces mâles éprouvent dans ces momens de trouble une ardeur si grande, que, violemment agités, transportés, et ne distinguant plus que l'objet de leur vive recherche, ils se précipitent contre les rochers des rivages, ou s'élancent sur les vaisseaux, et s'y laissent prendre avec

DES DAUPHINS
et de facilité, pour qu'on
inde qu'ils sont, au mili
se de délire, entièrement
tuté de voir.

Le temps d'aveuglement c
si impérieuses se rencon
ent avec la fin de l'été.

La femelle reçoit le mâle
persant sur le dos, en le p
pectorales, ou, ce qui

se, en le serrant dans ses

Le temps de la gestation

nderson et quelques aut

ans, de six mois ; il est de

res, suivant Aristote et d'a

riens ou modernes ; et c

ation paroît la seule conf

ration, puisque comm

ues marsouins viennent

quinox d'été.

La portée n'est le plus sou

et, qui est déjà parvenu à

néderable lorsqu'il voit

qu'un embryon tiré da

elle, et mesure par Klen

ex decimètres de longu

assez de facilité, pour qu'on pense en Islande qu'ils sont, au milieu de cette sorte de délire, entièrement privés de la faculté de voir.

Ce temps d'aveuglement et de sensations si impérieuses se rencontre ordinairement avec la fin de l'été.

La femelle reçoit le mâle favorisé en se renversant sur le dos, en le pressant avec ses pectorales, ou, ce qui est la même chose, en le serrant dans ses bras.

Le temps de la gestation est, suivant Anderson et quelques autres observateurs, de six mois; il est de dix mois lunaires, suivant Aristote et d'autres auteurs anciens ou modernes; et cette dernière opinion paroît la seule conforme à l'observation, puisque communément les jeunes marsouins viennent au jour vers l'équinoxe d'été.

La portée n'est le plus souvent que d'un petit, qui est déjà parvenu à une grosseur considérable lorsqu'il voit la lumière, puisqu'un embryon tiré du ventre d'une femelle, et mesuré par Klein, avoit près de six décimètres de longueur.

Le marsouin nouveau-né ne cesse d'être auprès de sa mère, pendant tout le temps où il a besoin de teter; et ce temps est d'une année, dit Otho Fabricius.

Il se nourrit ensuite, comme ses père et mère, de poissons qu'il saisit avec autant d'adresse qu'il les poursuit avec rapidité.

On trouve les marsouins dans la Baltique; près des côtes du Groenland et du Labrador; dans le golfe Saint-Laurent; dans presque tout l'Océan atlantique; dans le grand Océan; auprès des îles Galapagos, et du golfe de Panama, où le capitaine Colnett en a vu une quantité innombrable; non loin des rivages occidentaux du Mexique et de la Californie: ils appartiennent à presque toutes les mers. Les anciens les ont vus dans la mer Noire; mais on croiroit qu'ils les ont très-peu observés dans la Méditerranée. Ces cétacées paroissent plus fréquemment en hiver qu'en été dans certains parages; et dans d'autres, au contraire, ils se montrent pendant l'été plus que pendant l'hiver.


DES DAUPHINS
leurs courses ni leurs mœurs
toujours paisibles. Plus
de l'océan sont assez
leur tranquillité; et
ement tout à craindre d
rops, qui peut se aisem
re, les atteindre, les de
rer.
Sont d'ailleurs pour ennu
mbre de pêcheurs, des co
ne peuvent se préserver
aptitude avec laquelle i
et sous l'eau pour éviter le
pons ou les balles.
les Hollandois, les Danois
et des marins de l'Europe
ent les marsouins que po
cétacées; mais les Lapons
crois se nourrissent de c
Groenlandois, par exc
miller ou rôtir la chair,
née se corrompre en par
inreté: ils en mangent
les, la graisse, et m
autres salent ou font d'aut
ours.
II.

Leurs courses ni leurs jeux ne sont pas toujours paisibles. Plusieurs des tyrans de l'océan sont assez forts pour troubler leur tranquillité; et ils ont particulièrement tout à craindre du physétère microps, qui peut si aisément les poursuivre, les atteindre, les déchirer et les dévorer.

Ils ont d'ailleurs pour ennemis un grand nombre de pêcheurs, des coups desquels ils ne peuvent se préserver, malgré la promptitude avec laquelle ils disparoissent sous l'eau pour éviter les traits, les harpons ou les balles.

Les Hollandois, les Danois, et la plupart des marins de l'Europe, ne recherchent les marsouins que pour l'huile de ces cétacées; mais les Lapons et les Groenlandois se nourrissent de ces animaux. Les Groenlandois, par exemple, en font bouillir ou rôtir la chair, après l'avoir laissée se corrompre en partie et perdre de sa dureté; ils en mangent aussi les entrailles, la graisse, et même la peau. D'autres salent ou font fumer la chair des marsouins.

Les navigateurs hollandois ont distingué dans l'espèce du marsouin, une variété qui ne diffère des marsouins ordinaires que par sa petitesse; ils l'ont nommée *ouette*.



OIRE NATURELLE
teurs hollandois ont disti-
pèce du marsouin, une variété
re des marsouins ordinaires
petitesse; ils l'ont nommé



LE DAUPHIN ORQUE*.

CE nom d'orque nous rappelle plusieurs de ces fictions enchanteresses que nous

* *Delphinus orca* ; Épaulard , oudre , dorque , dans plusieurs départemens méridionaux de France ; *grampus* , en Angleterre (voyez , au sujet de ce nom *grampus* , l'ouvrage du savant Schneider sur la Synonymie d'Artédi , page 155) ; *fann-fiskar-hnydcngen* , en Islande ; *spekhugger* , *hval-hund* , *springer* , en Norvège ; *orc-svin* , *tandthoye* , en Danemarck ; *opare* , en Suède ; *kosatky* , en Russie ; *delphinus orca* , Linné , édit. de Gmelin ; *épaulard* ou *oudre* , Bloch , édition de Castel ; *le dauphin épaulard* , Bonnaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique ; *delphinus rostro sursum repando* , etc. Mantissa , M. 2 , p. 523 ; *id.* Artedi . gen. 76 , syn. 106 ; Faun. Suecic. 52 ; Gunn. Act. Nidros. 4 , p. 110 ; *balæna minor* , *utrâque maxillæ dentatâ* , Sibbaldi. Raj. p. 15 ; *delphinus (orca) pinnâ in dorso unâ , dentibus obtusis* , Briss. Regn. anim. p. 373 , n. 4 ; *orca* , Bellon, Aquat. p. 16 , fig. p. 18 ; *espaular* , Rondelet , première partie , liv. 16 , chap. 9 ; Muller , Zoolog. Dan. Prodrum , p. 8 , n. 57 ; Oth. Fabric. Faun. Groenland. 46 ; Hunter , Trans. philos. année 1787.



Orque.
Nesarnak
l'entru.


devons au génie de la poésie. Il retrace aux imaginations vives, il réveille dans les cœurs sensibles, les noms fameux et les aventures touchantes, et d'Andromède et de Persée, et d'Angélique et de Roland; il porte notre pensée vers l'immortel Arioste couronné au milieu des grands poètes de l'antiquité. Ne repoussons jamais ces heureux souvenirs : ne rejetons pas les fleurs du jeune âge des peuples; elles peuvent embellir l'autel de la Nature, sans voiler son image auguste. Disons cependant, pour ne rien dérober à la vérité, que l'orque des naturalistes modernes n'est pas le tyran des mers qui a pu servir de type pour les tableaux de l'ancienne mythologie, ou de la féerie qui l'a remplacée. Nous avons vu en écrivant l'histoire du physétère microps, que ce cétacée auroit pu être ce modèle.

L'orque néanmoins jouit d'une grande puissance; elle exerce un empire redoutable sur plusieurs habitans de l'océan. Sa longueur est souvent de plus de huit mètres, et quelquefois de plus de dix; sa circonférence, dans l'endroit le plus gros

...NATURELLE
...de la poésie. Il retrace
...vives, il réveille dans
...les noms fameux et
...touchantes, et d'Andromède
...et d'Angélique et de Re
...notre pensée vers l'immo
...au milieu des grande
...antiquité. Ne repoussons ja
...soureux souvenirs : ne reieton
...du jeune âge des peupl
...embellir l'autel de la Nature
...son image auguste. Disons ce
...pour ne rien dérober à la vérité
...des naturalistes modernes n'est
...des mers qui a pu servir de
...tableaux de l'ancienne my
...de la féerie qui l'a rempla
...vons vu en écrivant l'histoire
...re microps, que ce cétacé
...ce modèle.

...anmoins jouit d'une grande
...elle exerce un empire redou
...lusieurs habitants de l'océan
...est souvent de plus de huit
...quelquefois de plus de dix; sa
...cc, dans l'endroit le plus gros





1. Crane et Machoire supérieure
du DAUPHIN Orque.

2. Machoire inférieure du DAUPHIN Orque.

DES DAUPHINS
son corps, peut aller jus-
qu'à six toises; et même, suivant que
la longueur égale plus de
la longueur.

On la trouve dans l'Océan
à la vue, auprès du pôle
du détroit de Davis, vers
le détroit de Davis, vers
le détroit de la Tamise, ainsi qu'à
l'antarctique; et elle a été
vue par le capitaine Colnett dans
l'océan, auprès du golfe de Pa-
radis, au voisinage de l'équateur et celle
qui se trouvent donc lui com-
ment donc appartenir à tous
la couleur générale de ce
corps; la gorge, la poitrine
une partie du dessous de la
tête; et l'on voit souvent
une grande tache blanche.
La nageoire de la queue
se compose de deux lobes dont chacun est
entière; la dorsale, placée

A Voyage to the South
of extending the
etc.; by Captain James
Cook

de son corps , peut aller jusqu'à cinq mètres; et même, suivant quelques auteurs, sa largeur égale plus de la moitié de sa longueur.

On la trouve dans l'Océan atlantique, où on l'a vue, auprès du pôle boréal, dans le détroit de Davis, vers l'embouchure de la Tamise, ainsi qu'aux environs du pôle antarctique; et elle a été observée par le capitaine Colnett dans le grand Océan, auprès du golfe de Panama *. Le voisinage de l'équateur et celui des cercles polaires peuvent donc lui convenir; elle peut donc appartenir à tous les climats.

La couleur générale de ce cétacée est noirâtre; la gorge, la poitrine, le ventre, et une partie du dessous de la queue, sont blancs; et l'on voit souvent derrière l'œil une grande tache blanche.

La nageoire de la queue se divise en deux lobes dont chacun est échancré par derrière; la dorsale, placée de manière à

* *A Voyage to the south Atlantic for the purpose of extending the sperma ceti whale fisheries, etc.; by captain James Colnett. London, 1798.*

correspondre au milieu du ventre, à quelquefois près d'un mètre et demi de hauteur. La tête se termine par un museau très-court et arrondi : elle est d'ailleurs très-peu bombée ; et même, lorsqu'on l'a dépouillée de ses tégumens, le crâne paroît non seulement très-aplati, mais encore un peu concave dans sa partie supérieure*.

La mâchoire d'en-haut est un peu plus longue que celle d'en-bas : mais cette dernière est beaucoup plus large que la supérieure ; elle présente de plus, dans sa partie inférieure, une sorte de renflement.

Les dents sont inégales, coniques, mousses et recourbées à leur sommet ; leur nombre doit beaucoup varier sur-tout avec l'âge, puisqu'Artédi dit qu'il y en a quarante à la mâchoire d'en-bas, et que dans la tête osseuse d'une jeune orque, qui fait partie de la collection du Muséum, on n'en compte que vingt-deux à chaque mâchoire.

L'œil est situé très-près de la commis-

* On peut s'en assurer en examinant le crâne d'une orque, qui est conservé dans les galeries d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle.

DES DAUPHINS
des lèvres, mais un peu
pectorales, larges et puissantes
deux rames assez puissantes
male a fréquemment plus d'un
engneur.

Les orques n'ont pas d'intestins
elles se nourrissent de poissons
surtout de pleuronectes ;
on voit aussi les phoques
et si voraces, si hardies et
lorsqu'elles sont réunies en
troupe attaquer un grand cétacé
sur une baleine, la déchirer
dents recourbées, opposées
masse, le nombre au volume
puissance, l'audace à la
tourmentent, couvrent
sang leur monstrueux et
éviter la mort ou de
elles, est quelquefois obligé
par la suite à leurs attaques
et qui, troublé par les
rapides et par leurs
multipliées, se précipite vers
trouve dans les harpons
armes bien plus funestes

sure des lèvres, mais un peu plus haut. Les pectorales, larges et presque ovales, sont deux rames assez puissantes. La verge du mâle a fréquemment plus d'un mètre de longueur.

Les orques n'ont pas d'intestin cœcum.

Elles se nourrissent de poissons, particulièrement de pleuronectes; mais elles dévorent aussi les phoques : elles sont même si voraces, si hardies et si féroces, que lorsqu'elles sont réunies en troupes, elles osent attaquer un grand cétacée, se jettent sur une balcine, la déchirent avec leurs dents recourbées, opposent l'agilité à la masse, le nombre au volume, l'adresse à la puissance, l'audace à la force, agitent, tourmentent, couvrent de blessures et de sang leur monstrueux ennemi, qui, pour éviter la mort ou des douleurs cruelles, est quelquefois obligé de se dérober par la fuite à leurs attaques meurtrières, et qui, troublé par leurs mouvemens rapides et par leurs manœuvres multipliées, se précipite vers les rivages, où il trouve dans les harpons des pêcheurs, des armes bien plus funestes.

LE DAUPHIN GLADIATEUR *.

CE cétacée ressemble beaucoup à l'orque; mais ses armes réelles sont plus puissantes, et ses armes apparentes sont plus grandes.

* *Delphinus gladiator*; *grampus*, par des Anglois; *haa-hirningur*, en Islande; *killer-trasher*, sur les côtes des États-Unis; *delphinus orca*, var. *B*, Linné, édition de Gmelin; *dauphin épée de mer*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique; *id.* Bloch, édition de R. R. Castel; *delphinus pinnâ in dorso unâ gladii recurvi æmulâ, dentibus acutis, rostro quasi truncato*, Brisson, Regn. anim. p. 372, n. 3; *delphinus dorsi pinnâ altissimâ, dentibus subconicis parùm incurvis*, Muller, Zoolog. Dan. Prodrôm. p. 8, n. 57; *schwerdt-fisch*, Anderson, Island. p. 255; Crantz, Groenland. p. 152; *noch ein ander art grosse fische*, Mart. Spitzb. p. 94; *poisson à sabre*, Voyage de Pagès vers le pôle du Nord, tom. II, p. 142; *delphinus (maximus) pinnâ majori acuminatâ, haa hirningur*, Voyage en Islande, par Olafsen et Povelsen.

DES DAUPHINS
sale, qu'on a comparé à
beaucoup plus haute qu
te. D'ailleurs, cette nage
rès-près de la tête, et pr
Sa hauteur surpasse le
longueur totale du cétac
ième est souvent de de
dorsale est recourbée en
arrondie à son extrémité,
pour ressembler à la lam
géant; et cependant à sa
quelques fois trois quarts de m
La peau du dos s'étend a
proéminence, et la couv
le museau est très-court; e
nière est assez peu courb
ain il paroisse comme troi
s mâchoires sont aussi av
l'autre. Les dents sont a
ail, beaucoup plus élev
de la bouche, est presq
ché du bout du museau
ure des lèvres.
pectorale est très-grande
ie en forme d'une cro
compose une rame dont

Sa dorsale, qu'on a comparée à un sabre, est beaucoup plus haute que celle de l'orque. D'ailleurs, cette nageoire est située très-près de la tête, et presque sur la nuque. Sa hauteur surpasse le cinquième de la longueur totale du cétacée, et ce cinquième est souvent de deux mètres. Cette dorsale est recourbée en arrière, un peu arrondie à son extrémité, assez allongée pour ressembler à la lame du sabre d'un géant; et cependant à sa base elle a quelquefois trois quarts de mètre de largeur. La peau du dos s'étend au-dessus de cette proéminence, et la couvre en entier.

Le museau est très-court; et sa surface antérieure est assez peu courbée pour que de loin il paroisse comme tronqué.

Les mâchoires sont aussi avancées l'une que l'autre. Les dents sont aiguës.

L'œil, beaucoup plus élevé que l'ouverture de la bouche, est presque aussi rapproché du bout du museau que la commissure des lèvres.

La pectorale est très-grande, très-aplatie, élargie en forme d'une énorme spatule, et compose une rame dont la longueur

peut être de deux mètres, et la plus grande largeur de plus d'un mètre.

La caudale est aussi très-grande : elle se divise en deux lobes dont chacun a la figure d'un croissant et présente sa concavité du côté du museau. La largeur de cette caudale est de près de trois mètres.

Voilà donc deux grandes causes de vitesse dans la natation et de rapidité dans les mouvemens, que nous présente le gladiateur ; et cet attribut est confirmé par ce que nous trouvons dans des notes manuscrites dont nous devons la connoissance à sir Joseph Banks. Mon illustre confrère m'a fait parvenir ces notes, avec un dessin d'un gladiateur mâle pris dans la Tamise le 10 juin 1793. Ce cétacée, après avoir été percé de trois harpons, remorqua le bateau dans lequel étoient les quatre personnes qui l'avoient blessé, l'entraîna deux fois depuis *Blackwal* jusqu'à *Greenwich*, et une fois jusqu'à *Deptford*, malgré une forte marée qui parcouroit huit milles dans une heure, et sans être arrêté par les coups de lance qu'on lui portoit toutes les fois qu'il paroissoit sur l'eau. Il expira

DES DAUPHINS
 l'hôpital de Greenwich
 dont nous avons fait grav
 trente-un pieds anglois d
 douze pieds de circonferen
 le plus gros de son corps
 pendant qu'il respiroit enco
 n'osa en approcher,
 toit les effets terribles d
 se et de ses derniers effort
 la force de ce dauphin gla
 de celle d'un autre individu
 sice, qui arrêta le cadavre d
 plusieurs chaloupes rem
 l'entraîna au fond de la m
 les gladiateurs vont par t
 me qu'ils ne sont réunis q
 cinq ou six, ils osent att
 ne franche encore jeune ;
 sur elle, comme des d
 rieux se jettent sur un p
 uns cherchent à saisir sa
 arrêter les redoutables
 autres l'attaquent vers la
 éine, tourmenter, har
 quefois de succomber so
 re sa vaste gueule ; et

devant l'hôpital de Greenwich. Ce gladiateur, dont nous avons fait graver la figure, avoit trente-un pieds anglois de longueur, et douze pieds de circonférence dans l'endroit le plus gros de son corps.

Pendant qu'il respiroit encore, aucun bateau n'osa en approcher, tant on redoutoit les effets terribles de sa grande masse et de ses derniers efforts.

La force de ce dauphin gladiateur rappelle celle d'un autre individu de la même espèce, qui arrêta le cadavre d'une baleine que plusieurs chaloupes remorquoient, et l'entraîna au fond de la mer.

Les gladiateurs vont par troupes : lors même qu'ils ne sont réunis qu'au nombre de cinq ou six, ils osent attaquer la baleine franche encore jeune ; ils se précipitent sur elle, comme des dogues exercés et furieux se jettent sur un jeune taureau. Les uns cherchent à saisir sa queue, pour en arrêter les redoutables mouvemens ; les autres l'attaquent vers la tête. La jeune baleine, tourmentée, harassée, forcée quelquefois de succomber sous le nombre, ouvre sa vaste gueule ; et à l'instant les

gladiateurs affamés et audacieux déchirent ses lèvres, font pénétrer leur museau ensanglanté jusqu'à sa langue, et en dévorent les lambeaux avec avidité. Le voyageur de Pagès dit avoir vu une jeune baleine fuir devant une troupe cruelle de ces voraces et hardis gladiateurs, montrer de larges blessures, et porter ainsi l'empreinte des dents meurtrières de ces féroces dauphins.

Mais ces cétacées ne parviennent pas toujours à rencontrer, combattre, vaincre et immoler de jeunes baleines : les poissons forment leur proie ordinaire.

Je lis dans les notes manuscrites dont je dois la connoissance à sir Joseph Banks, que pendant une quinzaine de jours, où six dauphins gladiateurs furent vus dans la Tamise, sans qu'on pût les prendre, les aloses et les carrelets furent extraordinairement rares.

On a trouvé les cétacées dont nous parlons dans le détroit de Davis et dans la Méditerranée d'Amérique, ainsi qu'auprès du Spitzberg. Ils peuvent fournir de l'huile assez bonne pour être recherchée.

DES DAUPHINS
 toute leur partie supérieure
 est presque noir, et leur
 ventre d'un beau blanc. Ce
 ventre est relevé par une
 ligne très-longue, très-étroite
 qui s'étend de chaque
 côté en bande longitudinale
 la pectorale, comme un
 manteau brun ou noir.
 On peut voir aussi, en
 dessous, un croissant blanc
 qui se mêle avec les nuances
 du dessous de la tête.

nés et audacieux déchirant pénétrer leur museau jusqu'à sa langue, et en débarrassés avec avidité. Le même dit avoir vu une jeune ant une troupe cruelle de ardis gladiateurs, montrer es, et porter ainsi l'em- ts meurtrières de ces féroces

ncées ne parviennent pas ontrer, combattre, vaincre eunes baleines : les poissons roie ordinaire.

es notes manuscrites donnoissance à sir Joseph pendant une quinzaine de auphins gladiateurs furent amise, sans qu'on pût les loses et les carrelets furent ment rares.

é les cétacées dont nous le détroit de Davis et dans e d'Amérique, ainsi qu'an- erg. Ils peuvent fournir de onne pour être recherchée.

DES DAUPHINS. 229

Toute leur partie supérieure est d'un brun presque noir, et leur partie inférieure d'un beau blanc. Cette couleur blanche est relevée par une tache noirâtre, très-longue, très-étroite et pointue, qui s'étend de chaque côté de la queue en bande longitudinale, et s'avance vers la pectorale, comme un appendice du manteau brun ou noirâtre de l'animal. On peut voir aussi, entre l'œil et la dorsale, un croissant blanc qui contraste fortement avec les nuances foncées du dessus de la tête.

LE DAUPHIN NÉSARNACK*.

Ce cétacée a le corps et la queue très-alongés. Sa plus grande épaisseur est entre les bras et la dorsale : aussi, dans cette partie, son dos présente-t-il une grande convexité. La tête proprement dite est arrondie ; mais le museau, qu'on en distingue très-facilement, est aplati, et un peu semblable à un bec d'oie ou de canard, comme celui du dauphin vulgaire. La mâchoire inférieure avance plus que celle d'en-haut : l'une et l'autre sont garnies de quarante ou quarante-deux dents presque cylindriques, droites et très-émoussées au sommet, même lorsque l'animal est jeune.

* *Delphinus nesarnack* ; dauphin nésarnack, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique ; Muller, Prodrom. Zoolog. Dan. 56 ; Act. Nidro 4, 3 ; M. Oth. Fabric. Fauna Groenland. p. 49.

DES DAUPHINS
est situé au-dessus
un peu plus près du bon
l'organe de la vue.
pectorales sont placées
conséquent d'une manière
à la natation du nésarnack
et de plus échancrées
la surface de cette rainure
dorsale, peu étendue, et
s'élève à l'extrémité
voisine de la queue, et se
caudale par une saillie
dont la plus grande base
quelquefois un vingt-deuxième
totale du cétacée.
deux lobes qui composent
sont échancrés, et leurs
pointes en arrière.
la couleur générale du nésarnack
sûre ; quelques bandes de
de nuance plus foncée,
sur le dos ; une teinte
sur le ventre et quelque
des côtes de ce dauphin
cétacée a soixante vertèbres
sacrum.

e corps et la queue très-
grande épaisseur est entre
rsale : aussi, dans cette
présente-t-il une grande
été proprement dite est
le museau, qu'on en dis-
ment, est aplati, et un
un bec d'oie ou de ca-
lui du dauphin vulgaire.
érieure avance plus que
l'une et l'autre sont gar-
e ou quarante-deux dents
riques, droites et très-
ommet, même lorsque
e.

arnack; dauphin nésarnack,
es de l'Encyclopédie métho-
odrom. Zoolog. Dan. 56;
M. Oth. Fabric. Fauna Groen-

DES DAUPHINS. 231

L'évent est situé au-dessus de l'œil, mais un peu plus près du bout du museau que l'organe de la vue.

Les pectorales sont placées très-bas, et par conséquent d'une manière très-favorable à la natation du nésarnack, mais petites, et de plus échancrées; ce qui diminue la surface de cette rame.

La dorsale, peu étendue, échancrée et recourbée, s'élève à l'extrémité du dos la plus voisine de la queue, et se prolonge vers la caudale par une saillie longitudinale, dont la plus grande hauteur est quelquefois un vingt-deuxième de la longueur totale du cétacée.

Les deux lobes qui composent la caudale sont échancrés, et leurs extrémités courbées en arrière.

La couleur générale du nésarnack est noirâtre; quelques bandes transversales, d'une nuance plus foncée, la relèvent souvent sur le dos; une teinte blanchâtre paroît sur le ventre et quelquefois sur le bas des côtés de ce dauphin.

Ce cétacée a soixante vertèbres, et n'a pas de cœcum.

232. HISTOIRE NATURELLE

Sa longueur totale est de plus de trois mètres. La caudale a plus d'un demi-mètre de largeur.

On le prend difficilement, parce qu'il s'approche peu des rivages. Il est cependant des contrées où l'on se nourrit de sa chair, de son lard, et même de ses entrailles.

On a écrit que la femelle mettoit bas pendant l'hiver. Son lait est gras et nourrissant.

Le nésarnack vit dans l'Océan atlantique septentrional.

DES DAUPHINS

DAUPHIN DIODON

Le dauphin parvient à une
égale celle de quelques
quelques cachalots. Un
pris de Londres en 1783
des de longueur; et le sa
de Hunter, qui en a publié
cription dans les Transa
été royale, a eu dans sa
re d'un dauphin de la m
devoit être long de pl

écetacée a le museau apla
me celui du dauphin
me celui du nésarnack :
ère inférieure ne présen
as, lesquelles sont aiguë

Delphinus diodon; Hu
année 1787; dauphin
erre, planches de l'Encyc

LE DAUPHIN DIODON*.

CE dauphin parvient à une longueur qui égale celle de quelques physétères et de quelques cachalots. Un diodon pris auprès de Londres en 1783 avoit sept mètres de longueur; et le savant anatomiste Hunter, qui en a publié la première description dans les Transactions de la société royale, a eu dans sa collection le crâne d'un dauphin de la même espèce, qui devoit être long de plus de treize mètres.

Cecétacée a le museau aplati et alongé, comme celui du dauphin vulgaire et comme celui du nésarnack; mais sa mâchoire inférieure ne présente que deux dents, lesquelles sont aiguës et situées à

* *Delphinus diodon*; Hunter, Transact. philosoph. année 1787; *dauphin à deux dents*, Bonnaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

l'extrémité de cette mâchoire d'en-bas. Le front est convexe. La plus grande grosseur de ce diodon est auprès des pectorales, qui sont petites, ovales, et situées sur la même ligne horizontale que les commissures des lèvres. La dorsale, très-voisine de l'origine de la queue, est conformée comme un fer de lance, pointue et inclinée en arrière. La caudale montre deux lobes échan-crés. La couleur générale du cétacée est d'un brun noirâtre, qui s'éclaircit sur le ventre.

Ce cétacée ressemble à la de même le museau est rond; mais sa mâchoire inférieure est renflée comme celle du gonflement qui se voit dans sa mâchoire d'en-haut, pour mieux dire, la partie inférieure de sa tête a un volume si considérable qu'elle seroit très-mince. On conçoit d'autant plus aisément que sa largeur est inférieure à celle de la queue de plusieurs cétacées; elle a même une forme transversale dès son origine. La couleur générale est presque

* *Delphinus ventriosus* Linnaeus, philosoph. année 1787; pl. 1, planches de l'atlas.

LE DAUPHIN VENTRU*.

CE cétacée ressemble beaucoup à l'orque : il a de même le museau très-court et arrondi ; mais sa mâchoire inférieure n'est pas renflée comme celle de l'orque. Au lieu du gonflement que l'on ne voit pas dans sa mâchoire d'en-bas , son ventre , ou , pour mieux dire , presque toute la partie inférieure de son corps , offre un volume si considérable , que la queue paroît très-mince. On croit cette queue proprement dite d'autant plus étroite , que sa largeur est inférieure , à proportion , à celle de la queue de presque tous les autres cétacées ; elle a même ce petit diamètre transversal dès son origine , et sa forme générale est presque cylindrique.

* *Delphinus ventricosus* ; Hunter , Transact. philosoph. année 1787 ; *Épaulard ventru* , Bonaterre , planches de l'Encyclopédie méthodique.

Très-près de cette même queue s'élève la dorsale, dont la figure est celle d'un triangle rectangle, et qui par conséquent est plus longue et moins haute que celle de plusieurs autres dauphins.

Des teintes noirâtres sont mêlées avec le blanc de la partie inférieure de l'animal. Cette espèce, dont les naturalistes doivent la connoissance à Hunter, parvient au moins à la longueur de six mètres.

acétacée, dont le professeur
 le premier publié la des
 sous de la tête élevé et co
 rceau arrondi et très-co
 roire n'avance pas plus q
 mpte à celle d'en-haut,
 en-bas, vingt dents iné
 ur, et dont dix sont pl
 autres, mais qui sont tou
 leur figure. La partie
 de l'alvéole renferme, es
 à sort des gencives, et
 me recourbé et un peu
 rie est arrondie à son so
 divisée en deux lobes
 longitudinale. La peau
 est fine et noirâtre.
 Delphinus feres; dauphin
 d'après de l'Encyclopédie na

 LE DAUPHIN FÉRÈS *.

CE cétacée, dont le professeur Bonnaterre a le premier publié la description, a le dessus de la tête élevé et convexe, et le museau arrondi et très-court. Une mâchoire n'avance pas plus que l'autre. On compte à celle d'en-haut, ainsi qu'à celle d'en-bas, vingt dents inégales en grandeur, et dont dix sont plus grosses que les autres, mais qui sont toutes semblables par leur figure. La partie de chaque dent que l'alvéole renferme, est égale à celle qui sort des gencives, et représente un cône recourbé et un peu aplati : l'autre partie est arrondie à son sommet, ovoïde, et divisée en deux lobes par une rainure longitudinale. La peau qui recouvre le férès est fine et noirâtre. Ce dauphin par-

* *Delphinus feres* ; dauphin férès, Bonuaterre, planches de l'Encyclopédie méthodique.

vient à une longueur de près de cinq mètres. Celle de l'os du crâne est le septième ou à peu près de la longueur totale du cétacée.

Le 22 juin 1787, un bâtiment qui venoit de Malte, ayant mouillé dans une petite plage de la Méditerranée, voisine de Saint-Tropès, du département du Var, fut bientôt environné d'une troupe nombreuse de fères, suivant une relation adressée par M. Lambert, habitant de Saint-Tropès, à M. l'abbé Turles, chanoine de Fréjus, et envoyée par ce dernier au professeur Bonnaterre *. Le capitaine du bâtiment descendit dans sa chaloupe, attaqua un de ces dauphins, et le perça d'un trident. Le cétacée, blessé et cherchant à fuir, auroit entraîné la chaloupe, si l'équipage n'avoit redoublé d'efforts pour la retenir. Le fères lutta avec une nouvelle violence; le trident se détacha, mais enleva une large portion de muscles: le dauphin poussa quelques cris; tous les autres cétacées se rassemblèrent autour de leur compagnon;

* Bonnaterre, *planches de l'Encyclopédie méthodique*.

ils firent entendre
fonds, qui effrayèrent
matelots, et ils voguèrent
Grimeau, où ils reçurent
grand nombre de coups
ennemis. On les assaillit
leurs blessures et leur
des sifflemens aigus.
de cent de ces fères
sang dans ce lieu d
les individus immo
et leur chair parut
du bœuf.

ils firent entendre des *mugissemens* profonds, qui effrayèrent le capitaine et ses matelots, et ils voguèrent vers le golfe de Grimeau, où ils rencontrèrent, dans un grand nombre de pêcheurs, de nouveaux ennemis. On les assaillit à coups de hache; leurs blessures et leur rage leur arrachèrent des *sifflemens aigus*. On tua, dit-on, près de cent de ces féroces; la mer étoit teinte de sang dans ce lieu de carnage. On trouva les individus immolés remplis de graisse; et leur chair parut rougeâtre comme celle du bœuf.

LE DAUPHIN DE DUHAMEL¹.

Nous consacrons à la mémoire du savant et respectable Duhamel ce cétacée qu'il a fait connoître², et dont la description et un dessin lui avoient été envoyés de Vannes par M. Desforges-Maillard. Un individu de cette espèce avoit été pris auprès de l'embouchure de la Loire. Il y avoit passé les mois de mai, juin et juillet, blessé dans sa nageoire dorsale, se tenant entre deux petites îles, s'y nourrissant facilement des poissons qui y abondent, et y poursuivant les marsouins avec une sorte de fureur. Il avoit plus de six mètres de longueur, et son plus grand diamètre transversal n'étoit que d'un mètre ou environ. Ses dents, au nombre de vingt-

¹ *Delphinus Duhameli*.

² Traité des pêches.

DES DAU
quatre à chaque mâch
gues, et indiquoient l
mal. L'orifice des éve
de largeur. La distanc
ture et le bout du mus
tiers de l'intervalle co
cette même extrémité
et placé presque au-de
qui avoit un mètre d
mètre de large. On vo
que au-dessus de l'ant
érieure, la gorge et le
me couleur blanche, q
noir des nageoires et d
du cétacée. La peau
toucher.

ons à la mémoire du savant
Duhamel ce cétacée qu'il a
, et dont la description
ai avoient été envoyés de
. Desforges-Maillard. Un
te espèce avoit été pris au-
chure de la Loire. Il y avoit
de mai, juin et juillet,
nageoire dorsale, se tenant
tes îles, s'y nourrissant fa-
oissons qui y abondent, et
les marsouins avec une
Il avoit plus de six mètres
t son plus grand diamètre
oit que d'un mètre ou en-
ts, au nombre de vingt-

Duhameli.

èches.

DES DAUPHINS.

241

quatre à chaque mâchoire, étoient lon-
gues, et indiquoient la jeunesse de l'ani-
mal. L'orifice des événements avoit beaucoup
de largeur. La distance entre cette ouver-
ture et le bout du museau n'égalait pas le
tiers de l'intervalle compris entre l'œil et
cette même extrémité. L'œil étoit ovale
et placé presque au-dessus de la pectorale,
qui avoit un mètre de long et un demi-
mètre de large. On voyoit la dorsale pres-
que au-dessus de l'anus. La mâchoire in-
férieure, la gorge et le ventre présentoient
une couleur blanche, que faisoit ressortir le
noir des nageoires et de la partie supérieure
du cétacée. La peau étoit très-douce au
toucher.

LE DAUPHIN DE PÉRON*.

Nous donnons à ce dauphin le nom du naturaliste plein de zèle qui l'a observé, et qui, dans le moment où j'écris, brave encore les dangers d'une navigation lointaine, pour accroître le domaine des sciences naturelles. Les cétacées de l'espèce du *dauphin de Péron* ont la forme et les proportions du marsouin. Leur dos est d'un bleu noirâtre, qui contraste d'une manière très-agréable avec le blanc éclatant du ventre et des côtés, et avec celui que l'on voit au bout de la queue, à l'extrémité du museau, et à celle des nageoires.

Ils voguent en troupes dans le grand Océan austral. Le citoyen Péron en a

* *Delphinus Peronii* ; *delphinus leucorampus*, Manuscrits envoyés au Muséum national d'histoire naturelle, par le citoyen Péron, l'un des naturalistes de l'expédition de découvertes commandée par le capitaine Baudin.

DES DAU
rencontré des bande
seant avec une rapid
dans les environs du
de Diémen, et par
quarante-quatrième
australe.

ns à ce dauphin le nom de
 in de zèle qui l'a observé.
 e moment où j'écris, brave
 gers d'une navigation loin-
 accroître le domaine des
 relles. Les cétacées de l'es-
 in de Péron ont la forme et
 s du marsouin. Leur dos est
 râtre, qui contraste d'une
 gréable avec le blanc écla-
 e et des côtés, et avec celui
 au bout de la queue, à l'ex-
 seau, et à celle des nageoires.
 en troupes dans le grand
 l. Le citoyen Péron en a

Peronii ; *delphinus leucoram-*
 is envoyés au Muséum nationa-
 lle, par le citoyen Péron, l'un
 de l'expédition de découvertes
 le capitaine Baudin.

DES DAUPHINS. 243

rencontré des bandes nombreuses, na-
 geant avec une rapidité extraordinaire,
 dans les environs du cap sud de la terre
 de Diémen, et par conséquent vers le
 quarante-quatrième degré de latitude
 australe.

LE DAUPHIN DE COMMERSON*.

LES trois grandes parties du monde ; l'Amérique , l'Afrique et l'Asie , dont on peut regarder la Nouvelle-Hollande comme une prolongation , se terminent , dans l'hémisphère austral , par trois promontoires fameux , le cap de Horn , le cap de Bonne-Espérance et celui de Diémen. De ces trois promontoires , les deux plus avancés vers le pôle antarctique sont le cap de Diémen et le cap de Horn. Nous avons vu des troupes nombreuses de dauphins remarquables par leur vélocité et par l'éclat du blanc et du noir qu'ils présentent , animer les environs du cap de

* *Delphinus Commersonii* ; le jacobite ; le marsouin jacobite ; *tursio corpore argenteo , extremitatibus nigricantibus* , Commerson , manuscrits adressés à Buffon , et remis par Buffon à Lacepède.

DES DA
Diémen , où le natu
servés : nous allons vo
de Horn montrer d
bles d'autres dauph
de l'attention du vo
resplendissant et le
parure , ainsi que pa
mouvemens. Ces da
par le célèbre Comm
vés auprès de la ter
détroit de Magellan ,
autour du monde d
Mais le blanc et le no
différemment sur le
et sur ceux de Cou
miers , le dos est n
museau , de la qu
offre un très-beau l
le noir ne paroît e
tout le reste relui
polie , blanche , et
gentée. C'est penda
austral , et un peu
Commerson a vu c
dont les brillantes
ce grand observat

des parties du monde ;
 Afrique et l'Asie, dont
 et la Nouvelle-Hollande
 longation, se terminent,
 re austral, par trois pro-
 eux, le cap de Horn, le
 -Espérance et celui de
 trois promontoires, les
 és vers le pôle antarctique
 Diémen et le cap de Horn.
 es troupes nombreuses de
 quables par leur vélocité
 blanc et du noir qu'ils
 ner les environs du cap de

ommersonii; le *jacobite*; le
tursio corpore argenteo,
icantibus, Commerson, ma-
 Bâillon, et remis par Buffon

Diémen, où le naturaliste Péron les a observés : nous allons voir les environs du cap de Horn montrer des bandes considérables d'autres dauphins également dignes de l'attention du voyageur par le blanc resplendissant et le noir luisant de leur parure, ainsi que par la rapidité de leurs mouvemens. Ces derniers ont été décrits par le célèbre Commerson, qui les a trouvés auprès de la terre de Feu et dans le détroit de Magellan, lors du célèbre voyage autour du monde de notre Bougainville. Mais le blanc et le noir sont distribués bien différemment sur les dauphins de Péron et sur ceux de Commerson : sur les premiers, le dos est noir, et l'extrémité du muscau, de la queue et des nageoires, offre un très-beau blanc ; sur les seconds, le noir ne paroît qu'aux extrémités, et tout le reste reluit comme une surface polie, blanche, et, pour ainsi dire, argentée. C'est pendant l'été de l'hémisphère austral, et un peu avant le solstice, que Commerson a vu ces dauphins argentés, dont les brillantes couleurs ont fait dire à ce grand observateur qu'il falloit distin-

guer ces cétacées même parmi les plus beaux habitans des mers. Ils jouoient autour du vaisseau de Commerson, et se faisoient considérer avec plaisir par leur facilité à l'emporter de vitesse sur ce bâtiment, qu'ils dépassoient avec promptitude, et qu'ils enveloppoient avec célérité au milieu de leurs manœuvres et de leurs évolutions.

Ils étoient moins grands que des marsouins. Si, contre nos conjectures, les dauphins de Commerson et ceux de Péron n'avoient pas de nageoire dorsale, nous n'avons pas besoin de dire qu'il faudroit les placer dans le genre des *delphinaptères*, avec les *bélugas* et les *sénédettes*.

LES HYPÉR

L'HYPÉROODO

Le corps et la queue très-alongés. Leur forme conique; la base du c... trouve vers l'endroit des nageoires pectorales

¹ On trouvera au coin du tableau des espèces de cétacées.

² *Hyperoodon butskopff*; d'après Linné, édition de G. Spitzb. p. 93; id. An Crantz. Groenland. p. Groenl. p. 56; le d... terre, planches de l'... bottle-head, or sloun... 4, II, tab. 14; ne... Pontoppid. Norw. I... Zoolog. Britann. p. 5... physique, l'histoire na

RE NATURELLE.
ées même parmi les plus
des mers. Ils jouoient au-
au de Commerson, et se
idérer avec plaisir par leur
porter de vitesse sur ce bâ-
depassoient avec prompti-
enveloppoient avec célérité
eurs manœuvres et de leurs

moins grands que des mar-
ontre nos conjectures, les
ommerson et ceux de Péron
de nageoire dorsale, nous
soin de dire qu'il faudroit
le genre des *delphinaptères*,
et les *sénédettes*.

LES HYPÉROODONS¹.

L'HYPÉROODON BUTSKOF².

Le corps et la queue du butskopf sont très-alongés. Leur forme générale est conique; la base du cône qu'ils forment se trouve vers l'endroit où sont placées les nageoires pectorales. La tête a près d'une

¹ On trouvera au commencement de cette Histoire le tableau des ordres, des genres et des espèces de cétacées.

² *Hyperoodon butskopf*; grand souffleur à bec d'oie; *butskopff*; *delphinus orca* (*butskopf*), Linné, édition de Gmelin; *butskopff*, Mart. Spitzb. p. 93; *id.* Anderson, Isl. p. 252; *id.* Crantz. Groenland. p. 151; *buts-kopper*, Eggede, Groenl. p. 56; *le dauphin butskopf*, Bonnatte, planches de l'Encyclopédie méthodique; *bottle-head*, or *slounders-head*, Dale, Harwich, 4, II, tab. 14; *nebbe haul*, or *beaked whale*, Pontoppid. Norw. I, 123; *beaked*, Pennant, Zoolog. Britann. p. 59, n. 10; Observations sur la physique, l'histoire naturelle et les arts, mars 1789.

fois plus de hauteur que de largeur; mais sa longueur est égale, ou presque égale, à sa hauteur. Au-dessous du front, qui est très-convexe, on voit un museau très-aplati. On n'a trouvé que deux dents à la mâchoire d'en-bas; ces deux dents sont situées à l'extrémité de cette mâchoire, coniques et pointues: mais il y a sur le contour de la mâchoire supérieure, et, ce qui est bien remarquable, sur la surface du palais, des dents très-petites, inégales, dures et aiguës. Cette distribution de dents sur le palais est le véritable caractère distinctif du genre dont nous nous occupons, et celui qui nous a suggéré le nom que nous avons donné à ce groupe *. Nous devons faire d'autant plus d'attention à cette particularité, que plusieurs espèces de poissons ont leur palais hérissé de petites dents, et que par conséquent la disposition des dents du butskopf est un nouveau trait qui lie la grande tribu des cétacées avec les autres habitans de la mer, lesquels, ne respirant que par des

* *Hyperoon*, en grec, signifie *palais*; et *odos* signifie *dent*.

DES HYPEROON
branchies, sont forcés
des eaux. D'un autre
ment le butskopf es
ait le palais garni d
connoît encore aucun
des dents attachées à
A la vérité, on a de
dans la Nouvelle-Ho
pèdes revêtus de poi
ornithorhynques à cau
de leur museau avec
vivent dans les marais
sur le palais: mais
sont couverts que
pour ainsi dire, épi
mamelles; et, par
traits de leur confor
plus rapprochés des
que des mammifères
Au reste, les deu
kopfsont aussi avan
La langue est ruc
dans sa circonféren
mâchoire inférieu
ressemble beaucoup
d'un jeune bœuf.

branchies, sont forcés de vivre au milieu des eaux. D'un autre côté, non seulement le butskopf est le seul cétacée qui ait le palais garni de dents, mais on ne connoît encore aucun mammifère qui ait des dents attachées à la surface du palais. A la vérité, on a découvert depuis peu, dans la Nouvelle-Hollande, des quadrupèdes revêtus de poils, qu'on a nommés *ornithorhynques* à cause de la ressemblance de leur museau avec un bec aplati, qui vivent dans les marais, et qui ont des dents sur le palais : mais ces quadrupèdes ne sont couverts que de poils aplatis, et, pour ainsi dire, épineux ; ils n'ont pas de mamelles ; et, par tous les principaux traits de leur conformation, ils sont bien plus rapprochés des quadrupèdes ovipares que des mammifères.

Au reste, les deux mâchoires du butskopf sont aussi avancées l'une que l'autre.

La langue est rude et comme dentelée dans sa circonférence ; elle adhère à la mâchoire inférieure ; et sa substance ressemble beaucoup à celle de la langue d'un jeune bœuf.

L'orifice commun des deux évents a la forme d'un croissant ; mais les pointes de ce croissant, au lieu d'être tournées vers le bout du museau, comme dans les autres cétacées, sont dirigées vers la queue. L'orifice cependant et les tuyaux qu'il termine sont inclinés de telle sorte, que le fluide lancé par cette ouverture est jeté un peu en avant : il a un diamètre assez grand pour que, dans un jeune butskopf qui n'avoit encore que quatre mètres ou environ de longueur, le bras d'un enfant ait pu pénétrer par cette ouverture jusqu'aux valvules intérieures des évents. Les parois de la partie des évents inférieure aux valvules sont composées de fibres assez dures, et sont recouvertes, ainsi que la face intérieure de ces mêmes soupapes, d'une peau brune, un peu épaisse, mais très-douce au toucher.

L'œil est situé vers le milieu de la hauteur de la tête, et plus élevé que l'ouverture de la bouche.

Les pectorales sont placées très-bas, et presque aussi éloignées des yeux que ces derniers organes le sont du bout du mu-

DES HYPÉ
seau. Leur longueur
la longueur totale du
grande largeur est u
moitié de leur longu
La dorsale, beau
de la nageoire de la
mité des mâchoires
rière, et ne s'élève q
environ de la longue
Les deux lobes de la
crés ; et la largeur d
égaler le quart de la
La couleur génér
brune ou noirâtre ;
des teintes blanchâ
face du cétacée mo
individus, des tach
nuance différente de
La peau qui offre
et recouvre une gra
sous de laquelle on
rouge.
Le butskopf parv
mètres de longueur
de circonférence d
gros du corps.

seau. Leur longueur égale le douzième de la longueur totale du cétacée; et leur plus grande largeur est un peu supérieure à la moitié de leur longueur.

La dorsale, beaucoup moins éloignée de la nageoire de la queue que de l'extrémité des mâchoires, se recourbe en arrière, et ne s'élève qu'au dix-huitième ou environ de la longueur totale du butskopf.

Les deux lobes de la caudale sont échan-crés; et la largeur de cette nageoire peut égaler le quart de la longueur de l'animal.

La couleur générale du butskopf est brune ou noirâtre; son ventre présente des teintes blanchâtres; et toute la surface du cétacée montre, dans quelques individus, des taches ou des places d'une nuance différente de la couleur du fond.

La peau qui offre ces teintes est mince, et recouvre une graisse jaunâtre, au-dessous de laquelle on trouve une chair très-rouge.

Le butskopf parvient à plus de huit mètres de longueur: il a alors cinq mètres de circonférence dans l'endroit le plus gros du corps.

La portion osseuse de la tête peut peser plus de dix myriagrammes. Elle offre, dans sa partie supérieure, deux éminences séparées par une grande dépression. L'extrémité antérieure des os de la mâchoire d'en-haut présente une cavité que remplit un cartilage, et le bout du museau est cartilagineux. Ces os, ainsi que ceux de la mâchoire inférieure, sont arqués dans leur longueur, et forment une courbe irrégulière, dont la convexité est tournée vers le bas.

La partie inférieure de l'apophyse molaire, et les angles inférieurs de l'os de la pommette, sont arrondis.

Les poumons sont alongés et se terminent en pointe.

Le cœur a deux tiers de mètre et plus de longueur et de largeur.

On n'a trouvé qu'une eau blanchâtre dans les estomacs d'un jeune butskopf, qui cependant étoit déjà long de quatre mètres*. Cet individu étoit femelle; et ses mamelons n'étoient pas encore sensibles.

* *Journal de physique*, mars 1789. — Mémoire de M. Baussard.

Il avoit paru en se
de Honfleur, avec sa
les appercurent de lo
ter contre la marée
grève: ils s'en approc
de ces femelles étoi
cherchoit à la remet
tôt elle échoua elle-
d'abord de la jeune f
de cordes, et, à force
sur le rivage jusqu
hautes eaux. On rev
on l'attaqua avec au
plusieurs coups sur
on lui fit dans le vent
L'animal furieux mu
agita sa queue d'un
éloigna les assaillan
mença bientôt le co
faire passer un cable
du cétacée; on fit
ancrer dans un de ses
reuse mère fit des eff
cassa le cable, s'écl
mer, et, lançant par
et de sang à plus
Cétacées. II.

Il avoit paru en septembre 1788, auprès de Honfleur, avec sa mère. Des pêcheurs les apperçurent de loin; ils les virent lutter contre la marée et se débattre sur la grève: ils s'en approchèrent. La plus jeune de ces femelles étoit échouée, la mère cherchoit à la remettre à flot; mais bientôt elle échoua elle-même. On s'empara d'abord de la jeune femelle; on l'entoura de cordes, et, à force de bras, on la traîna sur le rivage jusqu'au-dessus des plus hautes eaux. On revint alors à la mère; on l'attaqua avec audace; on la perça de plusieurs coups sur la tête et sur le dos; on lui fit dans le ventre une large blessure. L'animal furieux *mugit comme un taureau*, agita sa queue d'une manière terrible, éloigna les assaillans. Mais on recommença bientôt le combat: on parvint à faire passer un cable autour de la queue du cétacée; on fit entrer la patte d'une ancre dans un de ses évents; la malheureuse mère fit des efforts si violens, qu'elle cassa le cable, s'échappa vers la haute mer, et, lançant par son évent un jet d'eau et de sang à plus de quatre mètres de

hauteur, alla mourir, à la distance d'un ou deux myriamètres, où le lendemain on trouva son cadavre flottant.

Pendant que M. Baussard, auquel on a dû la description de ce butskopf, disséquait ce cétacée, une odeur insupportable s'exhaloit de la tête; cette émanation occasionna des inflammations aux narines et à la gorge de M. Baussard : l'âcreté de l'huile que l'on retiroit de cette même tête, altéra et corroda, pour ainsi dire, la peau de ses mains; et une lueur phosphorique s'échappoit de l'intérieur du cadavre, comme elle s'échappe de plusieurs corps marins et très-huileux lorsqu'ils commencent à se corrompre.

Le butskopf a été vu dans une grande partie de l'Océan atlantique septentrional et de l'Océan glacial arctique.

F I N.

T A I

Des articles conten

LES NARWALS,

Le narwal vulgaire,
Le narwal microcéphale
Le Narwal Anderson

LES ANARNAKS,

L'anarnak groenlandois

LES CACHALOTS,

Le cachalot macrocéphale
Le cachalot trumpo,
Le cachalot svineval,
Le cachalot blanchâtre

LES PHYSALES,

Le physale cylindrique

LES PHYSÉTÈRES

Le physétère microps
Le physétère orthodon
Le physétère mular,

E NATURELLE.
ourir, à la distance d'un
ètres, où le lendemain
davre flottant.
Baussard, auquel on a
de ce butskopf, dissé-
ne odeur insupportable
te; cette émanation oc-
ammations aux narines
Baussard : l'âcreté de
retiroit de cette même
roda, pour ainsi dire,
ins; et une lueur phos-
oit de l'intérieur du ca-
s'échappe de plusieurs
très-huileux lorsqu'ils
corrompre.
é vu dans une grande
lantique septentrional
al arctique.

I N.

T A B L E

Des articles contenus dans ce volume.

LES NARWALS, page 1.

- Le narwal vulgaire, *ibid.*
- Le narwal microcéphale, 24.
- Le Narwal Anderson, 30.

LES ANARNAKS, 32.

- L'anarnak groenlandois, *ibid.*

LES CACHALOTS, 34.

- Le cachalot macrocéphale, *ibid.*
- Le cachalot trumpo, 100.
- Le cachalot svineval, 106.
- Le cachalot blanchâtre, 109.

LES PHYSALES, 111.

- Le physale cylindrique, *ibid.*

LES PHYSÉTÈRES, 122.

- Le physétère microps, *ibid.*
- Le physétère orthodon, 134,
- Le pbysétère mular, 138.

256 TABLE DES ARTICLES.

LES DELPHINAPTÈRES, 143.

Le delphinaptère béluga, *ibid.*

Le delphinaptère sénédette, 151.

LES DAUPHINS, 153.

Le dauphin vulgaire, *ibid.*

Le dauphin marsouin 204.

Le dauphin orque, 219.

Le dauphin gladiateur, 224.

Le dauphin nésarnack, 230.

Le dauphin diodon, 233.

Le dauphin ventru, 235.

Le dauphin férès, 237.

Le dauphin de Duhâmel, 240.

Le dauphin de Péron, 242.

Le dauphin de Commerson, 244.

LES HYPÉROODONS, 247.

L'hypéroodon butskopf, *ibid.*

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms
donnés aux Cétacées, et dont il est
fait mention dans l'Histoire naturelle
de ces animaux, 257.

TABLE ALP

*Des noms donnés à
il est fait ment
naturelle de ces*

*Nota. Les chiffres romains
chiffres arabes*

ADIPOCIRE, tome II
page 52.

Ambre blanc, II, 84.

- gris, II, 48.

- renardé, II, 82.

Anarnak groenlandois
II, 32.

Anarnak Groenlandicus

V. Anarnak groen

BALÆNA, V. Balei
franche, I, 53.

- albicans, V. Delph

TABLE ALPHABÉTIQUE

*Des noms donnés aux Cétacées, et dont
il est fait mention dans l'Histoire
naturelle de ces animaux.*

Nota. Les chiffres romains indiquent le tome, et les
chiffres arabes indiquent la page.

A

- | | |
|---|---|
| ADIPOCIRE, tome II,
page 52. | landois, II, 32. |
| Ambre blanc, II, 84. | Andarna fia, V. Balei-
noptère museau-poin-
tu, I, 238. |
| — gris, II, 48. | Arbavirksoak, V. Ba-
leine franche, I, 53. |
| — renardé, II, 82. | Arbek, V. Baleine fran-
che, I, 53. |
| Anarnak groenlandois,
II, 32. | |
| Anarnak Groenlandicus,
V. Anarnak groen- | |

B

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| BALÆNA, V. Baleine
franche, I, 53. | naptère béluga, II,
143. |
| — albicans, V. Delphi- | — Bellonii, V. Balei- |

258 TABLE DES NOMS

- noptère rorqual, I, 227.
- boops, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219.
- gibbosa, *V.* Baleine bossue, I, 210.
- gibbosa, var. B. *V.* Baleine noueuse, I, 208.
- glacialis, *V.* Baleine nordcaper, I, 198.
- Groenlandica, *V.* Baleine franche, I, 54.
- musculus, *V.* Baleinoptère rorqual, I, 227.
- mysticetus, *V.* Baleine franche, I, 53.
- mysticetus, var. B. *V.* Baleine nordcaper, I, 198.
- naribus flexuosis, *V.* Baleine franche I, 53.
- nodosa, *V.* Baleine noueuse, I, 208.
- nordcaper, *V.* Baleine nordcaper, I, 198.
- Rondeletii, *V.* Baleine franche, I, 53.
- rostrata, *V.* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
- Spitzbergensis, *V.* Baleine franche, I, 53.
- vera Zorgdrageri, *V.* Baleine franche, I, 53.
- vulgaris, *V.* Baleine franche, I, 53.
- (vulgaris Groenlandica) bipinnis, *V.* Baleine franche, I, 53.
- vulgi, *V.* Baleine franche, I, 53.
- acuto-rostrata, *voyez* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
- Baleine américaine, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.
- à bec, *V.* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.

DONNÉES AUX

— à bosses, *V.* Baleine bossue, I, 210.

— à six bosses, *V.* Baleine bossue, I, 210.

— blanche, *V.* Delphinoptère béluga, II, 143.

— (petite), *V.* Delphinoptère béluga, II, 143.

— de grande baie, *V.* Baleine franche, I, 53.

— de Sarde, *V.* Baleine nordcaper, I, 198.

— finback, I, 213.

— franche, I, 53.

— jubarte, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219.

— rorqual, *V.* Baleinoptère rorqual, I, 227.

— tampon, *V.* Baleine noueuse, I, 208.

— vulgaire, *V.* Baleine franche, I, 53.

Baleinoptère jubarte, 219.

DES NOMS

- *Rondeletii*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- *rostrata*, *V.* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
- *Spitzbergensis*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- *vera Zorgdrageri*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- *vulgaris*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- (*vulgaris Groenlandica*) *bipinnis*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- *vulgi*, *V.* Baleine franche, I, 53.
- *acuto-rostrata*, voyez Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
- Baleine américaine, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.
- à bec, *V.* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 259

- à bosses, *V.* Baleine bossue, I, 210.
- à six bosses, *V.* Baleine bossue, I, 210.
- blanche, *V.* Delphinaptère béluga, II, 143.
- (petite), *V.* Delphinaptère béluga, II, 143.
- de grande baie, *V.* Baleine franche, I, 53.
- de Sarde, *V.* Baleine nordcaper, I, 198.
- finback, I, 213.
- franche, I, 53.
- jubarte, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219.
- rorqual, *V.* Baleinoptère rorqual, I, 227.
- tampon, *V.* Baleine noueuse, I, 208.
- vulgaire, *V.* Baleine franche, I, 53.
- Baleinoptère jubarte, I, 219.
- Balenas, I, 88.
- Berbes ou fanons, I, 68.
- Bardhvalir, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34.
- Beaked, *V.* Hypéroodon Butskopf, II, 247.
- Bec d'oie, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
- Béluga, *V.* Delphinaptère béluga, II, 143.
- Bieluga, *V.* Delphinaptère béluga, II, 143.
- Blanc de baleine, II, 48.
- Blund headed, *V.* Cachalot trumpo, II, 100.
- Bottle-head, or slounders-head, *V.* Hypéroodon butskopf, II, 247.
- Braunfisch, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.
- Bruinvisch, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.
- Brunskop, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.
- Bunch whale, *V.* Ba-

- leine noueuse, I, 208.
 Butskopff, *V.* Hypé-
 roodon butskopf, II, 247.
 Buts-kopper, *V.* Hypé-
 roodon butskopf, II, 247.
 Buur-hval, *V.* Cachalot
 macrocéphale, II, 34.

C.

- CACHALOT (grand), — (variété A. du) trum-
V. Cachalot macrocé- po, *V.* Physétère or-
 phale, II, 34. thodon, II, 134.
 — (petit), *V.* Cacha- Cachalot, *V.* Cachalot
 lot svineval, II, 106. macrocéphale, II, 34.
 — à dents en faucille, Canal adipocireux, II,
V. Physétère microps, 53.
 II, 122. Capidolio, *V.* Baleinop-
 — blanchâtre, II, 109. tère rorqual, I, 227.
 — cylindrique, *V.* Phy- — *V.* Delphinaptère sé-
 sale cylindrique, II, nedette, II, 151.
 111. Cuschelotte, *V.* Cachalot
 — de la Nouvelle-Angle- macrocéphale, II, 34.
 terre, voyez Cachalot Catodon albicans, *V.*
 trumpo, II, 100. Cachalot blanchâtre,
 — macrocéphale, II, 34. II, 109.
 — microps, *V.* Physé- — macrocephalus, *V.*
 tère microps, II, 122. Cachalot macrocépha-
 — mular, *V.* Physétère le, II, 34.
 mular, II, 138. — macrocephalus, *V.*
 — svineval, II, 106. Cachalot trumpo, II,
 — trumpo, II, 100. 100.

DONNÉS A U
 — macrocephalus, var.
 B. *V.* Cachalot blan-
 châtre, II, 109.
 — svineval, *V.* Cacha-

DAUPHIN à deux dents
V. Dauphin diodon
 II, 233.

— béluga, *V.* Delphi-
 naptère béluga, I,
 143.

— butskopf, *V.* Hypé-
 roodon butskopf, II,
 247.

— de Commerson, I,
 244.

— de Dubamel, I,
 240.

— de Péron, II, 243.

— diodon, II, 233.

— épaulard, *V.* D.

phin orque, II, 2

— épée de mer,

Dauphin gladiate

II, 224.

— fères, II, 237.

— gladiateur, II, 2

— marsouin, II, 2

DES NOMS

roodon butskopf, II, 247.
Buur-hval, V. Cachalot macrocéphale, II, 34.

C.
— (variété A. du) trum-
po, V. Physétère or-
thodon, II, 134.
Cachalot, V. Cachalot
macrocéphale, II, 34.
Canal adipocireux, II,
53.
Capidolio, V. Baleinop-
tère rorqual, I, 227.
— V. Delphinaptère sé-
nedette, II, 151.
Cuschelotte, V. Cachalot
macrocéphale, II, 34.
Catodon albicans, V.
Cachalot blanchâtre,
II, 109.
— macrocephalus, V.
Cachalot macrocépha-
le, II, 34.
— macrocephalus, V.
Cachalot trumppo, II,
100.

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 261

— macrocephalus, var. lot svineval, II, 106.
B. V. Cachalot blan- — trumppo, V. Cachalot
châtre, II, 109. trumppo, II, 100.
— svineval, V. Cacha-

D

DAUPHIN à deux dents, — nésarnack, II, 230.
V. Dauphin diodon, — orque, II, 219.
II, 233. — ventru, II, 235.
— béluga, V. Delphi- Delphin, V. Dauphin
naptère béluga, II, marsouin, II, 204.
143. Delphinaptère beluga,
— butskopf, V. Hypé- II, 143.
roodon butskopf, II, — sénedette, II, 151.
247. Delphinapterus béluga,
— de Commerson, II, V. Delphinaptère bé-
244. luga, II, 143.
— de Duhamel, II, — senedetta, V. Del-
240. phinaptère sénedette,
— de Péron, II, 242. II, 151.
— diodon, II, 233. Delphinios, II, 196.
— épaulard, V. Dau- Delphinus antiquorum,
phin orque, II, 219. V. Dauphin vulgaire,
— épée de mer, V. II, 153.
Dauphin gladiateur, Delphinus Commerso-
II, 224. nii, V. Dauphin de
— férès, II, 237. Commerson, II, 244.
— gladiateur, II, 224. — delphis, V. Dauphin
— marsouin, II, 204. vulgaire, II, 153.

- diodon, *V.* Dauphin diodon, II, 233.
 — Duhameli, *V.* Dauphin de Duhamel, II, 240.
 — feres, *V.* Dauphin férès, II, 237.
 — gladiator, *V.* Dauphin gladiateur, II, 224.
 — leucas, *V.* Delphinaptère béluga, II, 143.
 — leucoramphus, *V.* Dauphin de Péron, II, 242.
 — nesarnack, *V.* Dauphin nésarnack, II, 230.
 — orca, *V.* Dauphin orque, II, 219.
 — orca (butskopf), *V.* Hypéroodon butskopf, II, 247.
 — orca, var. B. *V.* Dauphin gladiateur, II, 224.
 — Peronii, *V.* Dauphin de Péron, II, 242.
 — phocæna, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.
 — prior, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 — ventricosus, *V.* Dauphin ventru, II, 235.
 Delphis, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 Der rechte Groenlandische walfisch, *V.* Baleine franche, I, 53.
 Dogling, *V.* Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
 Dolphin, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 Dolphin-tuynebaar, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 Dorque, *V.* Dauphin orque, II, 219.
 Dritte species der cachalotte, *V.* Physétère microps, II, 122.
 Dudleyi balæna, *V.* Cachalot trumpo, II, 100.

EENHIORNING, *V.*
 Narwal vulgaire, II,

I.
 Einhorn, *V.* Narwal vulgaire, II, 1.

FANN-FISKAR-HNY-DENGEN, *V.* Dauphin orque, II, 219.
 Fanons, I, 66.

Fianfiro, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34.
 Fin-fish, *V.* Baleinop-

GRAMPUS, *V.* Dauphin gladiateur, II, 224.
 -*V.* Dauphin orque,

HAA-HIRNINGUR, *V.*
 Dauphin gladiateur, II, 224.

Hierosichthys, II, 199.
 Hippo Dyarrithe, II, 186.

DES NOMS

de Péron, II, 242.
 — phocæna, V. Dauphin marsouin, II, 204.
 — prior, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 — ventricosus, V. Dauphin ventru, II, 235.
 Delphis, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 Der rechte Groenlandische walfisch, V. Baleine franche, I, 53.
 V. Dogling, V. Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
 Dolphin, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 Dolphin-tuymebaar, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 V. Dorque, V. Dauphin orque, II, 219.
 Dritte species der cachalotte, V. Physétère microps, II, 122.
 Dudieyi balæna, V. Cachalot trumpo, II, 100.

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 263

E

EENHIORNING, V. Épaulard, V. Dauphin orque, II, 219.
 Narwal vulgaire, II, 1.
 — ventru, V. Dauphin ventru, II, 235.
 Einhorn, V. Narwal vulgaire, II, 1.
 Espaulard, V. Dauphin orque, II, 219.

F

FANN-FISKAR-HNY-DENGEN, V. Dauphin orque, II, 219.
 Fanons, I, 66.
 Fianfiro, V. Cachalot macrocéphale, II, 34.
 Fin-fish, V. Baleinoptère gibbar, I, 211.
 Finnfisch, V. Baleinoptère gibbar, I, 211.
 Finne-fisk, V. Baleinoptère gibbar, I, 211.
 Flèche (la) de la mer, II, 179.

G

GRAMPUS, V. Dauphin gladiateur, II, 224.
 — V. Dauphin orque, II, 219.
 — V. Dauphin vulgaire, II, 153.

H

HAA-HIRNINGUR, V. Hofrung, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 Dauphin gladiateur, II, 224.
 Hieros ichthys, II, 199.
 Hippo Dyarrithe, II, 186.
 Hrafn-reyður, V. Baleinoptère jubarte, I, 219.
 Hrafn-reyðus, V. Ba-

- leinoptère jubarte, I, 219. Huns-hval, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34.
 Hrefna, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219. Huyser, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 Humpack whale, *V.* Baleine noueuse, I, 208. Hvansk, *V.* Baleine franche, I, 53.
 Hundfiskur, *V.* Dauphin marsouin, II, 204. Hvalfisk, *V.* Baleine franche, I, 53.
 Hunfuhaks, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211. Hval-hund, *V.* Dauphin orque, II, 219.
 Hypéroodon butskopf, II, 247.

I

ILL-HVEL, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34.

J

- JACOBITE (le), *V.* Dauphin de Commerce, II, 244. tère jubarte, I, 219.
 Jupiterfisch, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219.
 Jubartes, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.

K

- KAISILOT, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34. Kegutilik, *V.* Cachalot svineval, II, 106.
 Kaskelot, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34. Kepolak, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.

DONNÉS AU
 Kepokarsoak, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.

Keporkak, *V.* Baleinoptère jubarte, I, 219.

Kernektok, *V.* Narwal vulgaire, II, 1.

Killelluak, *V.* Narwal vulgaire, II, 1.

Killer-trasher, *V.* Dauphin gladiateur, II, 224.

Knabbel-visch, *V.* Baleinoptère gibbar, I, 211.

LEIPTER, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.

Licorne de mer, *V.* Narwal vulgaire, I, 1.

MARIS SUS, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.

Marsopa, *V.* Dauphin marsouin, II, 204.

DES NOMS

Huns-hval, *V.* Cachalot macrocéphale, II, 34.
 Hnyser, *V.* Dauphin vulgaire, II, 153.
 Hvansk, *V.* Baleine franche, I, 53.
 Hvalfisk, *V.* Baleine franche, I, 53.
 Hval-hund, *V.* Dauphin orque, II, 219.
 Hypéroodon butskopf, II, 247.

I

Cachalot macrocéphale, II, 34.

J

V. ère jubarte, I, 219.
 Jupiterfisch, *V.* Balei-
 noptère jubarte, I,
 219.

K

Kegutilik, *V.* Cachalot
 svineval, II, 106.
 Kepolak, *V.* Balei-
 noptère gibbar, I,
 211.

DONNÉES AUX CÉTACÉES. 265

Kepokarsoak, *V.* Balei-
 noptère gibbar, I,
 211.
 Keporkak, *V.* Balei-
 noptère jubarte, I,
 219.
 Kernektok, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Killelluak, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Killer-trasher, *V.* Dau-
 phin gladiateur, II,
 224.
 Knabbel-visch, *V.* Ba-
 leine bossue, I, 210.
 Knobbel-visch, *V.* Ba-
 leine bossue, I, 210.
 Knoten-fisch, *V.* Ba-
 leine bossue, I, 219.
 Knoten-fisch *der knobbe*
fisch, *V.* Baleine bos-
 sue, I, 210.
 Knobbe-herre, *V.* Phy-
 sétère microps, II,
 122.
 Kosatky, *V.* Dauphin
 orque, II, 219.
 Kraken, I, 54.

L

LEIPTER, *V.* Dauphin
 vulgaire, II, 153.
 Licorne de mer, *V.*
 Narwal vulgaire, II,
 1.
 Lighval, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Lilie-hual, *V.* Baleine
 Nordcaper, I, 198.

M

MARIS SUS, *V.* Dau-
 phin marsouin, II,
 204.
 Marsopa, *V.* Dauphin
 marsouin, II, 204.
 Marsoin, *V.* Dauphin
 vulgaire, II, 153.
 Marsouin blanc, *voyez*
 Delphinaptère béluga,
 II, 143.

266 TABLE DES NOMS

- Marsouin franc, *voyez*
 Dauphin marsouin,
 II, 204.
 — jacobite, *V.* Dau-
 phin de Commerson,
 II, 244.
 Marswin, *V.* Dauphin
 marsouin, II, 204.
 Meershwaim, *V.* Dau-
 phin marsouin, II,
 204.
 Meerschwein, *V.* Dau-
 phin marsouin, II, 204.
 — *V.* Dauphin vulgaire.
 153.
 Ministre de Jupiter ma-
 rin, II, 199.
 Mokas, *V.* Cachalot
 macrocéphale, II, 34.
 Monodon, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 — monoceros, *V.* Nar-
 wal vulgaire, II, 1.
 — narhwal, *V.* Nar-
 wal vulgaire, II, 1.
 Monodon spurius, *V.*
 Anarnak groenlan-
 dois, II, 32.
 Morskaja-swinja, *V.*
 Dauphin marsouin,
 II, 204.
 Mular (le), *V.* Physé-
 tère mular, II, 138.
 — *Voy.* Delphinaptère
 sénédette, II, 151.
 Mular Nierembergii, *V.*
 Physétère mular, II,
 138.

N

- NAA-HVAL, *V.* Nar-
 wal vulgaire, II, 1.
 Narhval, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Nar-hval, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Narhwal, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 — oder einhorn, *V.*
 Narwal vulgaire, II,
 1.
 Narval Anderson, II, 30.

DONNNÉS AU
 Narwal microcéphale,
 II, 24.

Narwalus Andersonia-
 nus, *V.* Narwal An-
 derson, II, 30.

— microcephalus, *V.*
 narwal microcéphale.
 II, 24.

Narwalus vulgaris, *V.*
 Narwal vulgaire, II,
 1.

Nisa, *V.* Dauphin mar-
 souin, II, 204.

Nise, *V.* Dauphin mar-
 souin, II, 204.

OTARE, *V.* Dauphi
 orque, II, 219.

Orc-svin, *V.* Dauphi
 orque, II, 219.

PEIGNE ROUGE, *V.*
 Cachalot macrocéph
 le, II, 34.

Peis mular, *V.* Delph

DES NOMS

Monodon, *V.* Narwal
vulgaire, II, 1.
— monoceros, *V.* Nar-
wal vulgaire, II, 1.
— narhwal, *V.* Nar-
wal vulgaire, II, 1.
Monodon spurius, *V.*
Anarnak groenlan-
dois, II, 32.
Morskaja-swinja, *V.*
Dauphin marsouin,
II, 204.
Mular (le), *V.* Physé-
tère mular, II, 138.
— *Voy.* Delphinaptère
sénédetle, II, 151.
Mular Nierembergii, *V.*
Physétère mular, II,
138.

N

Narhwal, *V.* Narwal
vulgaire, II, 1.
— oder einhorn, *V.*
Narwal vulgaire, II,
1.
Narwal Anderson, II, 30.

DONNNÉS AUX CÉTACÉES. 267

Narwal microcéphale, Niser, *V.* Dauphin mar-
II, 24. souin, II, 204.
Narwalus Andersonia- Nochein ander art grosse
nus, *V.* Narwal An- fische, *V.* Dauphin
derson, II, 30. gladiateur, II, 224.
— microcephalus, *V.* Nordcaper austral, I,
narwal microcéphale, 207.
II, 24. — occidental, I, 207.
Narwalus vulgaris, *V.* Nordcaper, *V.* Baleine
Narwal vulgaire, II, nordkaper, I, 198.
1. Nordkapper, *V.* Balei-
Nisa, *V.* Dauphin mar- ne nordcaper, I, 198.
souin, II, 204. Nebbe haul, or beaked
Nise, *V.* Dauphin mar- whale, *V.* Hypéroo-
souin, II, 204. don butskopf, II, 247.

O

OTARE, *V.* Dauphin Orca, *V.* Dauphin or-
orque, II, 219. que, II, 219.
Orc-svin, *V.* Dauphin Oudre, *V.* Dauphin
orque, II, 219. orque, II, 219.

P

PEIGNE ROUGE, *V.* naptère sénédetle, II,
Cachalot macrocépha- 151
le, II, 34. Penvisch, *V.* Baleine
Peis mular, *V.* Delphi- noueuse, I, 208.

268 TABLE DES NOMS

- Pfflokfish, *V.* Baleine
noueuse, I, 208.
- Pffock fisk, *V.* Baleine
noueuse, I, 208.
- Phocæna, *V.* Dauphin
marsouin, II, 204.
- Physale cylindrique, II,
III.
- Physalus cylindricus, *V.*
Physale cylindrique,
II, III.
- Physeter, *V.* Delphi-
naptère sénédette, II,
151.
- catodon, *V.* Cacha-
lot svineval, II, 106.
- macrocephalus, *V.*
Cachalot macrocépha-
le, II, 34.
- Physeter microps, *V.*
Physétère microps,
II, 122.
- microps, var. B. *V.*
Physétère orthodon,
II, 134.
- mular, *V.* Physétère
mular, II, 138.
- orthodon, *V.* Phy-
sétère orthodon, II,
134.
- tursio, *V.* Physétère
mular, II, 138.
- Physétère microps, II,
122.
- mular, II, 138.
- orthodon, II, 134.
- Pike headed whale, *V.*
Baleinoptère museau-
pointu, I, 238.
- Poisson à sabre, *V.*
Dauphin gladiateur,
II, 224.
- blanc, hvüdfiske,
V. Cachalot blanchâ-
tre, II, 109.
- Porcus marinus, *V.*
Dauphin vulgaire, II,
153.
- Porpesse ou porpoisse,
voyez Dauphin mar-
souin, II, 204.
- Porpeisse, *V.* Dauphin
vulgaire, II, 153.
- Porpus, *V.* Dauphin
marsouin, II, 204.
- Pottfisch, *V.* Cachalot

DONNÉS A
macrocéphale, II, 3
Potfisk, *V.* Cachal
macrocéphale, II, 3
Potvisch, *V.* Cachal

REBBE hual, *V.* Bal
noptère museau po
tu, I, 238.

Reider, *V.* Baleinopt
gibbar, I, 211.

Rengis fiskar, *V.* Ba
noptère jubarte,
219.

Rod-kammen, *V.*
chalot macrocéph
II, 34.

SANDHUAL, *V.* B
ne franche, I, 5

Sarde, *V.* Baleine
caper, I, 198.

Schwerdt-fisch, *V.*
Dauphin gladia
II, 224.

Seras-whale, *V.* I
ne bossue, I, 2

DES NOMS
 sète orthodon, II, 134.
 — tursio, V. Physète mular, II, 138.
 Physète microps, II, 122.
 — mular, II, 138.
 — orthodon, II, 134.
 V. Pike headed whale, V. Baleinoptère museau-pointu, I, 238.
 Poisson à sabre, V. Dauphin gladiateur, II, 224.
 — blanc, hvüdfiske, V. Cachalot blanchâtre, II, 109.
 Porcus marinus, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 Porpesse ou porpoisse, voyez Dauphin marsouin, II, 204.
 Porpeisse, V. Dauphin vulgaire, II, 153.
 Porpus, V. Dauphin marsouin, II, 204.
 Potfisk, V. Cachalot

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 269

macrocéphale, II, 34. macrocéphale, II, 34.
 Potfisk, V. Cachalot Pou de baleine, I, 143.
 macrocéphale, II, 34. Pourceau de la mer, II, 205.
 Potvisch, V. Cachalot

R

REBBE hual, V. Balei- Roi de la mer, II, 200.
 noptère museau poin-
 tu, I, 238. Ror-hual, V. Balei-
 Reider, V. Baleinoptère noptère gibbar, I, 211.
 gibbar, I, 211.
 Rengis fiskar, V. Balei- Rorqual, V. Baleinop-
 noptère jubarte, I, 219.
 Rod-kammen, V. Ca- — à ventre cannelé, V.
 chalot macrocéphale, Baleinoptère rorqual,
 II, 34. I, 227.

S

SANDHUAL, V. Balei- Sculfich, I, 124.
 ne franche, I, 53. Sènedette, V. Delphi-
 Sarde, V. Baleine nord- naptère sènedette, II, 151.
 caper, I, 198.
 Schwerdt-fisch, voyez Serbio, voyez Baleine
 Dauphin gladiateur, franche, I, 53.
 II, 224. Shortead, I, 124.
 Seras-whale, V. Balei- Sietback, V. Baleine
 ne bossue, I, 210. franche, I, 53.

270 DONNÉS AUX CÉTACÉES.

- Skidis fiskar, *V.* Balei-
noptère gibbar, I, 211.
Souffleur, *V.* Baleinop-
tère rorqual, I, 227.
—*V.* Delphinaptère sé-
nedette, II, 151.
—(grand) à bec d'oie,
V. Hypéroodon buts-
kopf, II, 247.
Spekhugger, *V.* Dau-
phin orque, II, 219.
Sperma ceti, *V.* Ca-
chalot blanchâtre, II,
109.
—ceti, *V.* Cachalot ma-
crocéphale, II, 34.
—ceti whale, *V.* Ca-
chalot trumppo, II,
100.
Springen, *V.* Dauphin
vulgaire, II, 153.
Springer, *V.* Dauphin
orque, II, 219.
- Stant, I, 124.
Staur-himing, *V.* Phy-
sétere microps, II,
122.
Steipe-reyður, *V.* Ba-
leinoptère rorqual, I,
227.
Steype-reyðus, *V.* Ba-
leinoptère rorqual, I,
227.
Stor-hval, *V.* Balei-
noptère gibbar, I,
211.
Sue-hval, *V.* Cachalot
macrocéphale, II, 34.
Sulphur bottom, *V.*
Baleinoptère jubarte,
I, 219.
Svine-hval, *V.* Cacha-
lot svineval, II, 106.
Swinia - morska, *V.*
Dauphin marsouin,
II, 204.

T

- TANDTOYE, *V.* Dau-
phin orque, II, 219.
- Tauvar, *V.* Narwal
vulgaire, II, 1.

DONNÉS AU
Tikagusik, *V.* Physé-
tère microps, II, 12.
Tkakæ, *V.* Balein-
franche, I, 53.
Tonym, *V.* Dauphin
marsouin, II, 204.
Troid-hual, *V.* Ca-
chalot macrocéphale
II, 34.
Trumblare, *V.* Dau-
phin marsouin, II
204.
Trumppo, *V.* Cachalot
trumppo, II, 100.

UNICORNU marinum
V. Narwal vulgaire

VALLENA, *V.* Bale-
ne franche, I, 53.
Vatushalr, *V.* Balein-
franche, I, 53.

WALVISCHVANGST.
V. Physale cylindr

UX CÉTACÉES.

Stant, I, 124.
 Staur-himing, *V.* Physé-
 sètere microps, II,
 122.
 Steipe-reyður, *V.* Ba-
 leinoptère rorqual, I,
 227.
 Steype-reyður, *V.* Ba-
 leinoptère rorqual, I,
 227.
 Stor-hval, *V.* Balei-
 noptère gibbar, I,
 211.
 Sue-hval, *V.* Cachalot
 macrocéphale, II, 34.
 Sulphur bottom, *V.*
 Baleinoptère jubarte,
 I, 219.
 Svine-hval, *V.* Cacha-
 lot svineval, II, 106.
 Swinia - morska, *V.*
 Dauphin marsouin,
 II, 204.

T

Tauvar, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.

DONNÉS AUX CÉTACÉES. 271

Tikagusik, *V.* Physé-
 tère microps, II, 122.
 Tkakæ, *V.* Baleine
 franche, I, 53.
 Tonym, *V.* Dauphin
 marsouin, II, 204.
 Troid-hual, *V.* Ca-
 chalot macrocéphale,
 II, 34.
 Trumblare, *V.* Dau-
 phin marsouin, II,
 204.
 Trumppo, *V.* Cachalot
 trumppo, II, 100.
 Tucqual, *V.* Baleinop-
 tère gibbar, I, 211.
 Tugalik, *V.* Narwal
 vulgaire, II, 1.
 Tumberello, *V.* Dau-
 phin vulgaire, II, 153.
 Tumler, *V.* Dauphin
 marsouin, II, 204.
 Tummler, *V.* Dauphin
 vulgaire, II, 153.
 Tunomlik, *V.* Balei-
 noptère gibbar, I, 211.
 Tursio, *V.* Dauphin
 marsouin, II, 204.

U

UNICORNU marinum, II, 1.
V. Narwal vulgaire,

V

VALLENA, *V.* Balei-
 ne franche, I, 53.
 Vatushalr, *V.* Baleine
 franche, I, 53.
 Vinvisch, *V.* Balei-
 noptère gibbar, I,
 211.
 Vivelle, I, 146.

W

WALVISCHVANGST, que, II, 111.
V. Physale cylindri-

Weisfisch, <i>V.</i> Cachalot	franche, I, 53.
blanchâtre, II, 109.	Whallvisch, <i>V.</i> Balei-
— <i>V.</i> Delphinaptère bé-	ne franche, I, 53.
luga, II, 143.	Witfisch, <i>V.</i> Delphi-
— <i>V.</i> Physétère mi-	napère béluga, II,
crops, II, 122.	143.
Whale, <i>V.</i> Baleine	— oder weissfisch, <i>V.</i>
franche, I, 53.	Delphinaptère béluga,
Whalffisch, <i>V.</i> Baleine	II, 143.

Z

ZEE-VARK, <i>V.</i> Dau-	chelotte, <i>V.</i> Physé-
phin marsouin, II,	tère orthodon, II,
204.	134.
Zweite species der ca-	

Fin de la Table.



DE L'IMPRIMERIE DE PLASSAN.

E DES NOMS

franche, I, 53.
Whallvisch, V. Balei-
ne franche, I, 53.
Witfisch, V. Delphi-
naptère béluga, II,
143.
— oder weissfisch, V.
Delphinaptère béluga,
II, 143.

Z

chelotte, V. Physé-
tère orthodon, II,
134.

de la Table.



ERIE DE PLASSAN.





